

INVASIVE ARTER

Bisamrotte eller **Moskusrotte** (*Ondatra zibethica*)

Udseende

En bisamrotte måler fra snudespids til halerod omkring 30-40 cm, halen kan blive op til 28 cm lang. Bisamrotten er Europas næststørste gnaver, kun overgået af bæveren. Den kan veje op til 1,8 kg.

Underulden er tæt, blød og brunlig. På oversiden er dækhårene rødbrune eller gyldne, mens de på undersiden af dyret er lysebrune eller grålige. Halen er skællet. Bagfødderne er væsentligt længere end forfødderne, og der er svømmehud mellem bagføddernes tæer.

Hvor stammer den fra?

Bisamrotten er en Nordamerikansk art, som i begyndelsen af 1900-tallet blev udsat i Central-europa til jagt. Siden har arten hurtigt spredt sig eksplosivt og findes nu udbredt til lige syd for den Dansk-Tyske grænse, hvorfra der med mellemrum indvandrer individer til Danmark. Der findes sandsynligvis allerede en bestand af bisamrotter i det sydligste Sønderjylland, men da den lever forholdsvis skjult er det usikkert, hvor udbredt arten er her.

Hvor findes den i Danmark?


Bisamrotten findes sporadisk i Danmark, som regel ved søer, åer og moser, hvor der er rigelig vegetation.

Hvorfor er den en trussel?

Arten har ingen konkurrenter om føden og meget få naturlige fjender. Den er en stor skadevolder, der dels æder markafgrøder dels graver gange og underminerer bredder på søer og vandløb. Den største trussel er bisamrottens evne til at underminere og ødelægge diger, hvorfor den kan medføre store samfundsmæssige omkostninger.

Hvad kan der gøres?

Det er forbudt at avle bisamrotter som pelsdyr i Danmark. Bisamrotten er vanskelig at bekæmpe, hvis den først får etableret en fast bestand i Danmark, hvorfor den overvåges og holdes nede ved regulering. Kan bekæmpes som skadevoldende vildt hele året.



Nanna Ramsgaard

