

## Brudeand (*Aix sponsa*)

### Beskrivelse

**Videnskabeligt navn:** *Aix sponsa*

**Synonymer:**

**Kaldenavn:** Brudeand

**Beskrivelse:** Brudeand bliver 42-51 cm lang<sup>1</sup>. Dens vingefang er 68-78 cm<sup>2</sup>. Hannen har et metalskinnende blå og grønt hoved samt overside, smalle hvide hovedstriber og hvid strube. Hunnen er mat olivengrå med et større hvidt område omkring øjnene, hovedet er mørkt uden lys runding på siden<sup>1</sup>. Brudeanden har sin rede i huller i træer, et kuld udgør 9-15 æg<sup>3</sup>. Det er ikke ualmindeligt at finde reder med mere end 15 æg, da Brudeand hunner kan finde på at lægge deres æg i andre hunners reder<sup>5</sup>.



Brudeænder. Foto: Istock

### Forvekslingsmuligheder

Brudeand er lidt større end Mandarinand<sup>1</sup>. Hunnerne af Mandarinand, *Aix galericulata*, ligner hunner hos Brudeand, de er dog lidt blegere med mere udprægede markeringer. Yderligere kan hunnerne af Mandarinand genkendes i alle fjerdragter på den blege base på deres næb, og den runde plet på deres sider<sup>3</sup>.

### Spredningsvej og nuværende udbredelse

Oprindeligt kommer Brudeand fra Nordamerika. Den er almindelig i fangenskab<sup>1</sup>. Brudeand optræder i fugleparker og byparker<sup>2</sup>. Udbredelsen af Brudeand er ukendt i Danmark, fra 1999-2015 er den blevet registreret på 18 forskellige lokaliteter i landet<sup>4</sup>.

### Score og baggrund

Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj

| Sprednings-potentiale | Levestedets bevarings- eller naturværdi | Påvirkning af hjemme-hørende arter | Påvirkning af økosystemer | Økonomiske effekter | Helbreds effekter | Harmonia | Samlet |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------|--------|
| 2                     | 1                                       | 1                                  | 1                         | 1                   | 1                 | 5        | 7      |

**Spredningspotentiale: 2 (middel).** Spredningspotentialet for Brudeand er vurderet til middel. Oprindeligt kommer Brudeand fra Nordamerika. Den er almindelig i fangenskab<sup>1</sup>. Brudeand optræder i fugleparker og byparker<sup>2</sup>. Udbredelsen af Brudeand er ukendt i Danmark, fra 1999-2015 er den blevet registreret på 18 forskellige lokaliteter i landet<sup>4</sup>.



**Levestedets bevarings- eller naturværdi: 1 (lav).** Levestedets bevaringsværdi for Brudeand er vurderet til lav. Brudeand lever i en række forskellige habitater blandt andet skovområder nær søer, floder og vådområder<sup>5</sup>.

**Påvirkning af hjemmehørende arter: 1 (lav).** Påvirkningen af hjemmehørende arter for Brudeand er vurderet til lav.

**Påvirkning af økosystemer: 1 (lav).** Påvirkningen af økosystemer for Brudeand er vurderet til lav.

**Økonomiske effekter: 1 (lav).** De økonomiske effekter for Brudeand er vurderet til lav. Der kendes ikke til nogen negativ økonomisk effekt for Brudeand<sup>5</sup>.

**Helbredseffekter: 1 (lav).** Helbredseffekter for Brudeand er vurderet til lav.

**Total score = 7**

### Kilder

- <sup>1</sup> Svensson, L. 2012. Fugle i felten. 5.reviderede udgave, 1. oplag. Lindhardt og Ringhof (IGN1966).
- <sup>2</sup> Dybbro, T. & Hume, R. 2003. Europas fugle. 1 udgave, Politikens Forlag (IGN1965).
- <sup>3</sup> <http://www.luontoportti.com/suomi/da/linnut/mandarinand-da> Besøgt 01.12.2015 (IGN2012).
- <sup>4</sup> <http://www.luontoportti.com/suomi/da/linnut/brudeand> Besøgt 01.12.2015 (IGN2013)
- <sup>5</sup> Animal Diversity Web: Available at [http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Aix\\_sponsa/](http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Aix_sponsa/)