



Ekstrakt af kerner af *Vitis vinifera* L. (druekerneekstrakt)

CAS-nr. foreligger ikke

Basisstof til plantebeskyttelse

Om basisstoffer til plantebeskyttelse

Et godkendt basisstof må bruges til plantebeskyttelse i hele EU inden for de vilkår og anvendelser (doseringer, afgrøder og skadegørere m.v.), som basisstoffet er godkendt til. Læs mere om basisstoffer på

<https://mst.dk/kemi/pesticider/alternative-sproejtemidler/basisstoffer/>

Denne brugsanvisning er forfattet som en hjælp til brugere af basisstoffet, da der ikke må markedsføres produkter med godkendte etiketter, som beskriver den godkendte fremstilling og anvendelse af stoffet til plantebeskyttelsesformål. De fuldstændige vilkår for brugen af basisstoffer fremgår af godkendelsesforordningen og review-rapporten. Denne brugsanvisning er udarbejdet jf. konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om ekstrakt af kerner af *Vitis vinifera* L. (druekerneekstrakt) (PLAN/2024/800 RR – rev.3), særlig tillæg I og II.

Brugsanvisning

Afgrøder: Vindruer, æbler, kartofler og salat.

Skadevolder: Druekerneekstrakt anvendes mod dunet meldug, æbleskurv og kartoffelskimmel.

Brug: Druekerneekstrakt kan anvendes som et ekstrakt eller et pulver, der opløses i vand, og sprøjtes på afgrøderne.

Mindste renhedsgrad: Minimumsindhold på 75 % oligomeriske proanthocyanidiner (på vandfri basis), i henhold til US Pharmacopoeia Convention Official 2017 (Dietary Supplements: Grape Seeds Oligomeric Proanthocyanidins USP40–NF35 Page 7030).

Dansk anvendelsesskema

Basisstof	Afgørde og/eller anvendelses-forhold	F, V eller I (a)	Skadevolder	Koncentration af aktivstof (g/L) eller (g/kg) (b)	Applikation				Applikationsrate			PHI (dage) (h)	Bemærkninger
					Metode (c)	Vækststadium og sæson (d)	Antal behandling er min./maks. (e)	Interval mellem behandlinger min.	g a.s./hL min./maks. (f)	Vand (L/ha) min./maks.	Total rate pr. behandling g a.s./ha eller kg/ha (g)		
Ekstrakt af kerner af <i>Vitis vinifera</i> L. (druekerne ekstrakt)	Vindruer <i>Vitis vinifera</i> (VITVI)	F	Dunet meldug <i>Plasmopara viticola</i> (PLASVI)	100% druekerne pulver	Sprøjtning	BBCH 13-57 Og så BBCH 71-79	6	5 til 7 dage	98	300	294 g/ha	-	Må ikke anvendes i blomstrende afgrøder.
	Æbler <i>Malus domestica</i> (MABSD)		Æbleskurv <i>Venturia inaequalis</i> (VENTIN)			BBCH 11 til BBCH 59	6		98	500	490 g/ha		
	Kartofler <i>Solanum tuberosum</i> (SOLTU)		Kartoffelskimmel <i>Phytophthora infestans</i> (PHYTIN)			BBCH 31- BBCH 59 Og så BBCH 70 til BBCH 90	6		98	300	294 g/ha		
	Salat <i>Lactuca sativa</i> (LACSA)	F/G	Dunet meldug <i>Peronospora</i> sp., <i>Bremia lactucae</i> (BREMLA)			BBCH 19 til BBCH 50	3		98	500	490 g/ha		

Find mere information om basisstoffer og deres anvendelse på <https://mst.dk/kemi/pesticider/alternative-sproejtemidler/basisstoffer/>

- (a) Udendørs brug på friland (F), indendørs i væksthuse (V) eller indendørs anvendelse (I)
- (b) Koncentration af aktivstof (a.s.). Dosis angivet i g/kg eller g/L.
- (c) Udbringningsmetoden, f.eks. sprøjtning, spredning, pulverspredning, udvanding, etc.
- (d) Vækststadium ved sidste behandling (se BBCH Monograph, Growth Stage of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4) samt information om sæson for behandling hvor relevant.
- (e) Minimum og maksimum antal af behandlinger, der er mulige under praktiske forhold.
- (f) g aktivstof pr. 100 L (minimum til maksimum).
- (g) Total dosering for hver behandling, g eller kg aktivstof pr. hektar (minimum til maksimum).

(h) PHI (preharvest interval): minimum sprøjtefrist (antal dage) før høst af afgrøder.