



Allium fistulosum (pibeløg), forarbejdet

Basisstof til plantebeskyttelse

Om basisstoffer til plantebeskyttelse

Et godkendt basisstof må bruges i hele EU som sprøjtemiddel inden for de vilkår og anvendelser (doseringer, afgrøder og skadegørere m.v.), som basisstoffet er godkendt til. Læs mere om basisstoffer på

<https://mst.dk/kemi/pesticider/alternative-sproejtemidler/basisstoffer/>

Denne brugsanvisning er forfattet som en hjælp til brugere af basisstoffet, da der ikke må markedsføres produkter med godkendte etiketter, som beskriver den godkendte fremstilling og anvendelse af stoffet til plantebeskyttelsesformål. De fuldstændige vilkår for brugen af basisstoffer fremgår af godkendelsesforordningen og review-rapporten. Denne brugsanvisning er udarbejdet jf. konklusionerne i vurderingsrapporten om *Allium fistulosum*, forarbejdet (PLAN/2024/798 RR særlig tillæg I og II).

Brugsanvisning

Afgrøder: *Allium fistulosum*, forarbejdet kan anvendes til tomater dyrket på friland eller i væksthuse/drivhus for at bekæmpe bakterier i jorden.

Skadevolder: Bakterier i jorden (*Ralstonia solanacearum*)

Brug: Basisstoffet *Allium fistulosum* kan forarbejdes på følgende to måder. I begge tilfælde skal pibeløgene være af fødevarekvalitet.

Metode 1) Friske stængler og blade hakkes i 1-2 cm stykker og indarbejdes i jorden

Metode 2) 500 g tørrede stængler og blade blandes med 1 liter vand (stuetemperatur) i 1 min, og filtreres derefter.

For at beskytte de behandlede afgrøder mod mikrobiel eller kemisk forurening skal ekstraktet behandles/opbevares som var det en fødevare (hygiejnisk). Ekstraktet skal anvendes indenfor 24 timer.

Mindste renhedsgrad: Fødevarekvalitet i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (2), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (3), Kommissionens forordning (EU) 2023/915 om maksimalgrænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1881/2006.



Dansk anvendelsesskema

Basisstof	Afgørde og/eller anvendelses-forhold	F, V eller I (a)	Skadevolder	Koncentration af aktivstof (g/L) eller (g/kg) (b)	Applikation				Applikationsrate			PHI (dage) (h)	Bemærkninger
					Metode (c)	Vækststadium og sæson (d)	Antal behandlinger min./maks. (e)	Interval mellem behandlinger min.	g a.s./hL min./maks. (f)	Vand (L/ha) min./maks.	Total rate pr. behandling g a.s./ha eller kg/ha (g)		
Allium fistulosum (pibeløg), forarbejdet	Tomater	F, V	<i>Ralstonia solanacearum</i> RALSSO	500 g tørret pibeløg pr liter vand	Sprøjtes	15-30 dage før såning	1 pr. afgørdehold, Max 3 hold pr. år på samme areal		50 kg pibeløg/hL	650-750 L/ha	Ekstrakt fra 325-375 kg pibeløg/ha	-	Anvendes før såning/plantning af tomatplanter
				100 % frisk pibeløg	Indarbejdes i jorden				250 g pibeløg/1kg jord	-	1300-1500 kg pibeløg/ha	-	

Find mere information om basisstoffer og deres anvendelse på <https://mst.dk/kemi/pesticider/alternative-sproejtemidler/basisstoffer/>

- (a) Udendørs brug på friland (F), indendørs i væksthuse (V) eller indendørs anvendelse (I)
- (b) Koncentration af aktivstof (a.s.). Dosis angivet i g/kg eller g/L.
- (c) Udbringningsmetoden, f.eks. sprøjtning, spredning, pulverspredning, udvanding, etc.
- (d) Vækststadium ved sidste behandling (se BBCH Monograph, Growth Stage of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4) samt information om sæson for behandling hvor relevant.
- (e) Minimum og maksimum antal af behandlinger, der er mulige under praktiske forhold.
- (f) g aktivstof pr. 100 L (minimum til maksimum).
- (g) Total dosering for hver behandling, g eller kg aktivstof pr. hektar (minimum til maksimum).
- (h) PHI (preharvest interval): minimum sprøjtefrist (antal dage) før høst af afgrøder.