



Kystdirektoratet

Nyt byggherreområde Lodbjerg B

Miljøkonsekvensrapport for Lodbjerg B

14-10-2021

Kystdirektoratet

Nyt bygherreområde Lodbjerg B

Miljøkonsekvensrapport for Lodbjerg B

Kunde	Kystdirektoratet
Rådgiver	WSP Danmark Linnés Allé 2 2630 Taastrup
Projektnummer	3621900254
Projektleder	Jan F. Nicolaisen
Udarbejdet af	Louise K. Poulsen, Morten Warnick Stæhr, Camilla Wentzel, Erik Mandrup, Rie Jensen
Kvalitetssikret af	Jan F. Nicolaisen
Godkendt af	Lea Bjerre Schmidt
Version	08
Udgivet	14-10-2021

Indholdsfortegnelse

1.	Ikke teknisk resumé	7
2.	Indledning	12
3.	Læsevejledning	13
4.	Projektbeskrivelse	14
4.1	Områdebeskrivelse	14
4.2	Ansøgningsområdet	15
4.3	Indvindingsmængder	16
4.4	Indvindingsmetode	17
4.5	Indvindingsperiode	18
4.6	Indvindingsressource	19
5.	Alternativer	20
5.1	0-alternativ	22
6.	Metodebeskrivelse	22
6.1	Vurderingsmetode og begreber	22
6.2	Miljøparametre og afgrænsning – vurderede/ikke vurderede	25
6.3	Potentielle påvirkninger	27
6.3.1	Arealinddragelse	28
6.3.2	Ændring af havbunden	28
6.3.3	Sedimentspredning	29
6.3.4	Støj og øvrige forstyrrelser	31
7.	Råstofeftersforskning – Fase IB	32
7.1	Undersøgellesprogram	32
7.2	Metode for substrattypindelning	33
7.3	Sammenfattende råstofvurdering	35
7.4	Afgrænsning af ansøgningsområde	36
8.	Miljøundersøgelser – Fase IIA	36
8.1	Metode	37
8.2	Naturtyper	37
8.2.1	Naturtype 1b - sandbundssamfund	41
8.2.2	Naturtype 2a - grusbundssamfund	44
8.2.3	Naturtype 2b – blandet bund med enkelte større sten	45

8.2.4	Andre observationer	46
8.2.5	Samlet vurdering af de biologiske værdier	46
9.	Miljøkonsekvensvurdering – Fase IIB	47
9.1	Havbund, dybde og dynamik	47
9.1.1	Metode	47
9.1.2	Eksisterende forhold	48
9.1.3	Miljøpåvirkninger	52
9.1.4	Sammenfattende vurdering	54
9.2	Flora og fauna	55
9.2.1	Metode	55
9.2.2	Eksisterende forhold	55
9.2.3	Miljøpåvirkninger	58
9.2.4	Sammenfattende vurdering	61
9.3	Fisk og erhvervsfiskeri	61
9.3.1	Metode	61
9.3.2	Eksisterende forhold	62
9.3.2.1	<i>Fiskeri</i>	70
9.3.2.2	<i>Samlet vurdering for fisk og fiskeri</i>	72
9.3.3	Miljøpåvirkninger	73
9.3.4	Sammenfattende vurdering	76
9.4	Fugle	76
9.4.1	Metode	76
9.4.2	Eksisterende forhold	77
9.4.2.1	<i>IBA nr. 121</i>	77
9.4.2.2	<i>Hav- og kystfugle</i>	77
9.4.2.3	<i>Områdets egnethed for rastende fugle</i>	85
9.4.3	Miljøpåvirkninger	85
9.4.4	Sammenfattende vurdering	89
9.5	Havpattedyr	89
9.5.1	Metode	89
9.5.2	Eksisterende forhold	89
9.5.3	Miljøpåvirkninger	93
9.5.4	Sammenfattende vurdering	96
9.6	Vandplaner, vandkvalitet og havstrategi	97
9.6.1	Metode	104

9.6.2	Eksisterende forhold	104
9.6.2.1	<i>Vandplaner og vandkvalitet</i>	104
9.6.2.2	<i>Havstrategi</i>	105
9.6.3	Miljøpåvirkninger	108
9.6.3.1	<i>Vandplaner og vandkvalitet</i>	108
9.6.3.2	<i>Havstrategi</i>	108
9.6.4	Sammenfattende vurdering	113
9.7	Marinarkæologiske interesser	114
9.7.1	Metode	114
9.7.2	Eksisterende forhold	114
9.7.3	Miljøpåvirkninger	117
9.7.4	Sammenfattende vurdering	118
9.8	Rekreative interesser	118
9.8.1	Metode	118
9.8.2	Eksisterende forhold	119
9.8.3	Miljøpåvirkninger	119
9.8.4	Sammenfattende vurdering	120
9.9	Sejladsforhold	120
9.9.1	Metode	120
9.9.2	Eksisterende forhold	120
9.9.3	Miljøpåvirkninger	121
9.9.4	Sammenfattende vurdering	123
9.10	Ammunition	124
9.10.1	Metode	124
9.10.2	Eksisterende forhold	124
9.10.3	Miljøpåvirkninger	124
9.10.4	Sammenfattende vurdering	125
9.11	Øvrige erhvervsinteresser	125
9.11.1	Metode	125
9.11.2	Eksisterende forhold	125
9.11.3	Miljøpåvirkninger	127
9.11.4	Sammenfattende vurdering	128
9.12	Kumulative effekter	128
9.12.1	Arealinddragelse	130
9.12.2	Sedimentspredning	130

9.12.3	Fisk	131
9.12.4	Fugle	132
9.12.5	Havpattedyr	132
9.12.6	Havstrategi	133
9.12.7	Sammenfatning	133
10.	Natura 2000-væsentlighedsvurdering	133
10.1	Lovgrundlag	133
10.2	Væsentlighedsvurderingen	134
10.3	Bilag IV-arter	135
10.4	Metode	136
10.5	Eksisterende forhold	136
10.5.1	Natura 2000-områder omkring ansøgningsområdet	136
10.5.1.1	<i>Habitatområderne</i>	139
10.5.1.2	<i>Fuglebeskyttelsesområder</i>	140
10.5.2	Bilag IV-arter	141
10.6	Miljøpåvirkninger	142
10.6.1	Habitatområderne	142
10.6.2	Fuglebeskyttelsesområderne	143
10.6.3	Bilag IV-arter	144
11.	Sammenfattende vurdering	145
12.	Afværgeforanstaltninger	146
13.	Overvågning	146
14.	Tekniske mangler og manglende viden	146
15.	Referencer	147

Bilagsfortegnelse

1. Logbog over visuelle verifikationer (ROV-video)

1. Ikke teknisk resumé

Baggrund

Nærværende Miljøkonsekvensrapport (VVM) er et teknisk bilag til Kystdirektoratets ansøgning om indvindingstilladelse i et nyt bygherreområde ud for Lodbjerg, foreløbigt benævnt Lodbjerg B. Det nye bygherreområde ønskes anvendt til sandfodring på Fællesaftalestrækning Lodbjerg-Nymindégab fortrinsvis på Agger Tange og Harboøre Tange hovedstrækningerne.

Den 116 km lange kyststrækning mellem Lodbjerg og Nymindégab er på næsten hele strækningen en tilbagerykningsskyst. Uden kystbeskyttelse ville den gennemsnitlige årlige tilbagerykning på størstedelen af strækningen ligge på 1-4 meter om året og helt op til 6-8 meter om året nord for Thorsminde. Den nuværende fællesaftale mellem kommunerne og staten omfatter perioden 2020-24 og består af en økonomisk ramme, hvor det overordnede mål er, at Vestkysten så vidt muligt bevares, som den er i dag ved at fastholde en naturlig bred strand, hvor kystens tilbagerykning bremses.


Sandfodringen på Lodbjerg-Nymindégab fællesaftalestrækningen udføres med sand, som indvindes fra Kystdirektoratets bygherreområder langs Vestkysten. De to bygherreområder Lodbjerg A og B skal erstatte Kystdirektoratets nuværende bygherreområde 562-OA Agger, der har vist sig ikke at være brugbart pga. for stor andel fint materiale og mange sten, samt sikre forsyningssikkerhed til den fremtidige sandfodring langs Lodbjerg-Nymindégab strækningen.

Kystdirektoratet ansøger derfor om tilladelse til indvinding af samlet 6,0 mio. m³ over en periode på 10 år, med årlig gennemsnitlig indvinding på 600.000 m³ og en maksimumindvinding (ekstremfodring) på 2,0 mio. m³ i ansøgningsområde Lodbjerg B (alle tal er i skibsmål = fastmål x 10%). Maksimumindvinding kan blive nødvendigt i forbindelse med storme og større erosionshændelser og forventes at kunne forekomme 0-2 gange i løbet af den 10-årige tilladelsesperiode.

Der er på denne baggrund foretaget geofysisk efterforskning af GEUS og miljøundersøgelser af WSP i efterforskningsområdet. WSP har på denne baggrund udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering for sandindvinding i ansøgningsområdet. Miljøkonsekvensvurderingen udarbejdes som et teknisk bilag til ansøgningen om indvindingstilladelse, og den vil sammen med de øvrige efterforskningsresultater indgå i ansøgningen om tilladelse til indvinding. Miljøkonsekvensvurderingen behandler de miljø- og naturmæssige konsekvenser i relation til en fuld udnyttelse af den ønskede indvindingsmængde. Der er desuden foretaget en Natura 2000-væsentlighedsvurdering.

Områdebeskrivelse

Ansøgningsområde Lodbjerg B ligger i Nordsøen ca. 15 km fra kysten ud for Nørre Vorupør, og 20 km NV for den nordlige ende af Lodbjerg-Nymindégab strækningen, hvor der sandfodres regelmæssigt.



Figur 1-1. Oversigtskort med angivelse af placeringen for ansøgningsområdet og påvirkningszone for Lodbjerg B. Derudover er der angivet Natura 2000-områder, råstofvindingsområder, samt klappladser ved Hanstholm mod nord, og Agger og Gåseholm mod syd, samt nyt fuglebeskyttelsesområde F126 og nye havstrategiområder B og F.

De nærmeste Natura 2000-områder er N219 Sandbanker ud for Thyborøn og N250 Gule Rev, der ligger hhv. ca. 21 km og 22 km fra ansøgningsområdet. Derudover ligger Natura 2000-området N247 Thyborøn Stenvolde ca. 30 km derfra og N28 Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø ca. 24 km væk (Figur 1-1). Natura 2000-område N1 Skagens Gren og Skagerrak i form af det nye fuglebeskyttelsesområde F126 Skagerrak ligger ca. 36 km fra ansøgningsområdet.

Andre råstofvindingsområder i området omfatter: Fællesområde 562-NA Jyske Rev C, som ligger ca. 4 km fra ansøgningsområdet. Herudover ligger der en hel del fællesområder særligt mod vest omkring Jyske Rev og mod syd ved Limfjordsåbningen. Kystdirektoratet har 3 mindre bygherreområder 562-OA Agger, 562-PA Thyborøn og 562-AE Thyborøn A ca. 15 til 30 km syd for ansøgningsområdet.

Hanstholm klapplads (K_161_01) og Hanstholm ny klapplads (K_161_03) ligger hhv. ca. 30 km og 32 km nordøst for, og Thyborøn Havn klapplads (K_161_02) ca. 22 km sydøst for ansøgningsområdet.

Der er udpeget flere nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen (Miljøministeriet, 2021). Ansøgningsområdet ligger ca. 27 km fra det nærmeste havstrategiområde B. Område F ligger ca. 41 km fra ansøgningsområdet og øvrige områder i mere end 100 km afstand.

Råstofressourcen

Ressourcemængden er beregnet til at være ca. 50 mio. m³. Den ansøgte indvindingsmængde på 6,0 mio. m³ udgør ca. 12% af den samlede råstofmængde i ansøgningsområdet.

Kornstørrelsesmiddelværdien af sandressourcen varierer mellem 0,3 og 0,4 mm, finstofindholdet <0,125 mm er gennemsnitligt 0,5-3% og glødetabet er ca. 0,3-0,5%. Havbundsoverfladen er i ressourceområdet domineret af dynamisk, sandet substrattypen 1b, med mindre områder af mere gruset og småstenet karakter i nogle af de dybe trug mellem sandbundformerne. Under råstofressourcen findes mere siltede-finsandede aflejringer. Havbundstypen (substrattypen i området) ændres dermed ikke, da der stadig vil være sandbund (substrattypen 1b) i området også efter indvindingens ophør.

Driftsaktiviteter

Kystdirektoratet ønsker at indvinde råstoffer, primært mellemkornet sand (0,3-0,6 mm), som benyttes til kystbeskyttelse af fællesaftalestrækning Lodbjerg-Nymindesø.

Indvindingen vil udelukkende foregå ved slæbesugning. Indvindingsskibet sejler direkte til fodringsstrækningen fra indvindingsområdet og sandfodrer enten som kystnær fodring ved klappning, rainbowing, en kombination af disse (50/50%), eller som strandfodring, hvor sandet placeres på stranden ved indpumpning gennem bundliggende rørledning eller flyderørledning fra skib.

Der vurderes for to af de ovenfor nævnte sandfodringsscenarier: klappning eller rainbowing af fuld indvindingsmængde. Disse to sandfodringsscenarier svarer til de to yderscenarier i forhold til tidsforbrug, spildmængde og perioden med øgede sedimentkoncentrationer i indvindingsområdet.

Antal skibe og laststørrelse for indvinding og efterfølgende fodring for de to yderscenarier i én kampagne omfatter (Rambøll, 2019b):

- klappning med 1-3 små skibe (å 2.000 m³) med lang varighed af indvinding/sandfodringsarbejdet
- rainbowing med 1-2 store skibe (å 21.000 m³) med kort varighed af indvinding/sandfodringsarbejdet.

Øvrige scenarier dvs. kombination af klappning/rainbowing 50/50% eller strandfodring er mellemscenarier, der vil medføre en påvirkning i forhold til bl.a. indvindingsperiode og øgede sedimentkoncentrationer i ansøgningsområdet mellem de to yderscenarier (Rambøll, 2019b). Andre mulige kombinationer af skibsantal og størrelse kan blive anvendt, men vil ligge indenfor de to yderscenarier og dermed være dækket af vurderingen i nærværende VVM.

Der kan maksimalt udføres 2 sandfodringskampagner ad gangen enten på samme hovedstrækning eller på to forskellige hovedstrækninger samtidigt fx Agger Tange og Harboøre Tange (= 2x antal skibe ved én kampagne). Fodringen ved to kampagner kan

altså maksimalt omfatte 2-4 store skibe (å 21.000 m³) eller 2-6 små skibe (å 2.000 m³), der sejler frem og tilbage mellem ansøgningsområdet og fodringsstrækningen.

En gennemsnitsindvinding kan udføres på samlet mellem ca. 4-88 dage/år og en maksimalfodring kan udføres på ca. 6-97 dage/år ved gennemførsel af én eller 2 kampagner samtidigt.

Skibene vil sejle frem og tilbage, så der løbende sandfodres på den kystnære havbund eller stranden, der kan dog i perioder opstå synkron indvinding i ansøgningsområdet. Der kan altså potentielt forekomme 1-6 skibe i ansøgningsområdet samtidigt ved udførsel af en til to kampagner samtidigt.

Ved slæbesugning sejler indvindingsskibet fremad med en jævn langsom fart og suger med et bagudrettet sugerør, der yderst er forsynet med et sugehoved. Metoden frembringer spor i havbunden svarende til sugehovedets bredde som er ca. 1,5-2 m bredde for små skibe (ca. 2.000 m³ laststørrelse) og ca. 4 m for store skibe (ca. 21.000 m³ laststørrelse). Sugesporene for tilsvarende størrelse skibe vil typisk efterlade sugespor i havbunden på ca. 0,5 op til 1,5 meters dybde. Den typiske sugedybde i det ansøgte område ved brug af mindre indvindingsfartøjer vil forventeligt frembringe ca. 0,5 m dybe sugespor, mens større fartøjer kan have en sugedybde på op til ca. 1,5 m.

Alternativer

Materialerne til brug for sandfodringen kan ikke hentes i eksisterende marine råstofområder, idet Miljøstyrelsen anbefaler, at materialer til egentlige større sandfodringsprojekter indvindes fra særskilte og ofte nye bygherreområder, som det er tilfældet for nærværende ansøgning.

Materialerne kan ligeledes ikke hentes på land, idet man skal sandfodre med samme type materialer, som pt. findes på strandene langs Lodbjerg-Nymindégab fællesaftalestrækningen. Materialer af samme type, som findes på strandene kan ikke findes i grusgrave på land.

Det er heller ikke muligt at erstatte den ansøgte råstofressource med oprensings- og uddybningsmateriale fra havne, da materialer, der oprenses i regionen, ikke har en sammensætning, der ligner sandet på strandene langs fællesaftalestrækningen. Sand fra indsejlinger og sejltrede, som bypass, indgår allerede i kystbeskyttelsen, men udgør et meget lille bidrag. Oprensnings- og uddybningsmateriale fra regionen vil ikke kunne erstatte indvindingsområderne, da det ikke vil være muligt at opnå den ønskede råstofressourcemængde.

Der kan derfor ikke peges på alternativer til indvinding af materialerne i ansøgningsområdet.

Påvirkninger på miljøet

De miljøforhold, som kan forventes at blive påvirket af indvindingsaktiviteten på såvel kort som på langt sigt ved en fuld udnyttelse af den ansøgte mængde vurderes i miljøkonsekvensrapporten.

De potentielle effekter af indvindingen, som vurderes omfatter:

- Arealinddragelse (det areal der påvirkes)
- Ændring af havbunden (ændring af dybde og substrattype)
- Sedimentspredning
- Støj (luft og under vand) og forstyrrelse

Arealpåvirkningen i ansøgningsområdet estimeres at være ca. 83% og 15,38 km², hvis den fulde råstofmængde på 6,0 mio. m³ indvindes over den 10-årige tilladelsesperiode. Ved en gennemsnitsfodring på 600.000 m³/år påvirkes et areal på ca. 1,28 km² svarende til 7% af ansøgningsområdet. Ved en maksimalfodring på 2,0 mio. m³, som kan blive anvendt efter en stormhændelse (maksimalt 0-2 gange over 10 år), påvirkes et havbundsareal på ca. 5,13 km² svarende til 28% af ansøgningsområdet. Disse beregninger er lavet under antagelse af, at indvindingen fordeles jævnt i ansøgningsområdet og er således den størst tænkelige arealpåvirkning. Da der ofte indvindes mere i de dele af et indvindingsområde, hvor sandtype/kornstørrelse er mest optimal, er den reelle påvirkning typisk mindre.

Den gennemsnitlige havbundssænkning (dybdeændring) i ansøgningsområdet over 10 år vil være ca. 32 cm. i de mest indvindingspåvirkede områder kan havbunden lokalt sænkes op til maksimalt ca. 1,5 meter.

På baggrund af miljøkonsekvensvurderingen kan det sammenfattende konkluderes, at indvindingen i ansøgningsområdet medfører en *Moderat* negativ påvirkning af bundflora og -fauna udelukkende indenfor selve ansøgningsområdet, ubetydelig påvirkning i påvirkningszonen og ingen påvirkning i Nordsøen udenfor påvirkningszonen. Alle øvrige påvirkninger i ansøgningsområdet er mindre til ingen. I påvirkningszonen og i Nordsøen udenfor vurderes påvirkningen som ubetydelig til ingen.

Natura 2000-områder

Råstofindvinding i ansøgningsområdet vil medføre sedimentspild og støj. De nærliggende Natura 2000-områder ligger >21 km fra ansøgningsområdet. På baggrund af Natura 2000-væsentlighedsvurderingen vurderes der ikke at være væsentlige påvirkninger af de nærliggende Natura 2000-områders udpegningsgrundlag i forhold til habitat- og fuglebeskyttelsesområder samt bilag IV-arter i området.

Afværgeforanstaltninger

Den ansøgte indvindingsaktivitet vurderes ikke at medføre væsentlige negative påvirkninger på områdets natur- og miljøforhold på kort eller lang sigt uden for ansøgningsområdet. På baggrund af denne vurdering vurderes der ikke at være behov for iværksættelse af særlige foranstaltninger som grundlag for en indvindingstilladelse.

2. Indledning

Nærværende Miljøkonsekvensrapport (VVM) er et teknisk bilag til Kystdirektoratets ansøgning om indvindingstilladelse i et nyt bygherreområde nord for Limfjordsåbningen foreløbigt benævnt Lodbjerg B. Det nye bygherreområde ønskes anvendt til sandfodring på Fællesaftalestrækning Lodbjerg-Nymindégab fortrinsvis på Agger Tange og Harboøre Tange strækningerne (Kystdirektoratet, 2021).

Den 116 km lange kyststrækning mellem Lodbjerg og Nymindégab er på næsten hele strækningen en tilbagerykningsskyst. Uden kystbeskyttelse ville den gennemsnitlige årlige tilbagerykning på størstedelen af strækningen ligge på 1-4 meter om året og helt op til 6-8 meter om året nord for Thorsminde (Rambøl, 2020b). Siden 1983 har kystbeskyttelsesindsatsen på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindégab været fastlagt på grundlag af femårige fællesaftaler mellem staten og det tidligere Ringkøbing Amt, som i dag er erstattet af de berørte Vestkystkommuner (Rambøll, 2020a). Den nuværende fællesaftale mellem kommunerne og staten omfatter perioden 2020-24 og består af en økonomisk ramme, hvor det overordnede mål er, at Vestkysten så vidt muligt bevares, som den er i dag ved at fastholde et naturligt kystprofil med en naturlig bred strand, hvor kystens tilbagerykning bremses. Sandfodring og tilhørende sandindvinding i bygherreområde Lodbjerg B forventes at fortsætte i efterfølgende aftaleperioder (Rambøll, 2020a)

Sandfodringen på Lodbjerg-Nymindégab fællesaftalestrækningen udføres fra Kystdirektoratets bygherreområder langs Vestkysten (Figur 5-1) (Rambøll, 2020a). De to bygherreområder Lodbjerg A og B skal erstatte Kystdirektoratets nuværende bygherreområde 562-OA Agger, der har vist sig ikke at være brugbart pga. for stor andel fint materiale og mange sten. Kystdirektoratet ansøger om tilladelse til indvinding i både Lodbjerg A og B området for at have forsyningssikkerhed. Lodbjerg A er tættest på fodringsstrækningen, men sandet er mere heterogent end i ansøgningsområde Lodbjerg B. Det er derfor nødvendigt at ansøge i begge områder for at sikre forsyningssikkerhed af en optimal sandtype/kornstørrelse.

Kystdirektoratet ansøger derfor om tilladelse til indvinding af samlet 6,0 mio. m³ over en periode på 10 år, med gennemsnitlig indvinding på 600.000 m³/år og en maksimumindvinding (ekstremfodring) i forbindelse med større erosionshændelser på 2,0 mio. m³ i ansøgningsområde Lodbjerg B (alle tal er i skibsmål = fastmål x 10%). Maksimumsindvinding forventes at kunne forekomme 0-2 gange i løbet af den 10-årige tilladelsesperiode.

Der er på denne baggrund foretaget geofysisk efterforskning af GEUS og miljøundersøgelser af WSP i efterforskningsområdet. WSP har på denne baggrund udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering for sandindvinding i ansøgningsområdet.

Afrapporteringen følger krav til efterforskning og metode i forbindelse med råstofefterforskningen (jf. BEK.nr. 1680 af 17/12/2018) og krav til udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten i sager omfattet af §11, stk. 1 (LBK nr. 973 af 25/06/2020, Bilag 7).

Der er desuden udarbejdet en Natura 2000-væsentlighedsvurdering for de nærliggende Natura 2000-områder og deres udpegningsgrundlag (jf. Habitatbekendtgørelsen BEK nr. 1595 af 06/12/2018 og Råstofbekendtgørelsen).

3. Læsevejledning

Efterforskning af råstoffer er gennemført i det fulde efterforskningsområde for Lodbjerg B kaldet **undersøgelsesområdet**. De geofysiske undersøgelserne er derefter anvendt til udpegning af et ansøgningsområde, hvor råstofindvindingen ønskes tilladt, samt en omgivende 500 m påvirkningszone (se Figur 4-2).

De følgende områdebetegnelser anvendes i forbindelse med efterforskning og ansøgning om indvinding af råstoffer i område Lodbjerg B. Se afgrænsningerne på Figur 4-2.


- **Lodbjerg B** er det potentielle indvindingsområde jf. efterforskningstilladelsen. Lodbjerg B har et areal på 18,5 km².
- **Fase IA - Efterforskningsområde:**
Det område, hvor Kystdirektoratet har fået tilladelse til råstofefterforskning (Lodbjerg B + en 500 m bred omkringliggende zone) også kaldet område for fase IA-undersøgelsen. Afgrænsningens koordinater er angivet Tabel 4-3. Efterforskningsområdet omfatter et areal på 43,2 km².
- **Fase 1IB - Efterforskningsområde:**
Det område, hvor Kystdirektoratet har fået tilladelse til råstofefterforskning (Lodbjerg B + en 500 m bred omkringliggende zone) også kaldet Fase IB efterforskningsområde. Området afgrænses af rette linjer mellem punkterne, som er angivet Tabel 4-2. Efterforskningsområdet omfatter et areal på 29,0 km².
- **Undersøgelsesområde:**
Svarer til Fase IB – efterforskningsområdet, og bruges generelt i forbindelse med miljøundersøgelsen og miljøkonsekvensvurderingen.
- **Ansøgningsområde**
Det område, hvori der ansøges om indvindingstilladelse og svarer i denne ansøgning til Lodbjerg B området minus påvirkningszone. Området udgør et areal på 18,5 km². Ansøgningsområdets afgrænsning er angivet i Tabel 4-1
- **Påvirkningszone**
Det område, som potentielt kan påvirkes af indvindingen svarende til en 500 m bred zone omkring ansøgningsområdet området. Påvirkningszonen omfatter et areal på 10,5 km². Påvirkningszonens afgrænsning er lig undersøgelsesområdet og Fase IB efterforskningsområdet. Påvirkningszonens afgrænsning er angivet i Tabel 4-2.

4. Projektbeskrivelse

4.1 Områdebeskrivelse

Ansøgningsområde Lodbjerg B ligger i Nordsøen ca. 15 km fra kysten ud for Nørre Vorupør, og 20 km NV for den nordlige ende af Lodbjerg-Nyminddegab strækningen, hvor der sandfodres regelmæssigt.

De nærmeste Natura 2000-områder er N219 *Sandbanker ud for Thyborøn* og N250 *Gule Rev*, der ligger hhv. ca. 21 km og 22 km fra ansøgningsområdet. Derudover ligger Natura 2000-området N247 *Thyborøn Stenvolde* ca. 30 km derfra og N28 *Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø* ca. 24 km væk (Figur 4-1). Natura 2000-område N1 *Skagens Gren og Skagerrak* i form af det nye fuglebeskyttelsesområde F126 Skagerrak ligger ca. 36 km fra ansøgningsområdet.



Figur 4-1. Oversigtskort med angivelse af placeringen for ansøgningsområdet, påvirkningszone og efterforskningsområde Lodbjerg B. Derudover er der angivet Natura 2000-områder, råstofvindingsområder, samt klappladser ved Hanstholm mod nord, og Agger og Gåseholm mod syd, samt nyt fuglebeskyttelsesområde F126 og nye havstrategiområder B og F.

Fællesområde 562-NA Jyske Rev C ligger ca. 4 km fra ansøgningsområdet. Herudover ligger der en hel del fællesområder særligt mod vest omkring Jyske Rev og mod syd ved Limfjordsåbningen (se Figur 4-1).

Kystdirektoratet har 3 mindre bygherreområder 562-OA Agger, 562-PA Thyborøn og 562-AE Thyborøn A ca. 15 til 30 km syd for ansøgningsområdet.


Hanstholm klapplads (K_161_01) og Hanstholm ny klapplads (K_161_03) ligger hhv. ca. 30 km og 32 km nordøst for, og Thyborøn Havn klapplads (K_161_02) ca. 22 km sydøst for ansøgningsområdet.

Fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindesø ligger langs kysten og starter ca. 20 km sydøst for ansøgningsområdet. Sandet, der indvindes i ansøgningsområdet, vil blive anvendt til strandfodring og kystnær fodring, fortrinsvis på den del af fællesaftalestrækningen, der ligger nord og syd for Limfjordsåbningen – Agger Tange og Harboøre Tange.

Der er udpeget flere nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen (Miljøministeriet, 2021). Ansøgningsområdet ligger ca. 27 km fra det nærmeste havstrategiområde B. Område F ligger ca. 41 km fra ansøgningsområdet og øvrige områder i mere end 100 km afstand.

4.2 Ansøgningsområdet

Ansøgningsområdet er vist med påvirkningszone og efterforskningsområdet på Figur 4-2 nedenfor.



Figur 4-2. Oversigt over områdebetegnelserne: ansøgningsområdet, påvirkningszone (=Fase IB Efterforskningsområde = undersøgelsesområdet) og Fase 1A - efterforskningsområdet.

Afgrænsninger med rette linjer mellem hjørnekoordinater for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og efterforskningsområderne (Fase 1A og IB) er angivet i tabellerne nedenfor.

Tabel 4-1. Hjørnekoordinater for ansøgningsområde Lodbjerg B.

UTM 32N EUREF89		Grader og decimalminutter WGS84	
Easting (m)	Northing (m)	Østlig Længde	Nordlig Bredde
442.313,25	6.319.638,83	8°02,997'	57°00,998'
447.706,24	6.319.495,51	8°08,327'	57°00,959'
443.575,39	6.315.327,06	8°04,302'	56°58,684'
439.555,45	6.317.971,16	8°00,296'	57°00,078'

Tabel 4-2. Hjørnekoordinater for påvirkningszonen omkring ansøgningsområdet (Fase IB – Efterforskningsområdet / Undersøgelsesområdet).

UTM 32N EUREF89		Grader og decimalminutter WGS84	
Easting (m)	Northing (m)	Østlig Længde	Nordlig Bredde
442.179,97	6.320.142,54	8°02858	57°01269
448.875,05	6.319.964,62	8°09476	57°01220
443.642,50	6.314.684,45	8°04377	56°58338
438.618,57	6.317.988,92	7°59371	57°00080

Tabel 4-3. Hjørnekoordinater for Fase 1IA - Efterforskningsområdet.

UTM 32N EUREF89		Grader og decimalminutter WGS84	
Easting (m)	Northing (m)	Østlig Længde	Nordlig Bredde
436.662,49	6.316.807,05	7°57,457'	56°59,428'
442.555,56	6.313.587,74	8°03,319'	56°57,739'
449.402,18	6.320.497,09	8°09,991'	57°01,511'
442.798,83	6.320.517,64	8°03,465'	57°01,475'

4.3 Indvindingsmængder

Sandfodringen på hovedstrækningerne gennemføres enten som normalkampagner (strandfodring og kystnær fodring) eller en ekstremkampagne svarende til ca. tre års mængder på et år (ekstremfodring/ekstremkampagne), afhængigt af behov (Rambøll, 2019b). Ekstremkampagner kan potentielt være nødvendige efter stormhændelser og større erosion af kysten og udgør den maksimale mængde, der kan forventes indvundet i ansøgningsområdet i et år (= 2,0 mio. m³). Maksimumsfodring forventes at kunne forekomme 0-2 gange i løbet af den 10-årige tilladelsesperiode.


Kystdirektoratet ansøger derfor om tilladelse til indvinding i ansøgningsområde Lodbjerg B af samlet 6,0 mio. m³ (skibsmål = fastmål i m³*10%) over en periode på 10 år, med årlig gennemsnitlig indvinding på ca. 600.000 m³ (skibsmål) og en årlig maksimumindvinding i forbindelse med større erosionshændelser på 2,0 mio. m³ (skibsmål).

Mængderne, der indvindes i ansøgningsområdet, vil variere efter behov og maksimalt være 2,0 mio. m³/år (skibsmål). Det indvundne sand vil fortrinsvis blive anvendt på de to nordligste hovedstrækninger - Agger Tange og Harboøre Tange, men kan også indgå

i sandfodringen af andre hovedstrækninger på fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindégab efter behov. De indvundne mængder i Lodbjerg B området dækker således flere hovedstrækninger for så vidt angår mængder og indvindingsperioder.

4.4 Indvindingsmetode

Indvindingen vil foregå ved slæbesugning (Figur 4-3). Ved slæbesugning sejler indvindingsfartøjet fremad med en jævn langsom fart (ca. 0,5-3 knob) og suger med et bagudrettet sugerør, der yderst er forsynet med et sugehoved (Figur 4-3). Der benyttes således ikke opankring til indvindingen. Metoden frembringer spor i havbunden svarende til sugehovedets bredde. For nærværende projekt forventes sugehovedets bredde typisk at være 1,5-2 m for små skibe (ca. 2.000 m³ last) og op til ca. 4 m for store skibe (ca. 21.000 m³ last). Den typiske sugedybde i det ansøgte område ved brug af mindre indvindingsfartøjer vil forventeligt frembringe ca. 0,5 m dybe sugespor, mens store fartøjer kan have en sugedybde på op til ca. 1,5 m.



Figur 4-3. Skitse af metoden bag slæbesugning (Kystdirektoratet, 2012).

Yderscenerierne for indvinding og sandfodring mht. antallet af skibe og lastkapacitet i (m³) anvendt ved én kampagne er:

- klapning med 1-3 små skibe (å 2.000 m³) med lang varighed af indvinding/sandfodringsarbejdet
- rainboring med 1-2 store skibe (å 21.000 m³) med kort varighed af indvinding/sandfodringsarbejdet.

Strandfodring kan ske med de samme skibsstørrelser og lastkapacitet som nævnt ovenfor og er derfor ikke et separat scenarie men inkluderet i det listede scenarier ovenfor.

Øvrige scenarier dvs. kombination af klapning/rainboring 50/50% eller strandfodring er mellemscenarier, der vil medføre en påvirkning, i forhold til indvindingsperiode og øgede sedimentkoncentrationer i ansøgningsområdet, mellem de to yderscenarier (Rambøll,

2019b). Mellemscenariet for 50% klappning og 50% rainbowing er vist i Tabel 4-4 udført med 2 skibe á 6.000 m³ lastkapacitet. Andre mulige kombinationer af skibsantal og størrelse kan blive anvendt, men vil ligge indenfor for de to yderscenerier og vil dermed være dækket af nærværende VVM.

Der kan maksimalt udføres 2 kampagner ad gangen enten på samme hovedstrækning eller på to forskellige hovedstrækninger samtidigt fx Agger Tange og Harboøre Tange (= 2x antal skibe ved én kampagne). Fodringen ved to kampagner kan altså maksimalt omfatte 2-4 store skibe (á 21.000 m³) eller 2-6 små skibe (á 2.000 m³), der sejler frem og tilbage mellem ansøgningsområdet og fodringsstrækningen.

Skibene vil sejle frem og tilbage, så der løbende sandfodres på den kystnære havbund eller stranden, der kan dog i perioder opstå synkron indvinding i ansøgningsområdet. Der kan altså potentielt forekomme 1-6 skibe i ansøgningsområdet samtidigt ved udførsel af en til to kampagner samtidigt.

4.5 Indvindingsperiode

Indvindingen kan foregå hele året og 24 timer i døgnet.

Tidsforbruget for råstofindvindingen i ansøgningsområdet vil være den samme som for sandfodringen på kysten, hvor sandet indvindes i ansøgningsområdet parallelt med sandfodringen på kysten.

Der kan dog ikke sammenlignes direkte med tidsforbruget, angivet i "VVM for kystbeskyttelse på Lodbjerg-Nymindégab fællesaftalestrækningen" (Rambøll, 2019b), for de enkelte hovedstrækninger, da sandet fra Lodbjerg B forventes anvendt fortrinsvis på Agger Tange og Harboøre Tange hovedstrækningerne, men dette kan også indgå i fodringsmængderne på andre strækninger efter behov.

Scenarierne for størrelse og antal af skibe er det samme, som anvendt i "VVM for kystbeskyttelse på Lodbjerg-Nymindégab fællesaftalestrækningen" (Rambøll, 2020b) og beregningerne af indvindingsperioden i antal dage for de ansøgte mængder i ansøgningsområde Lodbjerg B er vist i Tabel 4-4.

Tallene i Tabel 4-4 angiver yderscenerierne i forhold til tidsforbrug og øgede sedimentkoncentrationer for indvindingen i Lodbjerg B ansøgningsområdet og den samtidige sandfodring. Dvs. skibene indvinder og fylder lasten med sand i ansøgningsområdet og sejler derefter til fodringsstrækningen, hvor der klappes, rainbowes, klappes og rainbowes (50/50%), eller strandfodres. Strandfodring kan ske med de samme skibsstørrelser og lastkapacitet, som nævnt ovenfor, og vil medføre et tidsforbrug, som ligger indenfor de to yderscenerier.

Yderscenerierne, og baggrunden for at de er valgt, er detaljeret beskrevet i bilagsrapporten til "VVM for kystfodring på Lodbjerg-Nymindégab fællesaftalestrækningen" (Rambøll, 2020b). Mellemscenariet for 50% klappning og 50% rainbowing med skibe med 6.000 m³ lastkapacitet er også vist i Tabel 4-4. Andre

kombinationer indenfor yderscenarierne i forhold til laststørrelse og antal skibe kan forekomme i det endelige projekt, idet entreprenøren endnu ikke er kendt for hele den 10-årige periode.

Tabellen viser at råstofindvindingen vil pågå i ansøgningsområdet samlet ca. 4-88 dage/år ved en gennemsnitsfodring og ca. 6-97 dage/år ved en maksimumindvinding afhængigt af anvendelsen af antal skibe, lastkapacitet og om der fodres på én eller 2 hovedstrækninger samtidigt. Der vil aldrig blive indvundet mere end maksimalt 2,0 mio. m³ i ansøgningsområdet pr år og ved fodring på 2 hovedstrækninger samtidigt betyder det, at de 2,0 mio. m³ fordeles over de 2 strækninger.

Antallet af dage der indvindes er længst ved anvendelsen af 1-6 små skibe med lastkapacitet på 2.000 m³, og kortest ved anvendelsen af 2-4 store skibe samtidigt med lastkapacitet på 21.000 m³.


*Tabel 4-4. Tidsforbrug (netto antal dage) for indvinding i ansøgningsområdet i forbindelse med samtidig klapning og rainbowing på Lodbjerg-Nymindegab fællesaftalestrækningen med angivelse af antal skibe og tidsforbrug for en gennemsnitsindvinding og maksimumindvinding/ekstremfodring ved én eller 2 samtidige kampagner (Rambøll, 2019b). Indvindingsperioden er det totale antal dage indvindingen vil tage ved den givne lastkapacitet og antal skibe – dagene ligger ikke nødvendigvis i forlængelse af hinanden. Det er antaget, at der kan hentes ca. 3,8 laster/skib/dag for store skibe (21.000 m³) og ca. 3,4 laster/skib/dag for små (2.000 m³) og mellemstørrelses (6.000 m³) skibe (beregnet af KDI for Lodbjerg B). Dvs. det tager gennemsnitligt 6.25 eller 7 timer at indvinde, sejle til fodringsstrækningen og returnere igen til indvindingsområdet. *Der vil ikke blive anvendt 1 lille skib med lastkapacitet på 2.000 m³ til en maksimalindvinding, da dette vil tage alt for lang tid. Tallene er afrundede.*

Antal skibe og lastkapacitet pr kampagner	Gn. indvinding 600.000 m ³ /år (én kampagne)	Maksimal-indvinding 2 mio. m ³ (én kampagne)	Maksimal indvinding 2 mio. m ³ (2 kampagner)
Klapning med 1 skib á 2.000 m ³	88	*	*
Klapning med 3 skibe á 2.000 m ³	29	97	49
Klapning/rainbowing 50/50% med 2 mellem skibe á 6.000 m ³	15	49	24
Rainbowing med 1 skib á 21.000 m ³	7	25	12
Rainbowing med 2 skibe á 21.000 m ³	4	12	6

4.6 Indvindingsressource

Beskrivelsen af de geofysiske undersøgelser i ansøgningsområdet er baseret på de eksisterende geofysiske undersøgelser udført i området af GEUS i 2020 (GEUS, 2021a) se nærmere beskrivelse i Kapitel 7.

Seismisk tolkning sammenholdt med boringsresultater viser, at der fordelt over hele Lodbjerg B undersøgelsesområdet, forefindes en relativ homogen ressourceforekomst af marine sandede aflejringer, der opfylder KDI's kravsspecifikationer (Figur 4-4). Ressourcen består af øvre holocæne, marine aflejringer, har en varierende tykkelse på 1-8 m og er defineret af store tværgående sandrygge orienteret NV-SØ. Sandryggene er mest veldefinerede i områdets centrale til østlige del.



Figur 4-4. Ressourcekort med angivelse af ressourcetykkelser i undersøgelsesområdet. Konturintervaller er 1m. Kilde: (GEUS, 2021a).

Ressourcemængden er beregnet til at være ca. 50 mio. m³, hvoraf den ansøgte mængde på 6,0 mio. m³ udgør ca. 12% heraf. Grundet den ressourcemæssige homogene karakter, må dette tal anses for at være relativt nøjagtigt (GEUS, 2021a).


Kornstørrelsesmiddelværdien af sandressourcen varierer mellem 0,3 og 0,4 mm, finstofindholdet <0,125 mm er gennemsnitligt 0,5-3% og glødetabet er ca. 0,3-0,5%.

Havbundsoverfladen er i ressourceområdet domineret af dynamisk, sandet substrattypen 1b, med mindre områder af mere gruset og småstenet karakter i nogle af de dybe trug mellem sandbundformerne. Under ressourceforekomsten findes ældre holocæne siltede-finsandede marine aflejringer, som er dokumenteret af enkelte fase 1a borekerner.

5. Alternativer

De to øvre hovedstrækninger nord og syd for Limfjorden - Agger Tange og Harboøre Tange på Lodbjerg-Nymindesgab fællesaftalestrækningen har tidligere været fodret med sand fra de nærmeste bygherreområder: bygherreområde 562-PA Thyborøn og 562-AE Thyborøn A. Bygherreområde 562-OA Agger har været brugt i begrænset omfang,

idet indholdet af fint stof i sandet er for højt (20%), og da der er mange sten. Kystdirektoratet har derfor brug for nye bygherreområder (Lodbjerg A og B) i dette område, som kan dække behovet for egnet sand til sandfodringen på især Agger Tange og Harboøre Tange i fremtiden. Anvendelse af de mere sydlige bygherreområder (562-AD Ferring og 578-AA Husby Klit) tager lang tid, er omkostningstunge og medfører en større klimapåvirkning sammenlignet med sand hentet tæt på fodringsstrækningen. Ressourcen herfra skal samtidig levere til den øvrige del af fællesafalestrækningen.



Figur 5-1. Lodbjerg-Nyminddegab fællesstrækningen er markeret med rød. Indvindingsområder beliggende i Nordsøen er markeret som skraverede polygoner. Kilde: (Rambøll, 2020b).

Materialerne til brug for sandfodringen kan generelt ikke hentes i eksisterende marine fællesområder, idet de eksisterende fællesområder er tiltænkt den nationale råstofhusholdning (kvalitetsmaterialer til infrastruktur og byggeri mm). Miljøstyrelsen

anbefaler derfor, at materialer til egentlige større sandfodringsprojekter indvindes fra særskilte og ofte nye bygherreområder, som det er tilfældet for nærværende ansøgning.

Materialerne kan ligeledes ikke hentes på land, idet man skal sandfodre med samme type materialer, som pt. findes på stranden på strækningerne. Materialer af samme kvalitet, som findes på strandene kan ikke findes på land.

Det er heller ikke muligt at erstatte den ansøgte råstofressource med oprensings- og uddybningsmateriale fra havne, da materialer, der oprenses i regionen, ikke har en sammensætning, der ligner sandet på strandene langs fællesaftalestrækningen. Sand fra indsejlinger og sejltrede, som bypass, indgår allerede i kystbeskyttelsen, men udgør et meget lille bidrag. Oprensings- og uddybningsmateriale fra regionen vil ikke kunne erstatte indvindingsområderne, da det ikke vil være muligt at opnå den ønskede råstofressourcemængde.

Der kan derfor ikke peges på alternativer til indvinding af materialerne ansøgningsområdet.

5.1 0-alternativ

0-alternativet er den situation, hvor der ikke gives tilladelse til indvindingen, og den dermed ikke gennemføres. Hvis indvindingen ikke gennemføres, vil der ikke være en påvirkning af det marine miljø fra indvinding på havbunden.

Egnede råstofressourcer er nødvendige for at kunne fortsætte sandfodringen på Lodbjerg-Nymindesgab fællesaftalestrækningen og dermed fortsat hindre kysttilbagerykningen på strækningen. De to bygherreområder Lodbjerg A og B skal erstatte Kystdirektoratets nuværende bygherreområde 562-OA Agger, der har vist sig ikke at være brugbart pga. for stor andel fint materiale og mange sten. Den 116 km lange kyststrækning mellem Lodbjerg og Nymindesgab er på næsten hele strækningen en tilbagerykningskyst. Uden yderligere sandfodring vil den årlige tilbagerykning af kysten derfor på størstedelen af strækningen i gennemsnit ligge på 1-4 meter om året, og helt op imod 6-8 meter i gennemsnit om året nord for Thorsminde. Tilbagerykningen af kysten kan dog variere meget fra år til år på de enkelte strækninger. Ved akut tilbagerykning i forbindelse med storme, er der observeret et tilfælde med erosion på op til ca. 42 meter (Rambøll, 2020a).

6. Metodebeskrivelse

I det følgende gennemgås vurderingsmetoden, og miljøparametrene beskrives og afgrænses. Derudover gennemgås de enkelte potentielle påvirkninger, som kan have en væsentlig effekt på de nævnte miljøforhold.

6.1 Vurderingsmetode og begreber

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af hvilke metoder, der er anvendt til forudberegning af de miljømæssige påvirkninger. 'Forudberegning' er i relation til denne miljøkonsekvensvurdering tolket bredt og omfatter således både faglige vurderinger baseret på eksisterende viden, videnskabelige rapporter og artikler,

validt referencemateriale, kortlægning af substrat- og naturtyper vha. geofysiske metoder, screening af fysisk-biologiske parametre ved visuelle verifikationer og erfaringer fra miljøundersøgelser af råstofindvinding i andre råstofområder i de danske farvande.

I Råstofbekendtgørelsen (BEK nr. 1680 af 17/12/2018) anføres en række kriterier, der anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan medføre væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor er VVM-pligtigt. Det anføres bl.a., at et anlægs miljøpåvirkning skal vurderes i sammenhæng med anlæggets karakteristika (herunder kumulation med andre projekter) og placering (herunder omgivelsernes sårbarhed). I miljøvurderingen foretages en vurdering under hensyn til påvirkningens omfang, graden og kompleksiteten af påvirkningerne samt disses varighed, sandsynlighed, hyppighed og reversibilitet.

Der eksisterer ikke nogen officiel terminologi eller graduering vedrørende vurdering af potentielle påvirkninger. I denne miljøkonsekvensvurdering anvendes en række begreber og en terminologi, der er beskrevet nedenfor;

Omfanget af miljøpåvirkningen relaterer til det geografiske område, der påvirkes og vurderes som *lokal*, *regional*, *national* eller *grænseoverskridende*. Lokale påvirkninger er begrænset til projektområdet og dets umiddelbare nærhed, mens regionale påvirkninger kan strække sig længere væk fra projektområdet. Påvirkninger, der rækker ud over dette område, betegnes som nationale eller evt. som grænseoverskridende.

Grad og kompleksitet af påvirkningen vurderes samlet som *ingen/ubetydelig*, *lille (lav)*, *middel* eller *stor (høj)*. En stor påvirkning indebærer, at en vigtig miljømæssig funktion går tabt. Kompleksiteten inddrages bl.a. ved at påvirkninger af hele systemer, f.eks. et fødenet som alt andet lige, vægtes højere end påvirkninger af en enkelt art.

Der findes både direkte og indirekte påvirkninger, hvilket kan øge kompleksiteten. Ved direkte påvirkning kan kilden påvirke modtageren direkte, mens indirekte påvirkning forekommer ved at et mellemled påvirkes, hvorefter påvirkningen går videre til modtageren.

Varigheden af miljøpåvirkningen vurderes som *kort*, *mellemlang* eller *lang*. Kortvarige påvirkninger stopper, når den pågældende aktivitet ophører eller inden for <1 år, mens midlertidige påvirkninger varer fra 1-5 år og langvarige påvirkninger mere end 5 år.

Reversibilitet er nært knyttet til påvirkningens varighed. Klassificering af en påvirkning som kort eller mellemlang forudsætter, at miljøtilstanden vender tilbage til udgangspunktet efter påvirkningens ophør (fuld reversibilitet), mens helt eller delvist irreversible påvirkninger altid vil blive klassificeret som langvarige. Længerevarende påvirkninger bør således karakteriseres yderligere efter deres reversibilitet. Det er dog langt fra altid, at den eksisterende viden om det økologiske system eller fysiske forhold er tilstrækkelig til, at dette er muligt.

Den overordnede betydning vurderes ud fra en samlet afvejning af graden af påvirkning og påvirkningens omfang, varighed og reversibilitet. Terminologien, der er anvendt i miljøkonsekvensvurderingen er defineret i Tabel 6-1. Det skal bemærkes, at tabellen viser typiske kombinationer af de anvendte kriterier, men ikke samtlige, mulige kombinationer.

Tabel 6-1. Den anvendte terminologi vedrørende den overordnede betydning af påvirkninger og de dertil knyttede kriterier. Tabellen viser princippet i klassifikationen, men ikke samtlige kombinationsmuligheder af omfang, graden af påvirkning, varighed og reversibilitet.

Den overordnede betydning	Kriterier
Positiv påvirkning	Påvirkningen vurderes at udgøre en forbedring af miljøtilstanden i forhold til udgangspunktet
Ingen / neutral påvirkning	Ingen påvirkning i forhold til udgangspunktet, eller positive og negative effekter ophæver hinanden
Ubetydelig negativ påvirkning	Påvirkninger af lokal eller højest regionalt omfang, hvor graden af påvirkning vurderes som lav. Varigheden kan være kort (f.eks. påvirkninger knyttet til anlægsfasen) eller lang (f.eks. påvirkninger knyttet til driftsfasen), men altid med fuld reversibilitet
Mindre negativ påvirkning	Påvirkninger af lokalt omfang med middel påvirkningsgrad og kortvarig eller mellemlang varighed. Påvirkninger af regionalt omfang med lav grad af påvirkning og kort, mellemlang eller lang varighed eller med middel påvirkningsgrad og kort varighed. Effekterne skal i alle tilfælde være fuldt reversible
Moderat negativ påvirkning	Middel grad af påvirkning med mellemlang eller lang varighed, eller høj grad af påvirkning med kort varighed. Effekterne skal som udgangspunkt være reversible og begrænset til det regionale område, men kan ved middel grad af påvirkning have et større omfang i en kort periode
Væsentlig negativ påvirkning	Påvirkninger klassificeres som væsentlig, hvis påvirkningsgraden er høj og varigheden mellemlang eller lang. Tilfælde af middel grad af påvirkning kan også klassificeres som væsentlig, hvis effekterne er nationale eller grænseoverskridende, eller påvirkningerne er helt eller delvist irreversible

Vurderingen af den overordnede betydning af en påvirkning er nært knyttet til vurderingen af behovet for afværgeforanstaltninger. Ved væsentlige eller moderate påvirkninger kan det være nødvendigt at gennemføre foranstaltninger for at undgå, nedbringe eller neutralisere de skadelige påvirkninger på miljøet. Disse foranstaltninger vil typisk blive knyttet til den senere tilladelse som vilkår.

Sammenhængen mellem den overordnede betydning af en påvirkning og behovet for afværgeforanstaltninger er skitseret i Tabel 6-2

Tabel 6-2 Sammenhæng mellem betydningen af en påvirkning og behovet for afværgeforanstaltninger.

Overordnet betydning	Vurderet behov for afværgeforanstaltninger
Positiv påvirkning	Intet behov for afværgeforanstaltninger
Ingen / neutral påvirkning	
Ubetydelig negativ påvirkning	
Mindre negativ påvirkning	Påvirkningen anses for så lille, at afværgeforanstaltninger ikke er påkrævede, men kan gennemføres i det omfang, det ikke er uforeneligt med andre hensyn
Moderat negativ påvirkning	Påvirkningen har et omfang, hvor afværgeforanstaltninger kan overvejes.
Væsentlig negativ påvirkning	Påvirkningen er så alvorlig, at man bør overveje, at ændre projektet eller gennemføre afværgeforanstaltninger for at mindske denne påvirkning.

Tabel 6-3 illustrerer, hvordan vurdering af miljøpåvirkninger opsummeres. Tabellen angiver:

- 1) Omfang af påvirkning
- 2) Grad af påvirkning
- 3) Varighed og reversibilitet af påvirkning
- 4) Overordnet betydning

Tabel 6-3 Eksempel på en tabel for en konkret miljøpåvirkning.

Tema: xxxx				
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)				
Påvirkning	Omfang	Grad	Varighed (Reversibilitet)	Overordnet betydning
xxxx	Regional	Middel	Kort	Mindre

6.2 Miljøparametre og afgrænsning – vurderede/ikke vurderede

Råstofbekendtgørelsen (Bilag 3) angiver, at der i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten skal laves en beskrivelse af de miljøforhold, som i væsentlig grad kan blive berørt af det foreslåede projekt og en beskrivelse af indvindingens betydelige virkninger på området og omgivelserne, herunder navnlig fauna, flora, havbund, vandmiljø, luft, den arkæologiske kulturarv, kystsikkerhed, fiskeri, sejlads og rekreative interesser, geologiske interesser, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, skibs- og luftfarten samt strøm- og bundforhold og den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer.

Følgende miljøforhold vurderes i nærværende miljøkonsekvensrapport:

- Havbund, dybde og dynamik (strøm- og bundforhold)

-
- Flora og fauna
 - Fisk og erhvervsfiskeri
 - Fugle
 - Havpattedyr
 - Vandplaner, vandkvalitet og Havstrategi
 - Marinarkæologiske interesser
 - Rekreative interesser
 - Sejladsforhold
 - Ammunition
 - Øvrige erhvervsinteresser
 - Kumulative effekter
 - Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV arter
 - Afværgeforanstaltninger

Miljøforhold, som potentielt ikke påvirkes væsentligt, som følge af indvindingen vurderes ikke som en del af miljøkonsekvensvurderingen. I nedenstående listes de miljøforhold, der ikke vurderes, og der gives en saglig begrundelse herfor.

De følgende miljøforhold vurderes ikke i miljøkonsekvensvurderingen:

- Befolkning og sundhed
- Kystmorfologi
- Risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten (kystsikkerhed)
- Geologiske interesser
- Luft og klima
- Infrastruktur anlæg, herunder energiproducerende anlæg og strækningsanlæg
- Kabler
- Luftfart

I nedenstående gives en begrundelse for, hvorfor disse miljøforhold ikke er vurderet i miljøkonsekvensvurderingen.

Befolkning og sundhed

Indvinding kan potentielt påvirke befolkningen og dennes sundhed såfremt aktiviteterne foregår kystnært nær beboede områder. Ansøgningsområdet ligger >15 km fra kysten og således ikke i nærheden af beboede områder. Ydermere ligger ansøgningsområdet nær andre råstofområder (se Figur 4-1), hvor der har foregået indvinding i en årrække uden, at der har været problemer i forhold til befolkningen og dennes sundhed.

Kystmorfologi

Ansøgningsområdet ligger langt fra land (>15 km). Bølge- og strømforhold samt erosions- og aflejringsforhold langs den jyske vestkyst forventes dermed ikke at blive påvirket af råstofindvinding med slæbesuger, ligesom kystens morfologi ikke kan forventes at blive påvirket.

Risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten

Indvindingen foretages på marint område, og medfører ikke risiko for oversvømmelse. Desuden foregår indvindingen minimum 15 km fra kysten, hvormed kysterosion ikke vurderes relevant (se Kystmorfologi ovenfor).

Geologiske interesser

Indvindingen foregår på havet langt fra kysten (>15 km), og det nærmeste geologiske interesseområde er knyttet til land- og kystområderne beliggende i området omkring Lodbjerg-Thyborøn-Bovbjerg-Engbjerg. Dette værdifulde geologiske område ligger 19 km fra ansøgningsområdet (Miljøstyrelsen, 2021).

Luft og klima

Indvindingen vil i beskedent omfang bidrage til den samlede luftforurening, heraf emissioner af NO_x, SO₂, HC og partikler. Indvindingsaktiviteten vurderes begrænset og ubetydelig ift. emissioner fra andre kilder i området såsom anden sejlads og luftforurening fra aktiviteter på land. Indvindingen kan potentielt påvirke klimaet i form af CO₂ emission fra indvindingsfartøjer, hvilket dog vil udgøre en meget lille del af den samlede sejlads i Danmark og dermed den samlede emission i Danmark. Ligesom indvinding og sandfodring har foregået i området i en årrække i forvejen i forbindelse med brug af det eksisterende bygherreområde 562-OA Agger, som Lodbjerg A og B vil erstatte. Indvindingsaktiviteten vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig merpåvirkning af området i forhold til emissioner.

Infrastruktur anlæg, herunder energiproducerende anlæg og strækingsanlæg

Indvindingen i ansøgningsområdet er ikke i arealmæssig konflikt med eksisterende eller planlagte marine infrastruktur anlæg såsom havmølleparker (4Coffshore, 2021), havne mm. Indvindingen medfører ingen permanente anlæg eller anlægsarbejder, og dermed ingen påvirkning på land.

Kabler

Søkortet og opslag hos DKCPC (Danish Cable Protection Committee) viser, at der ikke ligger kabler i umiddelbar nærhed af ansøgningsområdet (DKCPC, 2021). I forbindelse med de geofysiske og biologiske undersøgelser er der desuden ikke identificeret nogen forekomst af kabler på havbunden (GEUS, 2021a). Råstofindvindingen i ansøgningsområdet vil derfor ikke påvirke kabler og vurderes ikke yderligere.

Luftfart

Indvindingen er ikke i konflikt med luftfartsinteresser.

6.3 Potentielle påvirkninger

Miljøkonsekvensvurderingen skal indeholde en konsekvensvurdering af de potentielle påvirkninger, som indvindingen kan medføre på de relevante miljøparametrene i indvindingsområdet.

Potentielle påvirkninger, som kan medføre en væsentlig påvirkning af de nævnte miljøparametre i forbindelse med råstofindvinding i ansøgningsområdet, omfatter følgende:

- Arealinddragelse
- Forstyrrelse af havbunden
- Sedimentspredning
- Støj (luft og under vand) og øvrig forstyrrelse

De enkelte potentielle påvirkninger er beskrevet i det følgende.

6.3.1 Arealinddragelse

Råstofindvinding medfører en arealinddragelse af det areal, som inddrages til selve indvindingen. Denne direkte inddragelse/fjernelse af areal/havbund kan potentielt påvirke flora og fauna forhold, fiskeri samt øvrige erhvervs- og fritidsinteresser, som anvender det aktuelle havbundsareal.

Arealpåvirkningen for den gennemsnitlige årlige indvinding på 600.000 m³, maksimumindvinding på 2.0 mio. m³ ved en ekstremfodring og den samlede indvinding på 6,0 mio. m³ over den 10-årige periode er beregnet i Tabel 6-4 nedenfor. Tabel 6-4 viser at arealpåvirkningen vil være ca. 7% af ansøgningsområdet pr. år ved en gennemsnitsindvinding, 28% ved en maksimalindvinding og samlet ca. 83 % af ansøgningsområdet over 10 år for den fulde indvindingsmængde på 6,0 mio. m³ sand, hvis indvindingen fordeles jævnt i ansøgningsområdet. Maksimalindvinding forventes maksimalt at kunne forekomme 0-2 gange i løbet af den 10-årige indvindingsperiode.

Råstofindvinding medfører ikke en permanent inddragelse af areal, idet indvindingen ikke forhindrer anden fremtidig arealanvendelse i forhold til andre interesser. Fritids- og erhvervsfiskeri samt andre erhvervs- og friluftaktiviteter kan dog periodevis under råstofindvindingen opleve arealmæssige begrænsninger. Arealinddragelse kan være en potentiel midlertidig påvirkning i relation til fiskeri, sejladsforhold, rekreative forhold samt øvrige erhvervsinteresser.

6.3.2 Ændring af havbunden

Råstofindvinding kan medføre ændringer i substrat- og dybdeforhold i indvindingsområdet. Indvindingsmetoden i ansøgningsområdet omfatter alene slæbesugning. Slæbesugning frembringer lange spor i havbunden med en bredde på typisk 1,5-2 m (op til ca. 4 m ved brug af større fartøjer) og en dybde på op til 30-50 cm (ca. 0,5 til 1,5 meters dybde ved brug af større fartøjer).

Slæbesugning påvirker et større areal end stiksugning, som til gengæld har en større dybdepåvirkning og længere regenereringsperiode. Mellem slæbesporene vil der være arealer, som ikke suges.

Tabel 6-4. Arealpåvirkning og havbundssænkning ved slæbesugning set over en 1-årig og en 10-årig periode beregnet inden for ansøgningsområdet. Der er beregnet både for et gennemsnitsscenarie og et maksimalscenarie (=ekstremindvinding).

Tema: Arealpåvirkning, slæbesugning – Ansøgningsområde (ressourceområde)			
Antagelser: Gennemsnitlig udnyttelsesprocent: 97,5% og dybdepåvirkning på 0,4 m pr. slæbespor			
	Arealpåvirket havbund (km ²)	Procent af område (%)	Gennemsnitlig havbundssænkning (m)
Årlig påvirkning			
Gennemsnitsindvinding (600.000 m ³ /år)	1,28	7	-
Maksimumindvinding (2.000.000 m ³ /år)	5,13	28	-
10-årig påvirkning	15,38	83	0,32

Det er estimeret, at slæbesugningen medfører, at ca. 7% af området arealmæssigt vil blive berørt pr. år ved en gennemsnitlig årlig indvinding på 600.000 m³, hvis der indvindes jævnt i ansøgningsområdet. En maksimalfodring på 2.000.000 m³ påvirker 5,13 km² svarende til at ca. 28 % vil blive påvirket årligt (0-2 gange i løbet af den 10-årige indvindingsperiode), hvis der ikke indvindes indenfor samme areal. Dette vil dog altid være tilfældet, hvorfor disse tal angiver den størst mulige arealpåvirkning.

Indvindingen af den samlede ansøgningsmængde på 6,0 mio. m³ kan medføre en arealmæssig påvirkning af ca. 83% af ansøgningsområdet over den 10-årige periode. Dette kan set over en 10-årlig periode potentielt medføre en gennemsnitlig havbundssænkning på ca. 0,32 m, hvis hele den ansøgte mængde indvindes ved slæbesugning.

Ansøger forventer en udnyttelsesprocent på ca. 97,5%, da stort set alt materialet der suges op, benyttes til sandfodringen. Det antages desuden, at slæbesugning ca. berører 2,5 m² bund pr. m³ indvundet materiale under antagelse af ca. 40 cm sugedybde for slæbesugeren. Generelt medfører en større udnyttelsesgrad en mindre arealpåvirkning. Den arealmæssige påvirkning vil forventeligt være mindre, da indvindingen ofte vil være koncentreret i mindre delområder med egnet råstofforekomst, hvorved dybdepåvirkningen vil være større og hvorfor de i tabel 6-4 nævnte arealer er worst case betragtninger.

6.3.3 Sedimentspredning

Indvinding på havbunden medfører sedimentspredning omkring sugehovedet, spild og sedimentspredning ved overløb fra lastekassen/lastrum og omløjring af sediment på havbunden, som potentielt kan medføre ændringer i substratforhold. Omfanget af sedimentspild samt omløjring vil afhænge af sedimentets beskaffenhed, indvindingsmetode, materiel og tidsplan mm.

De potentielle effekter af indvinding omkring det nærliggende Jyske Rev er tidligere vurderet ud fra en spredningsmodellering, som blev gennemført i 2006 af DHI for NCC (Orbicon, 2006, Bilag 2). Spredningsmodelleringen blev gennemført i forbindelse med en tidligere ansøgning om tilladelse til indvinding af ral på Jyske Rev. I nærværende

vurdering er ydermere benyttet en rapport om miljøeffekter ved anvendelse af store fartøjer til råstofindvinding på havbunden (DHI, 2010). For yderligere detaljer henvises til originaludgivelsen (DHI, 2010). Derudover er anvendt tidligere undersøgelser i andre råstofindvindingsområder i de danske farvande, herunder "Gyldenløves Flak" (Orbicon, 2016) i Fakse Bugt, "Nord for Tvillingerne" (Orbicon, 2016b) i det sydlige Kattegat og infrastrukturprojekter (Vejdirektoratet, 2016).

I forbindelse med råstofindvindingen i ansøgningsområdet udnyttes stort set hele sandressourcen, og udnyttelsesprocenten forventes at være ca. 97,5% af råstofressourcen – altså en spildprocent på 2,5% baseret på erfaringer fra Kystdirektoratets bygherreområder (Rambøll, 2019b). Det vil sige, at langt størstedelen af råstofressourcen udnyttes, og kun en lille del returneres tilbage til havbunden, svarende til det spild, som løber med overløbsvandet ud under indvinding. Det returnerede materiale vil typisk bestå af mere finkornet sediment eller enkelte sten. De gennemførte modelberegninger viser, at det sediment, som spildes i forbindelse med indvinding, ikke når at bevæge sig ret langt væk fra det aktuelle indvindingsområde, inden det synker til bunds (Orbicon, 2006, Bilag 2). Det skyldes, at selv den finkornede fraktion af det spildte materiale er ret grov og primært udgøres af finsand og grov silt, som har en relativ stor faldhastighed (Orbicon, 2006, Bilag 2). Målinger af spildmateriale fra en råstofindvinding har vist, at størstedelen af det spildte materiale var bundfældet indenfor 150 m (maksimalt 10 gram per m²) fra indvindingsfartøjet (Newell et al, 1998). Ud fra Hjulstrøm diagrammet om kornstørrelser mod energier (Hjulström, F., 1939), vurderes det, at de meget dynamiske strøm- og bølgeforhold medfører, at finkornet sediment som ler, silt og finsand (hvis det findes i ansøgningsområdet) ikke aflejres i ansøgningsområdet, men transporteres ud af området for at aflejres på eksempelvis de store vanddybder i Skagerrak mod nord.

Dybdeforholdene har også en betydning, da materialet føres mod større vanddybder og hurtigt fortyndes og transporteres videre med strøm og bølger. Fanen af suspenderet stof vil derfor fremtræde tydeligst i områder, hvor vanddybden er lavere (Orbicon, 2006, Bilag 2).

En spredningsmodellering gennemført af DHI for NCC på Jyske Rev viste, at der inden for en etårig periode ikke vil opstå middelkoncentrationer af suspenderet stof i vandfasen, som overstiger 15 mg/l – hverken inden for selve indvindingsområdet eller i nærliggende områder på Jyske Rev (Orbicon, 2006, Bilag 2). Der kan dog på grund af modelbetinget dybdemidling lokalt forekomme koncentrationer, som er højere, men de kraftige strøm- og bølgeforhold medfører, at det spildte sediment hurtigt fortyndes og transporteres mod dybere partier i Nordsøen. Påvirkningen vil dermed være meget kortvarig tidsmæssig (dage), idet sedimentkoncentrationen hurtigt falder til nul mellem hver spildepisode (Vejdirektoratet, 2016). Dette underbygges af andre undersøgelser, som viser at sedimentkoncentrationer i vandfasen oftest ikke overskrider 2-15 mg/l få hundrede meter fra kilden f.eks. (Vejdirektoratet, 2014a) (COWI, 2000) (Rambøll, 2010b) (Orbicon, 2006, Bilag 2).

En spildsimulering gennemført af DHI for NCC på det nærliggende Jyske Rev (Orbicon, 2006, Bilag 2) scenario 1) viser desuden, at områder, hvor sedimentkoncentrationen overstiger 5 mg/l og 15 mg/l, begrænser sig til at være i umiddelbar nærhed af indvindingslokaliteten. Koncentrationer over 5 mg/l udenfor indvindingsområdet forekommer i max 5 % af indvindingsperioden. Sedimentationen i indvindingsperioden vil sjældent overstige 10 kg/m² (ca. 10 mm) og vil være begrænset til områder nær indvindingsaktiviteterne (DHI, 2000). Spildsimuleringen i scenario 2 – worst case (Orbicon, 2006, Bilag 2), hvor en maksimal indvindingsrate på 3 mio. m³ benyttes viser, at områder, hvor den suspendede sedimentkoncentration overstiger 5 mg/l og 15 mg/l, stadig begrænser sig også til at være i nærheden af indvindingslokaliteten. Områder påvirket af spildkoncentrationer over 5 mg/l er maksimalt 11 km² og vil hovedsageligt være inden for indvindingsområdet. Sedimentationen vil forekomme inden for eller nær indvindingsområdet (DHI, 2000). Til sammenligning anslås baggrundskoncentrationen til at være 2-10 mg/l i på dybere vand ud for den jyske vestkyst (Orbicon, 2006, Bilag 2). Ligesom nærværende indvinding vil omfatte en lavere indvindingsmængde pr år på gennemsnitligt 600.000 m³ (gennemsnitsindvinding) eller maksimalt op til 2 mio. m³ (maksimalindvinding).

Sedimentspredningen fra indvindingen forventes således fortrinsvis at forekomme lokalt, lige omkring skibet, at påvirke ansøgningsområdet og dele af påvirkningszonen og generelt ikke påvirke havområdet udenfor påvirkningszonen.

6.3.4 Støj og øvrige forstyrrelser

Støj (undervandsstøj og luftbåren) fra råstofindvinding kan medføre negativ påvirkning af miljøet. Undervandsstøj kan potentielt påvirke havpattedyr og fisk, mens luftbåren støj potentielt kan påvirke fugle, havpattedyr og mennesker.

Undervandsstøj

Undervandsstøj påvirker ikke mennesker, men derimod de dyr, der lever i vandet. Undervandsstøj kan, afhængig af artens lydfrembringelse og høreevne, påvirke dyrenes kommunikation, orienteringsevne og fødesøgning samt resultere i midlertidige eller permanente høreskader. I forhold til menneskabt undervandsstøj er der særligt fokus på havpattedyr, men fisk kan også blive påvirkede.

Påvirkningen af havpattedyr i forbindelse med undervandsstøj for indvindingsaktiviteten behandles under afsnit 9.5 – Havpattedyr.

Det forventes, at fisk kan detektere støjen på meget store afstande. Hvorimod det er sværere at vurdere i hvilken afstand fiskene udviser ændret adfærd. Typen af adfærdsændring afhænger dels af frekvensen af støjen og dels af, hvilket tropisk niveau fisken befinder sig på. Byttedyrsfisk som sild og juvenile torsk afskrækkes oftest af lyd, mens rovfisk såsom hajer og voksne torsk kan tiltrækkes af lyd (By- og Landsskabsstyrelsen, 2010). Det er usandsynligt, at fisk vil pådrage sig permanente eller midlertidige skader som følge af støj i forbindelse med råstofindvinding (Popper, A. N. et al., 2014; Andersson, M. H. et al., 2016). Der vurderes, i nærværende

miljøkonsekvensrapport, ikke yderligere på effekten af undervandsstøj i forbindelse med råstofindvinding for fisk.

Luftbåren støj

Luftbåren støj kan stamme fra motorstøj og støjen fra selve indvindingen. Ansøgningsområdet ligger for langt fra land (>15 km) til at kunne påvirke menneskelige aktiviteter og boligområder på land.

Rastende og fødesøgende fugle og havpattedyr kan dog bortskræmmes og forstyrres i deres aktiviteter indenfor kort afstand af skibet (få hundrede meter). Dette er vurderet under de relevante miljøkonsekvensvurderinger for fugle (se afsnit 9.4) og havpattedyr (se afsnit 9.5).

Øvrige forstyrrelser

Sejlads frem og tilbage mellem ansøgningsområdet og fodringsstrækningerne medfører øget forstyrrelse i området, som potentielt kan forstyrre fugle og havpattedyr i området, samt fiskeri, rekreative interesser, sejladsforhold og øvrige erhvervsinteresser.

Antallet af sejlads svarer til 2x (frem og tilbage) antallet af laster ved anvendelse af små (2.000 m³), mellem størrelse (6.000 m³) og store skibe (21.000 m³) ved indvinding og fodring ved én eller 2 kampagner. En gennemsnitsindvinding på 600.000 m³/år medfører mellem ca. 57-600 sejlads/år og en maksimumindvinding på 2 mio. m³ medfører ca. 190-2000 sejlads/år.

7. Råstofefterforskning – Fase IB


Råstofefterforskningen er afrapporteret i den geofysiske rapport (GEUS, 2021a) og kort summeret nedenfor.

7.1 Undersøgellesprogram

Der blev sejlet i alt 288 linjekilometer over Lodbjerg B, IB survey-området. Linjerne blev sejlet med en indbyrdes afstand på 100 m og med en NØ-SV retning.

På de geofysiske linjer blev der indsamlet data med følgende udstyr: Integreret multibeam (MBES) og side scan sonar (SSS), sedimentekkolod – Innomar (SBP), sparker seismik med streamer og magnetometer (MAG).


Derudover blev der indsamlet 20 ROV verifikationsvideoer, 15 stk. 6 m vibrocore borerer fra Fase 1a og 1b undersøgelsen, 1 arkivboring og 60 HAPS overfladesedimentprøver indenfor IB efterforskningsområdet (se Figur 7-1).



Figur 7-1. Gennemført undersøgelsesprogram for Lodbjerg B. Kilde: (GEUS, 2021a).

7.2 Metode for substrattypeinddeling

Substrattypekortlægning af Lodbjerg B, Fase IB området inkl. 500 m zone er baseret på tolkning af fulddækkende side scan sonar mosaik (se Figur 7-2) og understøttet af 20 stk. ROV punktobservationer, 60 HAPS overflade prøver (Fase IA og IB) og 16 vibrocores (Fase IA og IB, og arkivboring) (se Figur 7-1).



Figur 7-2. Side scan sonar (SSS) mosaik for Lodbjerg B. Kilde: (GEUS, 2021a).

I relation til tolkning af overfladefladesedimentet er bundsubstratet opdelt i følgende substrattyper jf. Råstofbekendtgørelsen (BEK nr. 1680 af 17/12/2018, Fase IB):

- **Substrattype 1 – Sand, silt og dynd:** Områder bestående af finkornet blød bund eller fast sandbund (evt. med dynamiske bundformer) med varierende indslag af skaller og grus. Sand er defineret som kornstørrelser i intervallet 0,06-2,0 mm.

Typisk underinddeles substrattype 1 i substrattype **1a** (siltede, bløde bunde), **1b** (faste sandbunde) og **1c** (lerede bunde), hvilket ikke fremgår af bekendtgørelsen. Det er en standard substrattypeinddeling, der er anvendt ved en lang række marine råstofefterforskninger med tilhørende afrapporteringer. Underinddelingen er anerkendt af MST.


- **Substrattype 2 - Sand, grus og småsten:** Områder, som består af en blanding af groft sand og grus med en kornstørrelse på ca. 2-20 mm og småsten med størrelser på ca. 2-10 cm. Substrattypen indeholder også enkelte større sten fra ca. 10 cm og større, der dækker op til 10% af havbunden.

Substrattype 2 kan inddeles i to under typer; substrattype 2a og 2b.

Substrattype 2a består primært af groft sand, grus og småsten, og betegnes som råstofmæssig interessant. Denne substrattype består typisk kun af få større sten over 10 cm. **Substrattype 2b** består af op til 10% større sten og er ikke råstofmæssig interessant.

- **Substrattype 3 - Sand, grus og småsten samt stenbestrøning med større sten:** Områder bestående af blandede substrater med sand, grus og småsten med en varierende mængde af større sten fra ca. 10 cm dækkende 10-25% af havbunden. Substrattypen adskiller sig fra substrattype 2 ved at indeholde et større antal sten fra ca. 10 cm og op efter. Stenene ligger oftest spredt (bestrøning) og kun i ét lag.
- **Substrattype 4 – Stenede områder og stenrev med 25-100% af større sten:** Områder domineret af sten fra ca. 10 cm fra tæt bestrøning til egentlige stenrev med eller uden huledannende elementer. Der kan også forekomme varierende mængder af sand, grus og småsten, samt biogene rev/eller kalkrev i denne substrattype. Stenene kan ligge i ét lag, eller danne egentlige stenrev, som rejser sig over den omkringliggende bund med flere lag (huledannende).

Fordelingen af substrattyper i efterforskningsområdet for Lodbjerg B kan ses på nedenstående substrattypekort (Figur 7-3).




Figur 7-3. Substrattypekort for undersøgelsesområdet for Lodbjerg B, der viser fordelingen af de tolkede substrat typer. Kilde: (GEUS, 2021a).

Undersøgelsesområdet er klart domineret af dynamisk præget fast sandbund jf. substrattype 1b, med stedvise indslag af substrattype 2 af mere gruset til småstenet karakter. Substrattype 2 bestående af en blanding af groft sand og grus samt enkelte småsten. Substrattype 1b udgør ca. 97% af efterforskningsområdet og substrattype 2 ca. 3%, hvoraf 62% af substrattype 2 ligger i påvirkningszonen (GEUS, 2021a).

7.3 Sammenfattende råstofvurdering

Seismisk tolkning sammenholdt med boringsresultater underbygger, at der fordelt over hele Lodbjerg B undersøgelsesområdet, forefindes en relativ homogen ressourceforekomst af marine sandede aflejringer, der opfylder KDI's kravsspecifikationer. Forekomsten bestående af øvre holocæne, marine aflejringer har en varierende mægtighed/tykkelse på 1-8 m og er defineret af store tværgående sandrygge orienteret NV-SØ. Sandryggene er mest veldefinerede i områdets centrale til østlige del, og i området vestlige dybere del mister ryggene karakter, og her findes også partier med meget ringe ressourcetykkelse (Figur 7-4). I områdets sydlige hjørne dokumenterer flere borekerner, at der findes et relativt tyndt (<0,5 m) gruset toplag over de homogene sandaflejringer.



Figur 7-4. Ressourcekort med angivelse af ressourcetykkelser i undersøgelsesområdet. Konturintervaller er 1m. Kilde: (GEUS, 2021a).

Middelkornstørrelsen af sandressourcen varierer mellem 0,3 og 0,4 mm, finstofindholdet <0,125 mm er 0,5-3% og glødetabet er ca. 0,3-0,5%. Havbundsoverfladen er i ressourceområdet domineret af dynamisk sandet substrattypen 1b, med mindre områder af mere gruset og småstenet karakter i nogle af de dybe trug mellem sandbundformerne. Under ressourceforekomsten findes ældre holocæne, siltede-finsandede marine aflejringer, som er dokumenteret af enkelte fase 1a borekerner. Det potentielle ressourcevolumen er beregnet til at være ca. 50 mio. m³. Grundet den ressourcemæssige homogene karakter, må dette tal anses for at være relativt nøjagtigt (GEUS, 2021a).

7.4 Afgrænsning af ansøgningsområde

På baggrund af fase IB ressourcekortlægning understøttet med borer, HAPS overfladeprøver samt ROV verifikationsdyk er hele Lodbjerg B området udvalgt som potentielt ansøgningsområde.

8. Miljøundersøgelser – Fase IIA

Miljøundersøgelserne (Fase IIA jf. Råstofbekendtgørelsen, Bilag 3) omfatter kortlægning af overfladesedimentet (overfladesedimentkort), områdets bathymetri (dybdekort) og en biologisk undersøgelse, som omfatter undersøgelsesområdet og en 500 m påvirkningszone udenom dette. Den geofysiske undersøgelse er foretaget af GEUS (se Kapitel 7) og er rapporteret i (GEUS, 2021a). Den biologiske undersøgelse er foretaget af WSP.

I dette afsnit afrapporteres den fulde biologiske undersøgelse. Kortlægning af substrattyper og dybdekort er præsenteret i afsnit 9.1 - Havbund, dybde og dynamik.

Miljøundersøgelserne er foretaget i hele undersøgelsesområdet (=efterforskningsområdet) (Figur 4-2). Ansøgningsområdet med påvirkningszone er efterfølgende bestemt at udgøre hele undersøgelsesområdet på baggrund af en jævn spredt forekomst af ressource i hele området, og at der ikke er tilstedeværelse af stenrev i undersøgelsesområdet (Substrattype 3 og 4) (se afsnit 7.4).

8.1 Metode

Der er foretaget undersøgelser af overfladesedimentets sammensætning (Orbicon, 2019a), og de biologiske samfund vha. visuel verificering med ROV på 20 stationer i undersøgelsesområdet (se Figur 8-1). Disse undersøgelser danner baggrund for udarbejdelsen af naturtypekort for undersøgelsesområdet, som beskrevet i det følgende.

Videooptagelse af havbunden på ROV-stationerne blev udført i forbindelse med miljøundersøgelsen den 9. til 10. november 2020. ROV-videoerne er efterfølgende blevet oparbejdet af en uddannet geolog (verifikation af substratforhold) og biolog (verifikation af biologiske forhold) i en logbog (se bilag) og resultatet er rapporteret i nedenstående afsnit.

Naturtypekort og beskrivelsen af naturtyperne er udarbejdet på baggrund af en sammenstilling af den geofysiske kortlægning af substrattyperne på havbunden og visuelle observationer (ROV-video) af de dyre- og plantesamfund, der er knyttet til substrattyperne på havbunden i undersøgelsesområdet.

Flora, epifauna og fisk blev artsbestemt i så stor detalje som muligt på baggrund af billedkvaliteten, afstand osv. Observationer af flora, epifauna og fisk vha. video er begrænset af lysforhold og kvaliteten af videoen. Vegetationen bestemmes derfor fortrinsvis til slægtsniveau, og artsniveau, hvor det er muligt. Artslister udført på baggrund af video er derfor ikke kvantitative i forhold til infauna (arter som lever i havbunden). Infauna i form af f.eks. skaller, som kan artsbestemmes, er inkluderet i artslisten. Artsbestemmelser er udført fortrinsvis efter (Køie & Kristiansen, 2014) og (Muus et al, 2006). Der er ikke lovkrav i råstofbekendtgørelsen om at tage prøver af infaunaen (lever begravet i havbunden).

Miljøundersøgelsen omfatter først og fremmest epifauna (lever oven på bunden), som kan ses på ROV-videoen. Individantal og artssammensætningen for infaunaen (havbørsteorm mm) kan ikke kvantificeres ud fra ROV-video. Infaunaen indgår derfor kun i det omfang, der forekommer spor oven på havbunden, såsom havbørsteormehobe eller -huller, rør i havbunden, spor i havbunden, skaller eller sifonrør fra muslinger mm, som kan observeres på ROV-videoen. Den overordnede dækningsgrad for bundfauna inkluderer således, alt det der kan ses på ROV-videoen. Dvs. at der angives en samlet dækningsgrad i forhold til observerede epifauna og de synlige tegn på infauna.

8.2 Naturtyper

Undersøgelsesområdet er domineret af sandbund og enkelte, små lokale områder med grus (R02, R05, R10). Enkelte større sten (>10 cm) forekom kun på station R18.

De observerede naturtyper i undersøgelsesområdet kan ses i nedenstående naturtypekort (Tabel 8-1). Naturtypekortet er udarbejdet på baggrund af substrattypekortet og de visuelle verifikationer, og viser den arealmæssige udbredelse af naturtyperne i undersøgelsesområdet.

Der blev observeret 2 naturtyper:

- naturtype 1b - sandbundssamfund
- naturtype 2 – blandet bund, grusbundssamfund (undersubstrattype 2a) og sandbund med enkelte større sten (undersubstrattype 2b) (>10cm, 1-10%)

Arealfordelingen af naturtyperne i henholdsvis undersøgelsesområdet, ansøgningsområdet og påvirkningszonen omkring ansøgningsområdet er angivet i Tabel 8-1.

Tabel 8-1. Arealfordeling af naturtyperne i undersøgelsesområdet, ansøgningsområdet og påvirkningszonen omkring ansøgningsområdet.

Naturtype	Undersøgelsesområde		Ansøgningsområde		Påvirkningszone	
	km ²	%	km ²	%	km ²	%
1b	28.10	97	18.20	98	9.90	95
2	0.86	3	0.33	2	0.53	5
Total	28.96	100	18.53	100	10.43	100

Bundsamfundene var forskellige i de tre naturtyper fortrinsvis som følge af arternes forskellige substratpræferencer og dybdepræferencer. Forekomsten af arter og dækningsgrader for bundflora og -fauna observeret i de forskellige naturtyper er præsenteret i Tabel 8-2 nedenfor.

Der forekom generelt ikke bundflora i undersøgelsesområdet fortrinsvis pga. mangel på større sten til fasthæftning.

I det følgende beskrives bundflora og -faunasamfund knyttet til de observerede naturtyper i undersøgelsesområdet.



Figur 8-1. Naturtypekort for undersøgelsesområde – Lodbjerg B. På kortet er desuden angivelse af ROV-stationer (visuel verifikation) anvendt til beskrivelse af naturtyperne samt afgrænsning af ansøgningsområde og tilhørende påvirkningszone. Ansøgningsområdet + påvirkningszonen er lig undersøgelsesområdet.

Tabel 8-2. Sammenligning af arter og dækningsgrader for bundflora og -fauna i naturtyperne i undersøgelsesområdet. Dækningsgraden er angivet i %.

Område B Naturtype	Bundfaunaarter	%	Bund- flora- arter	%	ROV- station	Dybde (m)	Substrat- type	Bundtype
Naturtype 1b	Bundfauna: Få arter. Dominans af infauna og infaunaaktivitet, såsom børsteormerør, Phoroniderør, Lanicerør, sømushuller, sømusskaller og muslingeskaller bl.a.: knivmuslingeskaller, molbøsterskaller og hjertemuslinger. Desuden et meget langt eksemplar af børsteormen <i>Phyllodoce groenlandica</i> (R14). Dominerende epifauna var almindelig søstjerne, pigget søstjerne, herudover observeredes: kamstjerne, svømmekrabbe, taskekrabbe, strandkrabbe, eremitskreb, konksneglehuse og rovbørsteormen <i>Ophiodromus</i> sp, løs bladmos. Fiskearter: kutlinger og knurhane, fladfiskefourageringshuller, fløjfisk, rødspætte, ising, søtunge især juvenile individer, fjæsing, torskefisk, sej, lille tobisstime der spiser organismer i vandsøjlen (Overordnet dækningsgrad = 0-1%, 2-5% hvor tobisstimer)	<1%	Ingen	0%	R01, R03-04, R06-09, R11-17, R19-R20	23-33	1b	Sandbund (fin til groft) med bølgeribber. Stedvist grus og skaller i trugene.
Naturtype 2a	Grusbund: Fortrinsvis muslingeskaller: knivmusling, molbøsters og hjertemusling. Enkelte børsteormerør, Lanicerør, Phoroniderør, sømusskaller og muslingesifonhuller. Epifauna omfatter kalkrørsorm, alm. søstjerne, drivende bladmos. Fiskearter: Fløjfisk, kutling, rødspætte og uspec. fladfisk (overordnet dækningsgrad <1%)	<1%	Ingen	0%	R2, R05, R10	26-31	2a	Bølgeribber eller flad grusbund med lidt småsten, skaller og sand i matrix.
Naturtype 2b	Bundfauna: Domineret af kalkrørsorm, hydroider, bladmosdyr, alm. søstjerne, knivmuslingeskaller. Fiskearter: Fladfisk uspec. (overordnet dækningsgrad <1%)	<1%	Ingen	0%	R18	36	2b	Sandbund med varierende indslag af grus og få store sten (>10 cm).

8.2.1 Naturtype 1b - sandbundssamfund

Naturtype 1b sandbundssamfund er knyttet til substrattype 1b "sandbund", som består af fin til grovsandbund med bølgeribber. Naturtypen dominerer undersøgelsesområdet (Figur 8-1).


Faunadækningen var generelt lav (<1% dækning af bunden) og domineret af infauna og infaunaaktivitet, såsom børsteormerør, Phoroniderør, Lanicerør (Figur 8-3), sømushuller, sømussskaller og muslingskaller: knivmuslingskaller, molbøstersskaller og hjertemuslinger (se Table 8-2, Figur 8-3). Desuden et meget langt eksemplar 45-60 cm af børsteormen *Phyllodoce groenlandica*, der forsvarer sig overfor nærgående fisk (R14) (se Figur 8-2).



Figur 8-2. Naturtype 1b – sandbund med tobis og en stor havbørsteorm på sandoverfladen (rød pil). (ROV station R14).

Dominerende epifauna var almindelig søstjerne (Figur 8-3), pigget søstjerne, herudover observeredes: kamstjerne, svømmekrabbe, taskekrabbe (Figur 8-3), strandkrabbe, eremitkrebs, konksneglehuse og rovbørsteormen *Ophiodromus* sp, løs bladmos.

En del fiskearter og tobisstimer blev observeret (dækningsgrad generelt 0-1%, 2-5% hvor små tobisstimer) kutlinger og knurhane, fladfiskefourageringshuller, fløjfisk, rødspætte, ising, søtunge især juvenile individer, fjæsing, torskefisk, sej (Tabel 8-2, Figur 8-4). Tobisstimerne var til stede pga. fødeorganismer i vandsøjlen bl.a. *Noctiluca scintillans*, som gav små blitzglimt af hvidt lys, når tobiserne var i nærheden eller sediment blev hvirvlet op i vandsøjlen (station R14-16) (Figur 8-3).



Figur 8-3. Naturtype 1b sandbundssamfund på sandbund. Øverst: Lanicerør (rød cirkel) (ROV station R07). Midt: almindelig søstjerne (ROV station R07). Nederst: Taskekrabbe og enkelte tobis i vandsøjlen (ROV station R14).

8.2.2 Naturtype 2a - grusbundssamfund


Naturtype 2a er knyttet til substrattype 2a sandet grusbund", som fremstår flad eller bølgepåvirket med bølgeribber. Naturtypen forekommer lokalt i den sydvestlige del af undersøgelsesområdet (R2, R05) og i den østlige del af påvirkningszonen (R10) (Figur 8-1).

Faunadækningen var lav (<1% dækning af bunden) og domineret af fortrinsvis muslingeskaller: knivmusling, molboøsters og hjertemusling. Enkelte børsteormerør, Lanicerør, Phoronisrør, sømusskaller og muslingesifonhuller. Epifauna omfatter kalkrørsorm, alm. søstjerne, drivende bladmos (Figur 8-5).



Figur 8-5. Naturtype 2a – småstenet sandbund med diverse muslingeskaller og lille bladmos (rød cirkel). (ROV station R02).

Meget få fisk blev observeret (overordnet dækningsgrad <1%) inkl. fløjfisk, kutling, rædspætte og uspecificerede fladfisk (Tabel 8-2, Figur 8-6).




Figur 8-6. Rædspætte på småstenet sandbund (ROV station R05).

8.2.3 Naturtype 2b – blandet bund med enkelte større sten

Naturtype 2b – "sandbund med enkelte større sten" var knyttet til substrattype 2b sandbund med varierende indslag af grus og småsten med spredte store (>10 cm) sten med op til 10% dækningsgrad (Figur 8-7). Naturtypen forekommer udelukkende på ROV station R18 i den vestlige del af påvirkningszonen og er ikke observeret indenfor ansøgningsområdet (se Figur 8-1 8-1).

Faunadækningsgraden var generelt lav (<1%) og bestod af kalkrørsorm, hydroider, bladmosdyr, alm. søstjerne, knivmuslingeskaller (se Figur 8-7).



Figur 8-7. "Sandbund med enkelte store sten", med op til 10% store (>10 cm) sten. Øverst: større sten med kalkrørsorm, hydroider og bladmos. Nederst: enkelt større sten i baggrunden med kalkrørsorm, sandbund med småsten, grus, enkelte skaller og en almindelig søstjerne (ROV station R18).

Meget få fisk blev observeret inkl. uspecificerede fladfish (overordnet dækningsgrad <1%).

8.2.4 Andre observationer

Der blev ikke observeret iltsvind eller springlag i området. Der er ikke observeret menneskeskabte objekter, trawlspor eller lignende.

8.2.5 Samlet vurdering af de biologiske værdier

Fire naturtyper blev observeret i undersøgelsesområdet:

- Naturtype 1b = sandbundssamfund
- Naturtype 2 – blandet bund, grusbundssamfund (undersubstrattype 2a) og sandbund med enkelte større sten (undersubstrattype 2b) (>10cm, 1-10%)

Naturtype 1b sandbundssamfund dominerede hele undersøgelsesområdet (97% dækningsgrad) og naturtype 2 udgjorde en mindre del (3%).

Der blev ikke observeret bundflora på nogle af naturtyperne. Bundflora observeredes ikke på sandbunden fortrinsvis pga. manglende hårdt substrat, stor dynamik og relativt stor dybde (22-37 m).

Sandbundssamfundet (naturtype 1b) bestod fortrinsvis af fin, dynamisk sandbund med observerede bølgeribber. Faunadækningen var lav (<1% dækning af bunden) og domineret af infaunaaktivitet såsom børsteorme, børsteormerør, Phoroniderør, Lanicerør, sømushuller, sømusskaller og muslingeskaller bl.a.: knivmuslingeskaller, molboøstersskaller og hjertemuslinger. Dominerende epifauna var almindelig søstjerne, pigget søstjerne, herudover observeredes: kamstjerne, svømmekrabbe, taskekrabbe, strandkrabbe, eremitkrebs, konksneglehuse og rovbørsteormen *Ophiodromus* sp, løs bladmos (se Tabel 8-2, Figur 8-3, Figur 8-3). En del fiskearter og tobisstimer blev observeret (dækningsgrad generelt 0-1%, 2-5% hvor tobisstimer) kutlinger og knurhane, fladfiskefourageringshuller, fløjfisk, rødspætte, ising, søtunge især juvenile individer, fjæsing, torskefisk, sej (Tabel 8-2, Figur 8-4).

Grusbundssamfundet (naturtype 2a) havde den laveste dækningsgrad for bundfauna (<1%) og meget få sandormehobe formodentligt pga. stor dynamik og omblanding af bundsubstratet. Grusbundssamfundet var domineret af infauna i form af diverse muslingeskaller (knivmuslingeskaller, molboøstersskaller, hjertemuslinger), enkelte børsteormerør, Lanicerør, Phoroniderør, sømushuller og muslingesifonhuller. Epifaunaen bestod af alm. søstjerne, kalkrørsorm og enkelte bladmos (Figur 8-5, Figur 8-6). Meget få fisk blev observeret inkl. fløjfisk, kutling, rødspætte og uspec. fladfisk.

Blandet bund (naturtype 2b) med enkelte store sten (>10 cm) forekom på én station i den sydligste del af undersøgelsesområdet (R18). På sandbunden mellem stenene observeredes samme arter som beskrevet ovenfor under sandbundssamfundet. Epifaunaen på de få store sten inkluderede bladmosdyr, hydroider, kalkrørsorm og alm. søstjerne. Få uspecificerede fladfisk blev observeret (<1% dækningsgrad).

Samlet set blev der observeret ca. 0 makroalgearter/taxa, ca. 18 bundfaunaarter/taxa og ca. 10 fiskearter/taxa.


De observerede arter er alle almindelige for Vestkysten og Nordsøen og tilsvarende epifauna- og infaunasamfund er fundet i miljøundersøgelser for råstofområderne langs vestkysten og

på jyske rev (Orbicon, 2018a; Orbicon, 2018b; Orbicon, 2018c), for havmølleparker langs Vestkysten (Vattenfall, 2020a; Vattenfall, 2020b; Orbicon, 2014) sandfodringsprojekter (Rambøll, 2020) mm.

Samlet set vurderes de biologiske samfund i undersøgelsesområdet som almindeligt forekommende i Nordsøen og i andre danske farvande med tilsvarende dybde- og salinitetsforhold. Der blev ligeledes ikke registreret rødlistede (DK eller HELCOM (HELCOM, 2019)) eller særligt sårbare eller sjældne arter.

9. Miljøkonsekvensvurdering – Fase IIB

Miljøkonsekvensvurderingen behandler de miljø- og naturmæssige konsekvenser i relation til en fuld udnyttelse af den ønskede indvindingsmængde i ansøgningsområdet. Miljøkonsekvensrapporten tager kun udgangspunkt i ansøgningsområdet samt den omkringliggende 500 m brede påvirkningszone (se Figur 9-1).



Figur 9-1. Oversigtskort for ansøgningsområdet og påvirkningszonen for Lodbjerg B.

9.1 Havbund, dybde og dynamik

9.1.1 Metode

I det følgende beskrives de fysiske forhold på havbunden inden for ansøgningsområdet og den tilhørende påvirkningszone, herunder dybde, overfladesubstrat og havbundsdyamik, med udgangspunkt i den geofysiske kortlægning af havbunden (Fase IIB, hvor der er sejlet med multibeam, sidescan sonar, magnetometer og pinger). Desuden vurderes den potentielle miljøpåvirkning, som indvindingen kan have på disse forhold.

Til supplerende oplysninger om de fysiske forhold på bunden anvendes videooptagelser (ROV) indsamlet i forbindelse med de biologiske undersøgelser, samt 6 m vibrocores og HAPS overfladesedimentprøver indsamlet i forlængelse af de geofysiske undersøgelser.

De anvendte geofysiske metoder og resultaterne er beskrevet mere detaljeret i den geofysiske rapport (GEUS, 2021a).


9.1.2 Eksisterende forhold

I nærværende afsnit beskrives og vurderes substrat- og dybdeforholdene samt de dynamiske forhold inden for ansøgningsområdet og den tilhørende påvirkningszone.

Dybdeforhold

Dybden i Lodbjerg B varierer mellem ca. 22 m og 37 m. I den centrale til østlige del af området veksler dybden mellem ca. 22 og 27 m i form af store NV-SØ orienterede rygge, som repræsenterer store vandrende sandbundformer. I den østlige del af påvirkningszonen er dybden lidt større (ca. 25-30 m), da bundformernes rygge terminerer her. De største dybder på op til 37 m findes i udprægede trug mellem bundformernes rygge i den vestligste del af ansøgningsområdet (GEUS, 2021a).

De registrerede vanddybder i ansøgningsområdet og tilhørende påvirkningszone kan ses på dybdekortet, jf. Figur 9-2.




Figur 9-2. Dybdekort for ansøgningsområdet med påvirkningszone.

Substratforhold

Undersøgelsesområdet er klart domineret af dynamisk-præget, fast sandbund svarende til substrattype 1b, med lokale indslag af substrattype 2 med mere gruset til småstenet karakter. Substrattype 2 består af en blanding af groft sand og grus samt enkelte småsten.

Fordelingen af substrattyper i ansøgningsområdet og tilhørende påvirkningszone kan ses på substrattypekortet, jf. Figur 9-3 og arealfordelingen af substrattyperne er vist i Tabel 9-1.



Figur 9-3. Substrattypekort for ansøgningsområdet og påvirkningszonen, Lodbjerg B. Derudover er der angivet placering af ROV og HAPS stationer.


Substrattype 1b udgør ca. 98% og substrattype 2 ca. 2% af ansøgningsområdet. I påvirkningszonen udgør substrattype 1b ca. 95% og substrattype 2 ca. 5%.

Tabel 9-1. Arealfordeling af substrattyperne i ansøgningsområdet og påvirkningszonen omkring ansøgningsområdet.

Substrattype	Ansøgningsområde		Påvirkningszone	
	km ²	%	km ²	%
1b	18.20	98	9.90	95
2	0.33	2	0.53	5
Total	18.53	100	10.43	100


Regionale dybde- og substratforhold

Ansøgningsområdet er beliggende i den østlige del af Nordsøen mellem Jyske Rev og den jyske Vestkyst. Bundtopografien ud for det nordvestlige Jylland danner en forholdsvis jævnt hældende havbund til omkring 25-30 meters dybde ca. 30 km ud for kysten. Ansøgningsområdet er beliggende i den centrale og vestlige del af dette let hældende havbundsområde. Vest for ansøgningsområdet ligger en dybere rende, som adskiller Jyske Rev og det lavvandede kystnære område (Figur 9-4). De registrerede vanddybder inden for ansøgningsområdet er derfor udbredt forekommende i det omkringliggende havområde i samme afstand fra vestkysten syd og nord for ansøgningsområdet.



Figur 9-4. Oversigt, der viser de ordnede dybdeforhold i Nordsøen ud for den nordvestlige del af Jylland. På kortet er angivet beliggenheden af ansøgningsområdet for Lodbjerg B.

Overfladesedimentet i området omkring ansøgningsområdet er domineret af store sandflader. Primært syd og øst for ansøgningsområdet forekommer der større sammenhængende områder med stendækkede moræneflader, grusflader og områder med kvartært ler. Nord og vest for ansøgningsområdet forekommer der mindre isolerede 'øer' af stendækkede moræneflader og grus inden for den udbredte sandflade (Figur 9-5).



Figur 9-5. Fordelingen af overfladesedimenter i Nordsøen ud for den nordvestlige del af Jylland (GEUS, 2019b). På kortet er angivet beliggenheden af ansøgningsområdet for Lodbjerg B.

Fordelingen af substrattyper inden for ansøgningsområdet er derfor meget sammenlignelig med de overordnede overfladesedimenter i den lokale og regionale del af Nordsøen ud for det nordvestlige Jylland. De sandede overfladesedimenter (substrattype 1b), der dominerer havbunden inden for ansøgningsområdet, dominerer også havbunden i de umiddelbare omgivelser. Ansøgningsområdet udgør derfor samlet set en lille del af den udbredte sandbund i denne del af Nordsøen. Ligeledes findes sandbunden inden for samme dybdeinterval (22-37 m) langs kysten mod nordøst for ansøgningsområdet (se Figur 9-5).

Havbundsprofil og organisk indhold i sedimentet

Sedimentet inden for ansøgningsområdet er velsorteret og 59/60 HAPS prøver viste mellem-grovkornet sand med varierende indhold af finere til grovere fraktioner samt skalfragmenter. Sedimentet har generelt et lavt indhold af silt og ler (typisk <0,5%). Desuden viser bundprøverne, at det gennemsnitlige glødetab er 0,4% af tørvægt. Det betyder, at det organiske indhold både på havbunden og længere nede i undergrunden er meget begrænset (typisk <1%), hvilket er lavt for havbundssedimenter (GEUS, 2021a).

Havbundsdynamik

Havstrømmene roterer generelt mod uret med kystparallelle strømme, som bevæger sig fra syd mod nord langs den jyske vestkyst og Skagerrak. Tidevand er beskrevet som den dominerende faktor i Nordsøen (Otto, 1990). Tidevandet kan variere kraftigt både i forhold til flod og ebbe og i forhold til strømhastigheder. De maksimale strømhastigheder er målt til en hastighed på 0,6 m/s i den danske Nordsø.

Nettosedimenttransporten er relateret til dette overordnede strømningsmønster, og resulterer dermed i sedimenttransport fra syd mod nord, hvor sedimentet bliver deponeret i Skagerrak. Den Jyske kyststrøm spiller en vigtig rolle i denne nordlige strøm, og løber langs den jyske vestkyst, hvor den transporterer sediment fra det tyske vadehavsområde til Skagerrak (Anthony & Leth, 2002)

Bundformer og morfologier, dannet ved interaktionen mellem havstrømmen og kohæsiionsløse havbundssedimenter, er mangfoldige i Nordsøen og findes i flere størrelser. Dette skaber store sandbanker, som er kortlagt i den danske sektor (Anthony & Leth, 2002). Den rumlige fordeling af sådanne bundformer i danske farvande er dog uklar.

9.1.3 Miljøpåvirkninger

Indvindingen vil potentielt kunne påvirke bundtopografien og sedimentforholdene i relation til følgende;

- Arealinddragelse (fjernelse af visse substrattyper fra området)
- Ændring af havbunden (ændringer i dybde- og sedimentforhold)
- Sedimentspredning

I det følgende vurderes den specifikke påvirkning af indvindingen på bundtopografi og sedimentforhold i ansøgningsområdet og påvirkningszonen.

Arealinddragelse

Råstofindvinding medfører en arealinddragelse af det areal, som inddrages til selve indvindingen.

Indvindingsmetoden i ansøgningsområdet omfatter alene slæbesugning. Slæbesugning frembringer lange spor i havbunden med en bredde på typisk 1,5-2 m (op til ca. 4 m ved brug af større fartøjer) og en dybde på ca. 0,5 m (op til ca. 1,5 m ved brug af større fartøjer). Mellem slæbesporene vil der være arealer, som ikke suges, og som er uberørte.

Arealpåvirkningen for den ansøgte gennemsnitlige årlige indvinding på 600.000 m³, den maksimale årlige indvinding på 2.000.000 m³ (maksimalindvinding) og den samlede indvinding på 6,0 mio. m³ over den 10-årige periode er beregnet til at være henholdsvis ca. 7% af ansøgningsområdet pr. år ved en gennemsnitsindvinding, 28% ved en maksimalindvinding (ca. 0-2 gange over 10 år) og ca. 83 % af ansøgningsområdet over 10 år (se Tabel 6-4). Samlet set påvirkes et havbundsområde på ca. 1,28 km² pr år for en gennemsnitsindvinding, 5,13 km² pr år for en maksimalindvinding og 15,38 km² over den 10-årige indvindingsperiode.

Det er en større del af ansøgningsområdet der bliver påvirket (83% over 10 år), men en meget lille del af det lokale område i Nordsøen, der vil blive påvirket midlertidigt pr. år og samlet for den 10-årige indvindingsperiode. Arealinddragelsen vil udelukkende omfatte den tid indvindingsaktiviteten forekommer i området 4-88 dage pr år ved maksimalindvinding og 6-897 dage pr år ved gennemsnitlig indvinding. Den overordnede påvirkningsgrad vurderes på den baggrund som *ubetydelig* negativ i ansøgningsområdet og ingen i Nordsøen udenfor.

Ændring af substrattypen

Indvindingen kan potentielt medføre en substratændring, hvis denne medfører blotlægning af andre substrattyper på havbunden.

Ressourcen i ansøgningsområdet udgøres af en sandenhed med en gennemsnitlig tykkelse på 1 til 8 m. Ressourcen består af mellemkornet sand og overlejrer en underliggende sandenhed, som består af lidt siltet til finere sand. Dette er mere detaljeret beskrevet i afsnit 7.3. Fjernelse af ressource ved indvindingen kan således lokalt medføre blotlægning af den underliggende finere sandbund. Substrattype 1b sandbund i ansøgningsområdet vil således ikke blive ændret af fjernelse af ressourcen og indvindingen vurderes at medføre en *ubetydelig* ændring af substrattypen i ansøgningsområdet og ingen i påvirkningszonen og Nordsøen udenfor.

Ændring af dybden

Indvindingen kan potentielt medføre en dybdeændring, ved fjernelse af det øvre lag af havbunden.

Det er beregnet at fjernelsen af 6,0 mio. m³ over 10 år vil medføre en samlet havbundssænkning på 32 cm i ansøgningsområdet, hvis indvindingen fordeles jævnt i området. Dette scenarie er dog usandsynligt ved slæbesugning. Den ansøgte ressourcemængde på 6,0 mio. m³, udgør kun 12% af de anslået 50 mio. m³ kortlagt i området. Indvindingen fordeles ved slæbesugning over et større område og til en mindre dybde, sammenlignet med stiksugning, der påvirker et mindre areal, og hvor der suges i større dybde. Statusrapporter for tilsvarende indvindingsområder med slæbesugning i Nordsøen - navnlig på Jyske rev fællesområderne 562-JC, 562-HA og 562-LC, og på bygherreområderne ad vestkysten 578-AA og 562-AD - viser erfaringsmæssigt dybdeændringer på maksimalt ca. 1,0-1,5 m og gennemsnitligt på 0,5-1,0 m (Orbicon, 2018e; Orbicon, 2018b; Orbicon, 2018c; Orbicon, 2019a; Orbicon, 2019b). Det vurderes derfor baseret på erfaring fra nærliggende indvindingsområder, at dybdeændringen lokalt i ansøgningsområdet, hvor der indvindes mest intensivt, potentielt kan være op til maksimalt ca. 1,5 m.

De naturlige sedimentdynamiske forhold i området medfører, at spor i havbunden, som følge af slæbesugning over tid vil udjævnes af strømmen. De dynamiske forhold ved vestkysten medfører, at områder, hvor der er blevet indvundet, relativt hurtigt udjævnes. Tidligere undersøgelser fra andre områder på Jyske Rev – som også stedvist er højdynamiske områder - har vist, at det ikke har været muligt at erkende sugespor mv. på sidescan-mosaikken, hvilket må skyldes, at sugesporene udviskes / fyldes op med materiale i forbindelse med kraftig strøm og / eller bølgehændelser (Orbicon, 2014a). Det vurderes dog, at tidshorisonten for en fuld reetablering til de oprindelige forhold i området før indvinding vil komme til at foregå over en længere tidshorisont (>5 år).

En dybdeændring på gennemsnitligt 32 cm i hele ansøgningsområdet og op til ca. 1,5 m lokalt indenfor ansøgningsområdet er en middel grad af påvirkning. Indvindings dybdepåvirkning vurderes dermed samlet set *mindre* i ansøgningsområdet, ingen i påvirkningszonen og i Nordsøen udenfor.

Sedimentspredning

Indvinding på havbunden medfører sedimentspredning og omlerjing af sediment på havbunden. Det frigjorte sediment vil følge strømforholdene, og det aflejres naturligt i de omkringliggende områder. Afhængigt af sedimentets beskaffenhed og de lokale strøm- og bølgeforhold vil sedimentet aflejres relativt hurtigt eller resuspenderes over flere omgange, inden det aflejres i et stabilt miljø.

Sedimentspredningen og omlerjingen af sediment vil forekomme nær området, hvor selve indvindingen pågår, og vil meget hurtigt udjævnes af de fremherskende bølge- og strømforhold i området.

Sedimentspredningen og omlerjingen af sediment vil forekomme nær området, hvor selve indvindingen pågår og vil meget hurtigt udjævnes af de fremherskende bølge- og strømforhold i området. Dette underbygges ligeledes af erfaringer fra en lang række infrastrukturprojekter og råstofsager, som viser, at spildmaterialet kun spredes over et relativt begrænset område (Vejdirektoratet, 2016) (Vejdirektoratet, 2014a) (COWI, 2000) (Rambøll, 2010a). Det er derfor ansøgningsområdet, hvor indvindingen pågår og i ringe grad påvirkningszonen og de øvrige dele af ansøgningsområdet, som kan forventes at blive påvirket af øgede sedimentkoncentrationer i vandsøjlen (Vejdirektoratet, 2016). Sedimentfanerne forsvinder desuden inden for få timer-dage efter indvindingen stopper og påvirkningen er således kortvarig. Sedimentet vil derfor kun spredes i meget begrænset omfang og over korte afstande (se afsnit 6.3.3 for yderligere detaljer om sedimentspredning).

Substratet i området består fortrinsvis af mellemkornet sand med vekslende indhold af fint og groft sand, og indslag af grus. Sedimentspildet vil bestå af samme substrattyper, som der findes i ansøgningsområdet i forvejen. Sedimentspildet vil således ikke medføre en ændring af substratet i ansøgningsområdet. Substratet består typisk af sandede sedimenter og stedvis grovere materialer med hurtig synkehastighed og lavt organisk indhold, som forventes at synke hurtigt til bunds lokalt omkring skibet. Sedimentspredningen fra nærværende indvinding vil desuden være lavere end ved en normal indvinding, idet sedimentet ikke sorteres over sold, og da der forventes en udnyttelsesprocent på 97,5 %, (se Kapitel 4.4). Herudover er ansøgningsområdet meget dynamisk med stor naturlig sandtransport. Sedimentspildet er således meget begrænset og ændrer ikke sammensætningen af substratet i ansøgningsområdet. Påvirkningsgraden vurderes derfor som lav for havbunden i området. Råstofindvindingen er kortvarig, idet den vil foregå i perioder hvert år på mellem 4-88 og 6-97 dage afhængigt af om der foretages en gennemsnitsindvinding eller en maksimalindvinding (inkl. en eller 2 kampagner samtidigt). Det vurderes på denne baggrund, at sedimentspildets påvirkning på substrat- og dybdeforholdene er lav, lokal, kortvarig og reversibel og samlet set *ubetydelig* negativ i ansøgningsområdet og påvirkningszonen.

9.1.4 Sammenfattende vurdering

Indvindingens betydning for substrat- og dybdeforhold i ansøgningsområdet er angivet i Tabel 9-2. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.

Tabel 9-2. Potentielle påvirkninger på substrat- og dybdeforhold ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet og påvirkningszonen.

Tema: Substrat- og dybdeforhold				
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)				
Påvirkning	Omfang	Grad	Varighed (Reversibilitet)	Overordnet betydning
Arealinddragelse	Lokal	Lav	Kort	Ubetydelig
Ændring af havbunden	Lokal	Middel	Lang	Mindre
Sedimentspredning	Lokal	Lav	Kort	Ubetydelig

9.2 Flora og fauna

9.2.1 Metode

I det følgende beskrives de eksisterende forhold i ansøgningsområdet, baseret på gennemførte feltundersøgelser i november 2020 (visuelle verifikationer), eksisterende viden fra området og effektstudier foretaget i andre råstofområder i Danmark. Desuden vurderes de potentielle miljøpåvirkninger på bundflora og –fauna som følge af indvindingen.

Beskrivelsen og vurderingen af indvindingens påvirkning på de biologiske værdier omfatter kun ansøgningsområdet og påvirkningszonen. Der er dog ikke adskilt mellem arter og dækningsgrader observeret i naturtyperne i ansøgningsområdet og undersøgelsesområdet, idet observerede arter og dækningsgrader i undersøgelsesområdet formodes også at kunne forekomme i ansøgningsområdet.

Bundflora og –fauna for det fulde undersøgelsesområde er beskrevet i Kapitel 8.

9.2.2 Eksisterende forhold

I nærværende afsnit beskrives forholdene i ansøgningsområdet og den tilhørende påvirkningszone (se Figur 9-6).

Der blev observeret 3 naturtyper:

- Naturtype 1b = sandbundssamfund
- Naturtype 2a = grusbundssamfund
- Naturtype 2b = Substrattype 2b - sandbund med enkelte større sten (>10cm, op til 10% dækningsgrad)



Figur 9-6. Naturtypekort for ansøgningsområdet og påvirkningszonen med angivelse af ROV-stationer.

Naturtype 1b sandbundssamfund dominerede hele ansøgningsområdet (98% dækningsgrad) og naturtype 2 "blandet bund med enkelte store sten" udgjorde en mindre del (2%). I påvirkningszonen udgjorde naturtype 1b og 2 henholdsvis 95% og 5%. Arealfordelingen for de observerede naturtyper er vist i Tabel 9-3.

Tabel 9-3. Arealfordeling af naturtyperne i ansøgningsområdet og påvirkningszonen omkring ansøgningsområdet. Ansøgningsområdet + påvirkningszonen er lig undersøgelsesområdet.


Naturtype	Ansøgningsområde		Påvirkningszone	
	km ²	%	km ²	%
1b	18.20	98	9.90	95
2	0.33	2	0.53	5
Total	18.53	100	10.43	100

Alle observerede arter og dækningsgrader for makroalger, bundfauna og fisk er vist i Tabel 8-2. Der adskilles ikke mellem arterne fundet i undersøgelsesområdet og ansøgningsområdet, idet disse alle forventes potentielt at kunne findes i samme naturtyper.

Bundflora Der blev ikke observeret bundflora på nogle af naturtyperne. Bundflora observeredes ikke på sandbunden fortrinsvis pga. manglende hårdt substrat, stor dynamik og relativt stor dybde (22-37 m).

Sandbundssamfundet (naturtype 1b) bestod fortrinsvis af fin, dynamisk sandbund med observerede bølgeribber. Faunadækningen var lav (<1% dækning af bunden) og domineret af infaunaaktivitet såsom børsteorme, børsteormerør, Phoroniderør, Lanicerør, sømushuller,

sømuskaller og muslingeskaller bl.a.: knivmuslingeskaller, molbøstersskaller og hjertemuslinger (Figur 9-7). Dominerende epifauna var almindelig søstjerne, pigget søstjerne, herudover observeredes: kamstjerne, svømmekrabbe, taskekrabbe, strandkrabbe, eremitrebs, konksneglehuse og rovbørsteormen *Ophiodromus* sp (se Tabel 8-2, Figur 8-3, Figur 8-3). En del fiskearter og tobisstimer blev observeret (dækningsgrad generelt 0-1%, 2-5% hvor tobisstimer) kutlinger og knurhane, fladfiskefourageringshuller, fløjfisk, rødspætte, ising, søtunge især juvenile individer, fjæsing, torskefisk, sej (Tabel 8-2, Figur 8-4).



Figur 9-7. Naturtype 1b – sandbundssamfund med fin sandbund en taskekrabbe med hydroider på skjoldet og små tobis i vandsøjlen (gul cirkel). (ROV station R14).

Grusbundssamfundet (naturtype 2a) havde den laveste dækningsgrad for bundfauna (<1%) og meget få sandormehobe formodentligt pga. stor dynamik og omblanding af bundsubstratet. Grusbundssamfundet var domineret af infauna i form af diverse muslingeskaller (knivmuslingeskaller, molbøstersskaller, hjertemuslinger), enkelte børsteormerør, Lanicerør, Phoronisrør, sømushuller og muslingesifonhuller. Epifaunaen bestod af alm. søstjerne, kalkrørsorm og enkelte bladmos (Figur 8-5, Figur 8-6). Meget få fisk blev observeret inkl. fløjfisk, kutling, rædspætte og uspec. fladfisk.

Blandet bund (naturtype 2b) med enkelte store sten (>10 cm) forekom på én station i den sydligste del af undersøgelsesområdet (R18). På sandbunden mellem stenene observeredes samme arter som beskrevet ovenfor for sandbundssamfundet. Epifaunaen på de få store sten inkluderede bladmosdyr, hydroider, kalkrørsorm og alm. søstjerne. Få uspecifiserede fladfisk blev observeret (<1% dækningsgrad).

Samlet set blev der observeret ca. 0 makroalgearter/taxa, ca. 18 bundfaunaarter/taxa og ca. 10 fiskearter/taxa.



Figur 9-8. Blandet bund med enkelte store sten med hydroider, bladmos, kalkrørsorm. (ROV station R18).

De observerede arter er alle almindelige for Vestkysten og Nordsøen og tilsvarende epifauna- og infaunasamfund er fundet i miljøundersøgelser for råstofområderne langs vestkysten og på jyske rev (Orbicon, 2018a; Orbicon, 2018b; Orbicon, 2018c), for havmølleparker langs Vestkysten (Vattenfall, 2020a; Vattenfall, 2020b; Orbicon, 2014) sandfodringsprojekter (Rambøll, 2020) mm.

Samlet set vurderes de biologiske samfund i undersøgelsesområdet som almindeligt forekommende i Nordsøen og i andre danske farvande med tilsvarende dybde- og salinitetsforhold. Der blev ligeledes ikke registreret rødlistede (DK eller HELCOM (HELCOM, 2019)) eller særligt sårbare eller sjældne arter.

9.2.3 Miljøpåvirkninger

De potentielle påvirkninger som følge af råstofindvindingen på bundflora og -fauna i de forskellige bundsamfund i ansøgningsområdet kan medføre følgende ændringer:

- Arealinddragelse (habitattab)
- Ændring af havbunden (ændring af dybde og substratforhold)
- Sedimentspredning

I det følgende vurderes den specifikke påvirkning af indvindingen på flora og fauna i de forskellige bundsamfund i ansøgningsområdet.

Arealinddragelse

Indvindingen vil medføre habitattab for bundflora og -fauna i form af direkte arealinddragelse, substrat- og dybdeændringer i ansøgningsområdet. Der forventes ingen ændringer af de biologiske samfund i påvirkningszonen.

Direkte arealpåvirkning af indvinding

Indvindingen vil først og fremmest medføre en direkte påvirkning i og omkring selve indvindingsfartøjet ved fjernelse af substrat fra havbunden, som vil medføre fjernelse af bundfauna og -flora i indvindingsområdet. Dette medfører en høj mortalitet af bundflora og -fauna i det påvirkede område. Indvindingsmaterialet køres ikke over sold i nærværende projekt (ca. 97,5 % udnyttelsesprocent), og returneringen af fraserteret materiale vil derfor være meget begrænset. Mobil fauna vil i nogen grad kunne fjerne sig fra sugehovedet og dermed undgå at blive suget med op sammen med indvindingsmaterialet.

Indvindingen vil medføre, at ansøgningsområdet periodisk inddrages over en 10-årig periode. Arealmæssigt kan slæbesugningen potentielt påvirke ca. 7% eller 28% af ansøgningsområdet pr år ved henholdsvis en gennemsnitlig eller maksimalfodring (Tabel 6-4). Slæbesugningen kan maksimalt påvirke et areal på ca. 15,38 km² over en 10-årig periode svarende til 83% af ansøgningsområdet. Maksimalfodringer hvert år er meget usandsynligt, idet maksimalfodringer er tiltænkt særlige år, hvor der har været kraftige stormhændelser og erosion af kysten. Den arealmæssige påvirkning vil forventeligt være mindre, da indvindingen ofte vil være koncentreret i mindre delområder med egnet råstofforekomst.

De observerede bundflora- og bundfaunaarter i ansøgningsområdet er almindeligt udbredt i Nordsøen (Køie & Kristiansen, 2014) og forventes genetablerede indenfor 2-5 år (Rambøll, 2020; Vattenfall, 2020a; Essink, 1999; Essink et al., 1997). Genetableringstiden for bunddyr og planter sker hurtigt i slæbesporene, hvor bunddyr og planter kan begynde genetableringen umiddelbart efter indvindingens ophør. Bundfauna spredes som æg eller larver med havstrømmene og forventes at ville kunne genetablere sig i området inden for få år efter endt indvinding. Genetableringen af gravende bunddyr i et forstyrret/opgravet område vil foregå relativt hurtigt, og de første arter vil genetablere sig allerede i sommermånederne, ved gravning og sedimentspild i foråret inden maj (Hygum, 1993) (Støttrup et al., 2013). Undersøgelser i forbindelse med råstofindvinding viser ligeledes en genetablering af bundflora og fauna få år efter påvirkningen (Orbicon, 2014) (Orbicon, 2016). Indvindingen forløber over 10 år og vil gennemsnitligt påvirke 83% af ansøgningsområdet i løbet af de 10 år, hvis arealpåvirkningen fordeles jævnt i ansøgningsområdet. Ved en genetableringstid for bundfauna på 2-5 år vil mere end halvdelen af det påvirkede areal altså være genetableret ved den 10-årige indvindingsperiodes udløb, hvilket betyder at det maksimalt vil være $83/2 = 41,5\%$ af ansøgningsområdet der er påvirket af indvindingen, ligesom det maksimalt er 7-28% af ansøgningsområdet der påvirkes pr år. Påvirkningsgraden vurderes derfor til middel for bundfauna og -flora i ansøgningsområdet.

Der vurderes dermed ikke at være en længerevarende ændring i biodiversiteten i ansøgningsområdet, og et reduceret antal arter vil udelukkende forekomme indenfor ansøgningsområdet i genetableringsperioden for bundsamfundet. Bundflora- og faunadiversiteten i påvirkningszonen og i Nordsøen udenfor området vil ikke blive påvirket.

Arealinddragelsen/habitattabet er reversibelt og midlertidig (>5 år) i forhold til påvirkning på bundplanter og -dyr i ansøgningsområdet, der kan genetablere sig indenfor 2-5 år efter indvindingens ophør. Påvirkningsgraden er middel, da det er en mindre del af arealet i ansøgningsområdet, der påvirkes samlet set. Det vurderes derfor, at arealinddragelsen vil

medføre en *Moderat negativ* påvirkning af bundflora og -fauna i ansøgningsområdet. Indvindingen vil ikke have en direkte påvirkning på havbunden i påvirkningszonen eller udenfor.

Ændring af Havbunden

Substrattype 1b bliver ikke ændret i ansøgningsområdet, som følge af indvindingen, og vil derfor ikke medføre væsentligt ændrede bundsamfund i området. Infaunasamfundet er i forvejen meget variabelt i lignede kystområder (Vattenfall, 2020a; Rambøll, 2019b; Rambøll, 2020a; WSP/Rambøll, 2021).

Dybdeændringer i ansøgningsområdet i størrelsesordenen 32 cm op til ca. 1,5 m er ikke store nok til medføre væsentlige ændringer i det forekommende bundfaunasamfund, som findes på alle dybder i området og dybere, som observeret i andre undersøgelsesområder for bundfauna i tilsvarende dybdeintervaller langs Vestkysten og på Jyske Rev (Vattenfall, 2020a; Rambøll, 2019b; Rambøll, 2020a; WSP/Rambøll, 2021; Orbicon, 2018; Orbicon, 2018c).

Det vurderes derfor, at der ikke forekommer ændrede substratforhold eller dybdeforhold, som følge af indvindingen, som vil påvirke den naturlige udbredelsen af bundfauna og flora i ansøgningsområdet eller påvirkningszonen, og påvirkningen vurderes *ubetydelig* negativ for bundflora- og fauna.

Sedimentspredning

Indvinding medfører sedimentspild, primært ved overløb og omkring sugehovedet på havbunden. Sedimentspildet forekommer dels som øgede sedimentkoncentrationer i vandsøjlen, mens indvindingsaktiviteten pågår, og efterfølgende sedimentation af det ophvirvlede sediment på havbunden. Det spildte materiale kan, afhængig af kornstørrelse og de specifikke strømforhold i området, spredes i ansøgningsområdet og dermed potentielt påvirke de biologiske samfund.

Der forventes en 97,5% udnyttelse af det indvundne sediment ved den ansøgte indvinding, som dermed ikke sorteres over sold og medfører mindre sedimentspild end for råstofindvinding med sortering over sold. Sedimentspredningen vil foregå i forbindelse med kortvarige indvindingsperioder på 4-88 dage og op til 6-97 dage ved henholdsvis en gennemsnitsindvinding og en maksimalindvinding.

Sedimentet i ansøgningsområdet består hovedsageligt af mellemkornet sand stedvist med lidt grus ($d_{50} = 0,3-0,4$ mm), der relativt hurtigt synker ud af vandsøjlen. Sedimentspredningen forventes på denne baggrund at være meget begrænset. Sedimentmodellering viser generelt at spredningen af sedimentspild ved råstofindvinding er begrænset og fortrinsvis forekommer i selve indvindingsområdet og i påvirkningszonen (se afsnit 6.3.3 - Sedimentspredning). Sedimentfanerne forsvinder desuden inden for få timer-dage efter indvindingen stopper og påvirkningen er således kortvarig. Sedimentet vil derfor kun spredes i meget begrænset omfang og over korte afstande.

Sedimentspredning/sedimentation vil ikke medføre væsentlige ændringer af bundfauna og bundfaunasamfundet i ansøgningsområdet. De fleste arter knyttede til de dynamiske

sandbunde langs den jyske Vestkyst er robuste og i stand til at tåle regelmæssig omlejring, forstyrrelse, begravelse og høje sedimentkoncentrationer i vandsøjlen (Culter and Mahadevan, 1982; Nelson, 1993; DONG Energy, Vattenfall, The Danish Energy Authority and the Danis Forest and Nature Agency, 2006; Rambøll, 2020c).

Mange bundfaunaarter tåler større og mindre aflejringer. Mobile muslingearter som sandmusling, molbøsters og hjertemusling kan fx klare månedlige aflejringstykkelser på 5-18 cm pr måned og engangsaflejringer på 10-40 cm (Dalfsen & Essink, 2001). (Powilleit et al., 2009). De mindre mobile blåmuslinger er derimod sårbare overfor pålejring af sediment, og kan ikke klare en aflejringstykkelse på mere end 1-2 cm (Essink, 1999). Hovedparten af børsteormene lever nedgravet i sedimentet og graver effektivt (Essink, 1999) (Powilleit et al., 2009).

Påvirkningen fra sedimentspredningen er reversibel, kortvarig og forekommer indenfor få hundrede meter omkring skibet. Bundfaunaen er almindeligt forekommende i de indre danske farvande (Køie & Kristiansen, 2014) og er generelt godt tilpasset til et dynamisk miljø med stor variation i suspenderet sediment og sedimentoverlejring. Graden af påvirkningen vurderes derfor til lav. Det vurderes samlet set, at sedimentspredning fra indvindingen vil medføre en *ubetydelig negativ* påvirkning af bunflora og -fauna samfundene i ansøgningsområdet og påvirkningszonen.

9.2.4 Sammenfattende vurdering

Indvindingens betydning for bundflora- og fauna i ansøgningsområdet er angivet i Tabel 9-4. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.

Tabel 9-4. Potentielle påvirkninger af bundflora og -fauna ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.

Tema: Flora og fauna				
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)				
Påvirkning	Omfang	Grad	Varighed (Reversibilitet)	Overordnet betydning
Arealinddragelse/habitattab	Lokal	Middel	Midlertidig	Moderat
Ændring af havbunden (substrat og dybde)	Lokal	lav	Kortvarig	Ubetydelig
Sediment-spredning	Lokal	Lav	Kortvarig	Ubetydelig

9.3 Fisk og erhvervsfiskeri

Indvindingen kan potentielt have en negativ indvirkning på områdets fisk og være i konflikt med kommercielle fiskeriinteresser.

9.3.1 Metode

Fisk og fiskeri i området beskrives på baggrund af eksisterende viden og er suppleret med observationer fra de biologiske undersøgelser gennemført med ROV i forbindelse med Miljøundersøgelserne (Fase IIA) (Kapitel 8).

9.3.2 Eksisterende forhold


Nordsøen er et af verdens mest produktive områder for fisk og giver ophav til et intensivt kommercielt fiskeri. Af det danske fiskeri foregår næsten 75 % i Nordsøen og Skagerrak (Fiskeri i tal, 2020). Der er registreret flere kommercielt vigtige fiskearter i Nordsøen, herunder torsk, kuller, hvilling, sej, rødspætte, tunge, pighvar, makrel, sild, sperling, brisling, tobis og kulmule. Gennem de seneste årtier er, der dog sket store ændringer i hyppigheden af de forskellige fiskearter, hvilket primært tilskrives perioder med intensivt fiskeri (Fiskeri i tal, 2020; Van Gemert & Andersen, 2018).

Ansøgningsområdet er domineret af sand, med enkelte steder med småsten og grus, hvilket især foretrækkes af fladfisk og tobis. Under de visuelle verifikationer blev, der generelt registreret få fisk (0-1% dækningsgrad). På sandbunden (substrattype 1b) blev, der primært observeret fladfisk, herunder rødspætte, ising og tunge, samt fladfiskefourageringshuller. Der blev generelt observeret en del juvenile tunger i området. Af andre fiskearter, blev der registreret torsk, sej, kutling, knurhane, fløjfisk og fjæsing. På 3 ud af 20 stationer blev der ligeledes observeret stimer af tobis (ROV station R14-16). Den overordnet dækningsgrad af fisk på sandbunden var 0-1%, mens der ved tobisstimerne var en dækningsgrad på ca. 2-5%. På naturtypen 2a (grusbund) blev, der observeret meget få fisk (<1% dækningsgrad), herunder kutling, fløjfisk, rødspætte og en fladfisk uspec. (kunne ikke artsbestemmes på ROV videoen). På station R18 med naturtypen 2b (sandsbund med større sten) var der ligeledes en dækningsgrad af fisk på <1%, og der blev registrerede en fladfisk uspec. For yderligere detaljer se Tabel 8-2.

Der blev samlet observeret ca. 10 fiskearter, herunder 5 kommercielle arter på ROV-videoerne i ansøgningsområdet og påvirkningszonen i 2020. På Figur 9-9 og Figur 9-10 ses en rødspætte og en stime tobis, der blev registreret ved hhv. ROV station R14-16 i undersøgelsesområdet.



Figur 9-9 Rødspætte observeret på ROV station st. R01.



Figur 9-10 Stime af tobis observeret på ROV station st. R14.

I det følgende beskrives udbredelsen og biologien for et repræsentativt udsnit af de fiskearter, der forventes at forekomme i eller tæt på indvindingsområdet.

Tabel 9-5 giver en oversigt over, hvorvidt arten er kommercielt vigtig, samt oplysninger omkring deres gydeområder, opvækstområder og de livsstadier af arterne, som forventes at forekomme i undersøgelsesområdet.

Tabel 9-5 Oversigt over kommercielt vigtige og ikke kommercielle arter i Nordsøen. Tabellen angiver forekomst + og forventet forekomst (+) af arten ved ansøgningsområdet, samt hvilke livsstadier, der kan være til stede. Juvenile individer svarer til ikke kønsmodne fisk. Gydeområde og opvækstområde for visse arter er også angivet. (tabellen er modificeret fra (Rambøll, 2020) og (DHI, 2000) og suppleret med oplysninger fra Danmarks Fiskeatlas).


Art	Kommerciel interesse	Gydeområde og gydetidspunkt	Opvækstområde	Juvenile	Voksne
Torsk (<i>Gadus morhua</i>)	Ja	Hele Nordsøen 10 m og dybere 4-6°C <i>Januar-maj</i>	Jyske Vestkyst, den centrale del af Nordsøen	+	+
Sej (<i>Pollachius virens</i>)	Ja	Nordlige Nordsø Ca. 200 m <i>Januar-maj</i>	Kystnære områder	(+)	+
Hvilling (<i>Merlangius merlangus</i>)	Ja	Hele Nordsøen 20-150 m, 5-10 °C <i>Marts-maj</i>	På lavt vand ved kyster	(+)	+
Sild (<i>Clupea harengus</i>)	Ja	Østlige del af Nordsøen 10-20 m <i>Forår</i> <i>Æg fastklæbes på groft sand og grus</i>	Sydlig og østlige Nordsø inkl. Jyske vestkyst i dansk EEZ	+	+

Art	Kommer- ciel interesse	Gydeområde og gydetidspunkt	Opvækstområde	Juve- nile	Voks- ne
Brisling (<i>Sprattus sprattus</i>)	Ja	Sydøstlige Nordsø 10-20 m <i>Januar-juli</i>	Samme som de voksnes	+	+
Kulmule (<i>Merluccius merluccius</i>)	Ja	Nordlige Nordsø 100-300 m <i>December-juli</i>	-	(+)	+
Kysttobis (<i>Ammodytes tobianus</i>)	Ja	Kystnært <30 m <i>Marts-april og september</i> <i>Æg i grus</i>	Samme som de voksnes	+	+
Havtobis (<i>Ammodytes marinus</i>)		Mest på banker <80m <i>December-januar</i> <i>Æg i grus</i>	Samme som de voksnes	+	+
Plettet tobiskonge (<i>Hyperoplus lanceolatus</i>)		Langs kysterne og dybere 20-100 m <i>April-august</i> <i>Æg i grus</i>	Samme som de voksnes	+	+
Tunge (<i>Solea solea</i>)	Ja	Sydlig Nordsø 20- 50 m 6-12°C <i>April-juni</i>	Lavt vand langs kyster	+	+
Rødspætte (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Ja	Sydlig og centrale Nordsø 20-40 m 6°C <i>December-maj</i>	Langs kyster, de vigtigste i Vadehavet	(+)	+
Pighvar (<i>Psetta Maxima</i>)	Ja	Ingen kendte områder i dansk EEZ i Nordsøen <i>April-august</i>	Langs kyster	(+)	+
Slethvar (<i>Scophthalmus rhombus</i>)	Ja	Nordsøen 10-20 m	-	(+)	+
Ising (<i>Limanda limanda</i>)	Ja	Hele Nordsøen 20- 40 m <i>April-juni</i>	-	(+)	+
Grå knurhane (<i>Eutrigla gurnardus</i>)	Nej	Ved kysterne og dybere 10-150 m <i>April-august</i>	-	(+)	+
Fløjfisk (<i>Callionymus sp.</i>)	Nej	Langs kysterne og ud til 400 m dybde <i>April-august</i>	-	(+)	+

Art	Kommer- ciel interesse	Gydeområde gydetidspunkt	og	Opvækstområde	Juve- nile	Voks- ne
Sandkutling (<i>Pomatoschistus minutus</i>)	Nej	Langs kysterne Sand Sommer Æg på skaller - bevogtes	-		(+)	+

Torsk (*Gadus morhua*) er udbredt i en stor del af det nordlige Atlanterhav og forekommer i hele Nordsøen og langt ind i Østersøen, både kystnært og ud til vanddybder på 600 meter. Torsken gyder i store dele af den centrale og sydlige del af Nordsøen. De pelagiske larver føres med strømmen nordpå ud for den jyske vestkyst (Worsøe et al., 2002). Der er ikke kortlagt specifikke opvækstområder for torsk i nærheden af ansøgningsområdet, men fangster fra "International 0-group gadoid surveys" viser, at der kan findes større mængder pelagiske juvenile torsk i området (ICES a, 2011; ICES b, 2011) (Figur 9-11). Lodbjerg B er ikke et kendt gyde- eller opvækstområde for torsk.

Torsk er en kommercielt vigtig fiskeart, som fiskes i samtlige danske farvandsområder, arten forekommer dog primært i områder med stenet bund. Ansøgningsområdet består primært af sand og småsten med enkelte områder med større sten. Mindre individer (< 40 cm) af torsk forekommer især i Skagerrak og langs den nordvestlige kyst af England, mens større individer (> 40 cm) spreder sig til de mere centrale dele af den nordlige Nordsø (DTU Aqua, 2012). Juvenile og voksne torsk findes langs strækningen ved Lodbjerg. Der observeret én uspec. torskefisk på ROV station R09 i ansøgningsområdet.



Figur 9-11 Kendte gyde- og opvækstområder for torsk i Nordsøen og Skagerrak. Venstre: Lysegul: almindelige gydeområder. Gul: vigtige gydeområder efter (Worsøe et al., 2002). Orange: gydeområder efter (Coull et al., 1998). Blå: opvækstområder ifølge (Coull et al., 1998). Højre: Forekomster af torskeæg i det internationale ichthyoplankton survey i foråret 2004. Lysegul: områder med forholdsvis få æg. Gul: områder med mellemstore forekomster af æg. Orange: områder med forholdsvis mange æg efter (Munk et al., 2009; ICES, 2007). Blå: områder med forholdsvis høje fangster af pelagiske juvenile i "International 0-group gadoid surveys". Lyserød: områder med forholdsvis høje fangster af 0- og 1-årige torsk i IBTS (ICES a, 2011; ICES b, 2011). Ansøgningsområdet er angivet med rød firkant. Kilde (DTU Aqua, 2012).


Tobis, havtobis (*Ammodytes marinus*) er den hyppigst forekommende tobis, men derudover findes også kysttobis (*Ammodytes tobianus*) og plettet tobiskonge (*Hyperolus lanceolatus*). Tobis er en vigtig kommerciel industrifisk i Nordsøen og et vigtigt byttedyr for mange havfugle, rovfisk og havpattedyr.

Tobisen veksler mellem at være nedgravet og søge planktonføde i små stimer og er tilsyneladende udpræget stationær efter larvestadiet. I alle livstadier består føden af forskellige planktonorganismer. For voksne tobiser kan det f.eks. være silde- og tobislarver. Den lever på dybder mellem 20-80 m (Worsøe et al., 2002), og især fiskebanker er blandt vigtige økologiske områder for havtobisen (DTU Aqua, 2012). Fiskebanker er særlige områder i havet, hvor der er gode muligheder for fangster. Områderne har som regel mindre vanddybde end det omkringliggende hav og har en stor produktion af føde for fiskene. Nogle af de mest kendte er Doggerbanke, Fladen og Viking Banke i Nordsøen. Tobis svømmer om sommeren frit omkring og er mere aktiv i længere perioder, hvor den fouragerer.

Tobisens æg er demersale og klæber sig fast til sedimentet, hvor de senere klækkes. Havbunden i gydeområderne består af groft sand (kornstørrelse: 0,25 – 1,2 mm) med lavt indhold af silt og med stærk strøm over havbunden på ned til ca. 80 meters dybde (Figur 9-12). Sedimenttypen har afgørende indflydelse på udbredelse af tobisen (Wright, Jensen, & Tuck, 2000; Laugier et al., 2015). Havtobisens larver er pelagiske og driver typisk 100-200 km med strømmen (Chistensen et al., 2008). Ved en størrelse >30 mm søger de pelagiske larver aktivt mod bankerne, hvor den voksne bestand opholder sig (DTU Aqua, 2012).

Tobis fanges kommercielt i Nordsøen, hvor fiskeriet i den danske EEZ især er koncentreret omkring Horns Rev og Jyske Rev, der også er blandt de vigtige fangstområder tættest på ansøgningsområdet (DTU Aqua, 2012). Ansøgningsområdet ligger i et potentielt gydeområde (Figur 9-12). Der blev observeret stimer af tobis i ansøgningsområdet på flere ROV stationer (R14, R15 og R16) på naturtype 1b (sandbund).


Tobisen er en af de fiskearter, som potentielt er sårbar overfor råstofindvinding af sand, grus og ral. Dette skyldes dels, at de voksne har en adfærd, hvor de graver sig ned og dels artens valg af gydeområder.



Figur 9-12 . Kendte gyde- og opvækstområder for havtobis i Nordsøen og Skagerrak. Orange illustrerer områder med høje koncentrationer af juvenile og voksne individer defineret ud fra sediment og fiskerimønstre. Gule områder viser potentielle yderligere gydeområder. Da tobisunglen er afhængig af tilgængeligheden af velegnet bundsubstrat for at kunne bundfælde, findes opvækstområderne stort set i de samme habitater hvor de voksne fisk lever og gyder. Ansøgningsområdet er angivet med rød firkant. Kilde (DTU Aqua, 2012).


Andre fisk af relevans i Nordsøen omfatter:

Sild (*Clupea harengus*). Der findes flere gydebestande i Nordsøen, men det er dog ikke muligt at adskille dem fiskerimæssigt, og derfor forvaltes de som én bestand. Silden gyder i Nordsøen i foråret, hvor de gyder demersalt og æggene fastklæbes på groft sand og grus i en dybde af 10 til 20 m. Dybden i ansøgningsområdet ligger mellem 22 og 37 m og således formodentligt ikke et gydeområde. Når æggene er klækket, driver de med strømmen til opvækstområderne. Der findes flere kendte gydeområder i Nordsøen, disse ligger dog primært i den vestlige del af Nordsøen, med kun mindre områder langs den jyske vestkyst (Figur 9-13) (Worsøe et al., 2002; DTU Aqua, 2012). Sild blev ikke observeret ved miljøundersøgelserne, dog ligger ansøgningsområdet i artens opvækstområde (blå markering).



Figur 9-13 Kendte gyde- og opvækstområder for sild i Nordsøen og Skagerrak. Gul: gydeområder, blå: opvækstområder. Ansøgningsområdets placering er angivet med rød firkant. Kilde (Worsøe et al., 2002; DTU Aqua, 2012)

Brisling (*Sprattus sprattus*). Brisling er en pelagisk stimefisk ligesom sild, der lever i fjorde og kystnære farvande. Ligesom silden lever brisling af plankton og foretager derfor vertikale døgnvandring betydelig, at arten i de lyse timer af døgnet findes dybere end i de mørke timer af døgnet. Brislingen gyder pelagiske æg mellem januar og juli i Nordsøen, og æggene forekommer i størstedelen af brislingens udbredelsesområde. Der er identificeret specifikke områder, hvor der er høj forekomst af gydende individer bl.a. den sydøstlige Nordsø og Skagerrak, hvilket ikke er i nærheden af ansøgningsområdet (Worsøe et al., 2002; DTU Aqua, 2012) (Figur 9-14). Ansøgningsområdet er beliggende i opvækstområdet for brisling, arten blev dog ikke observeret ved miljøundersøgelserne (ROV).



Figur 9-14 Kendte gyde- og opvækstområder for brisling i Nordsøen og Skagerrak. Gul: gydeområder, blå: opvækstområder. Ansøgningsområdets placering er angivet med rød firkant. Kilde (Worsøe et al., 2002; DTU Aqua, 2012)

Fladfisk (rødspætte (*Pleuronectes platessa*), tunge (*Solea solea*), pighvar (*Psetta maximus*), slethvar (*Scophthalmus rhombus*), ising (*Limanda limanda*) optræder alle langs den jyske vestkyst. Vestkysten udgør vigtige opvækstområder for mange af Nordsøens fladfiskearter, som benytter kysten i kortere eller længere perioder til fouragering og beskyttelse mod større fisk (Støttrup et al, 2020).

Rødspætte, tunge og ising blev observeret ved de visuelle verifikationer (ROV-video) på halvdelen af de 20 stationer (R01, R05, R08, R09, R12, R13, R14, R17, R18 og R19). Derudover blev der observeret fladfiskefourageringshuller på stationerne R01, R03, R06, R07, R08, R09, R12, R13, R17, R19 og R20, og der blev ligeledes observeret flere juvenile tunger på to stationer (R13 og R17) på naturtype 1b (sandbund).

Kystområdet nær Agger Tange er et vigtigt opvækstområde for rødspætter. I maj måned, når temperaturen når 10-12°C, trækker et-årige og ældre rødspætter ind i Agger Tange området (Støttrup et al. , 2006). Hen mod efteråret søger de mod dybere vand (Støttrup et al., 2005). Vadehavet og området nord for Thyborøn er vigtige opvækstområder for rødspætter, hvorimod området fra syd for Thyborøn ned til Horns rev ikke anses som et vigtigt opvækstområde. I Nordsøen fanges rødspætter i blandede fiskerier, hvor andre arter er

målarter, f.eks. i bundtrawl efter torsk eller bomtrawl efter tunge (Støttrup et al. , 2006). Der blev ved miljøundersøgelserne registrerede flere rødspætter på bunden i ansøgningsområdet, og juvenile eksemplarer må også formodes at kunne forekomme i området.

Der blev ved miljøundersøgelserne observeret flere juvenile tunger i området. Tungens udbredelse er afgrænset af temperaturen, og Nordsøen og Kattegat er artens nordligste udbredelsesområde (MacKenzie & Visser, 2001) Arten er generelt udbredt ved kystnære områder fra det helt lave vand og ud til 150 meters dybde, overvejende på relativ blød eller sandet bund.

Omkring Danmark har man ud fra genetiske undersøgelser, baseret på fund af kønsmodne fisk samt observationer af æg og larver, identificeret to forskellige gydebestande af tunger, én bestand i Nordsøen og én bestand i Skagerrak, Kattegat og de indre danske farvande (Cuveliers et al., 2012). I Nordsøen er gydeområdet placeret ved den jyske vestkyst fra Ringkøbing Fjord sydover til Vadehavet. Tungens yngel findes stort set i de samme områder hvor gydningen finder sted, som regel på meget lavt vand helt tæt på kysten (Boje & Carl, 2020). Juvenile tunger blev dog observeret i ansøgningsområdet, hvorfor Lodbjerg B ser ud til at være en del af et opvækstområde for arten, som dog formodentligt strækker sig langs det meste af vestkysten.

Pighvar, slethvar og ising gyder inden for hele deres udbredelsesområde. Lodbjerg B er dog ikke kendt som et vigtigt gyde- eller opvækstområde for nogle af disse arter.

9.3.2.1 *Fiskeri*


Der forekommer ikke tilgængelige fiskeridata fra ansøgningsområdet. Dog foregår, der generelt fiskeri med både bundsløbende (f.eks. bundtrawl, bomtrawl, snurrevod og muslingeskrabere) og ikke bundsløbende fiskeriredskaber (herunder garn, pelagisk trawl og not, samt andre passive redskaber) langs den Jyske Vestkyst (Naturstyrelsen, 2013a; Naturstyrelsen, 2013; ICES, 2020), hvorfor der må forventes at være fiskeri i eller tæt på ansøgningsområdet i perioder. Foruden danske fiskeriinteresser i området, må udenlandske fiskefartøjer tillige udøve fiskeri, idet ansøgningsområdet er beliggende udenfor 3 sømilegrænsen. F.eks. er tungefiskeriet i Nordsøen i dag fortrinsvis et hollandsk fiskeri, der er et blandet fiskeri efter rødspætte og tunge med primært bomtrawl (ICES, 2020; Boje & Carl, 2020). Det hollandske bomtrawlfiskeri strækker sig endvidere ind i Skagerrak (Boje & Carl, 2020).

De vigtigste kommercielle fiskearter i Nordsøen (ICES-område IV), hvori ansøgningsområdet er beliggende inkluderer foruden tunge også bl.a. torsk, sej, hvilling, kuller, tobis, rødspætte og pighvar (ICES, 2020).

Der har ved tidligere råstofindvindingsansøgninger været ønske fra fiskerne om, at der tages hensyn til særlige fiskepladser, og at der tages hensyn til fiskefartøjer og -grej (Orbicon, 2019).

Fritidsfiskeri

DTU-Aqua har i en årrække kørt nøglefiskerprojektet, der har til formål at registrere fiskefangsterne og få dokumenteret fiskeforekomster langs de danske kyster over en årrække (Støttrup et al, 2020). Projektområdet er beliggende lige syd/vest for området "Åbne Vestkyst" (Figur 9-15), hvor der kun er registreret data fra en enkelt nøglefisker, der har fisket med garn. Indsatsen er nogenlunde stabil over årene med mellem fire og otte fisketure per år siden 2014.



Figur 9-15 Kort over nøglefiskerområdet "Åbne Vestkyst". Kilde: (Støttrup et al, 2020).


I området blev, der registreret i alt 11 forskellige fiskearter med garn i perioden 2017-2019. I garnfangsterne blev, der primært registreret fladfisk, som forekom i størst antal. De resterende 8 arter er sammenlagt under kategorien "Andre arter", som dækker over arterne pighvar, skrubbe, slethvar, stavsild, torsk, grå knurhane, laks og makrel (Figur 9-15) (Støttrup et al, 2020).

Rødspættens dominans i fangsterne er tydelig og har været dominerende i de seneste seks år og afspejler artens fremgang i det seneste årti i Nordsøen. Fangsten af rødspætter ligger generelt også højt sammenlignet med de øvrige nøglefangstområder, hvor fangsterne er meget lave og ligger under én per garnindsats, mens gennemsnittet af den årlige fangst i det åbne vestkystområde har ligget på omkring fem (Støttrup et al, 2020).

Ising er gået tilbage, og skrubbe og pighvar, som har været dominerende før 2014, fanges nu mere sjældent. Til gengæld fanges der flere tunge i perioden 2017-2019, og de blev fanget alle tre år. Torsk blev ikke fanget i 2018 og 2019 i området (Støttrup et al, 2020).

Antallet af arter, der er blevet registreret ved nøglefiskeriet, har hvert år varieret mellem seks og otte. Fladfisk, såsom pighvar, rødspætte, ising og tunge, blev fanget hvert år, mens skrubbe og slethvar kun blev fanget enkelte år (Støttrup et al, 2020).

Der er udelukkende fisket med garn i området, da nøglefiskerruserne ikke egner sig til den kraftige vind og strøm, der findes langs Vestkysten.



Figur 9-16 Fordelingen af fangster i Åbne Vestkyst i garn opgjort i antal for perioden 2005-2016 (før 2017; grå søjler) og for perioden 2017-2019 (sorte søjler). Kilde: (Støttrup et al, 2020).

9.3.2.2 Samlet vurdering for fisk og fiskeri

Der blev generelt observeret få fisk, fordelt på samlet ca. 10 fiskearter, på ROV-videoerne i ansøgningsområdet og påvirkningszonen. Sandbunden var domineret af fladfisk (rødspætte, tunge og ising) med enkelte andre arter, herunder torsk, knurhane, fløjfisk og kutling. Der blev observeret 4 af målarterne for det eksisterende fiskeri i ansøgningsområdet, herunder torsk, rødspætte, tunge og pighvar.

Fødegrundlaget for fisk i ansøgningsområdet er domineret af børsteorme, muslinger, krebsdyr samt mindre fisk, for de fiskespisende arter som f.eks. torsk. De observerede arter er alle almindelige for Vestkysten og Nordsøen.

Kendte gyde og opvækstområder, der forekommer langs Lodbjerg strækningen er gydeområdet for tobis og opvækstområde for sild, brisling, rødspætte og tunge.

I og omkring ansøgningsområdet foregår fiskeri med både bundsløbende og ikke bundsløbende fiskeriredskaber.

Det foregår fritidsfiskeri i området, dog er der kun data fra en nøglefisker. I området blev, der registreret i alt 11 forskellige fiskearter med garn i perioden 2017-2019, hvor der primært blev registreret fladfisk.

9.3.3 Miljøpåvirkninger

Indvindingen vurderes potentielt at kunne påvirke fisk og erhvervsfiskeri i undersøgelsesområdet i relation til følgende aktiviteter:

- Arealinddragelse/habitattab (direkte påvirkning af fisk og reduktion af fiskeri i området)
- Ændring af havbunden/habitattab (ændring af dybde og substratforhold)
- Sedimentspredning

Arealinddragelse

Indvindingen vil medføre en arealinddragelse, som kan forstyrre fisk og erhvervsfiskeriet ved at bortskræmme bundfisk, indskrænke mulige fiskepladser, samt føre til reduktion af habitat- og fødegrundlag. Desuden kan indvindingen potentielt påvirke gyde- og opvækstområder for visse fiskearter, hvis de forekommer i området.

Det samlede ansøgningsområde omfatter et areal på i alt 18,5 km², hvor kun en begrænset del af området vil blive påvirket ifølge med indvindingen. Som vist i Tabel 6-4 udgør arealpåvirkningen for den samlede indvinding på 6,0 mio. m³ over den 10-årige periode, ca. 83 % af ansøgningsområdet og mellem 7-28% påvirkes pr år (gennemsnits- og maksimumfodring). Den direkte fysiske påvirkning af bunden under slæbesugning vil virke forstyrrende på bundfisk lige omkring skibet, som forventeligt vil blive skræmt ud i de tilstødende områder. Den resulterende påvirkning vil være begrænset både areal- og tidsmæssigt og vil foregå i en periode på mellem ca. 4-88 dage/år ved en maksimumfodring og 6-97 dage/år ved gennemsnitsfodring afhængigt af, hvilket antal skibe og lastkapacitet, der anvendes ved råstofindvindingen.

Intensiv indvinding kan ligeledes medføre, at mængden af byttedyr for fisk reduceres i det påvirkede område. Dog medfører indvindingen også kortvarigt blotlægning af bunddyr, hvilket kan føre til kortvarigt øgede fødemuligheder.

Havbunden i ansøgningsområdet består primært af sand (98%). Fiskeføde på bunden i form af fauna som f.eks. børsteorme og forskellige muslinger er generelt sparsomt (se Tabel 8-2). Da området i Nordsøen er naturligt dynamisk, vil infaunaen i området helt naturligt være domineret af hurtigt koloniserende arter, hvilke kan genetablere sig indenfor ca. 2-5 år (se Afsnit 9.3.3).

Fiskearter som forventes at kunne have gyde- og opvækstområder på samme substrattype og i samme dybdeintervaller, som der findes i ansøgningsområdet, er fortrinsvis: tobis, sild, brisling, rødspætte og tunge. Indvindingen i ansøgningsområdet vil således påvirke en

begrænset del af de potentielle gydeområder for tobis, og udgøre en meget lille del af de potentielle opvækstområder for sild, brisling, rødspætte og tunge langs den jyske Vestkyst.

Der blev generelt observeret få fisk på bunden indenfor ansøgningsområdet, og disse vil kunne flytte sig til andre tilsvarende områder indenfor ansøgningsområdet, påvirkningszonen eller det omkringliggende havområde, mens indvindingen pågår. Herudover er det en mindre del af ansøgningsområdet, der påvirkes af indvindingen pr år (7-28%).

Det vurderes samlet set, at ansøgningsområdet kun udgør en mindre del af det samlede fourageringsområde, samt gyde- og opvækstområde for fisk langs den Jyske Vestkyst. Substrattyper og dybder er desuden meget almindelige langs Vestkysten. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at indvindingens direkte påvirkning på fiskebestande, gyde- og opvækstområder langs Vestkysten er lokal, midlertidig, af lille forstyrrelsesgrad, reversibel og samlet set *mindre* negativ i ansøgningsområdet. Fiskebestande, gyde- og opvækstområder udenfor ansøgningsområdet vurderes ikke at blive påvirket af indvindingen.

Fritids- og erhvervsfiskeri i ansøgningsområdet kan erfaringsmæssigt pågå parallelt med indvindingen, idet småbåde med faste redskaber, trawlere, sandsugere og fiskere kommunikerer via radio om, hvor der er garn, og hvor der pågår indvinding. Det vurderes derfor samlet set, at indvindingen i området vil have en lille forstyrrelsesgrad på fiskeriet, hvormed arealinddragelsen vil medføre en *mindre* negativ påvirkning på fiskeri i ansøgningsområdet og påvirkningszonen.

Ændring af havbunden

Indvindingen kan potentielt medføre et tab af habitat for fisk i ansøgningsområdet, hvis der forekommer væsentligt ændrede substrat- eller dybdeforhold.

Det er vurderet under afsnit 9.1.3 – Havbund, dybde og dynamik, at der ikke sker en ændring af substrattypen i ansøgningsområdet, som følge af indvindingen. Sandressourcen, der fjernes, består af mellemkornet sand med en middeldkornstørrelse på 0,3 og 0,4 mm. Den underliggende sandenhed består af finere, let siltet sand, som kan blotlægges lokalt ved indvindingen. Begge sandenheder er mindre egnede som gydeområder for tobisen, og en lokal ændring mod en lidt finere sandkornstørrelse lokalt i ansøgningsområdet vil ikke ændre områdets egnethed for tobisen. Herudover indvindes der kun i en mindre del af ansøgningsområdet pr år (7-28%). Denne substratændring er ikke stor nok til at gøre området uegnet for de eksisterende fiskearter i området, og vurderes som en *mindre* påvirkning for fiskearterne og gydemulighederne i ansøgningsområdet og ingen påvirkning forventes i påvirkningszonen.

En gennemsnitlig dybdeændring på ca. 1 m og lokalt op til 1,5 m forventes ikke at have en betydning for forekomsten af de observerede fødearter eller fiskearter i ansøgningsområdet. Ændringerne i havbunden er reversible og vurderes ikke at påvirke fiskearterne i ansøgningsområdet. Dybdeændringer som følge af indvindingen vurderes derfor at have *ubetydelig* negativ påvirkning på fisk og fiskeri i området.

Ansøgningsområdet forventes således stadigt domineret af sandbund efter endt indvinding og der vurderes derfor ikke at være negative påvirkninger i forhold til områdets egnethed,

som gydeområde for f.eks. tobis. Råstofindvinding i ansøgningsområdet vurderes derfor ikke at have betydning for gydesuccesen og opvækst for fiskearterne langs den Jyske Vestkyst og påvirkningen vurderes til *ubetydelig* negativ i ansøgningsområdet og ingen i påvirkningszonen og området udenfor.

Sedimentspredning

Indvinding medfører et sedimentspild, som kan påvirke fisk i varierende grad afhængig af deres tilknytning til vandsøjlen.

Pelagiske fisk som sild hører til de mest følsomme arter, og det antages, at der udvises undvigeadfærd ved koncentrationer højere end 10 mg/l (Appelberg et al., 2005). Dynamikken langs vestkysten medfører, at der naturligt forekommer sedimentkoncentrationer i vandet, der ligger over 10 mg/l fx i forbindelse med kraftig vind og storm i området. Fiskene i området er således tilpassede periodisk forhøjede sedimentkoncentrationer over havbunden og i vandsøjlen. Sedimentkoncentrationer over 10 mg/l kan potentielt forekomme indenfor få hundrede meter af indvindingsfartøjet (se afsnit 6.3.3 "Sedimentspredning"). Sild og andre pelagiske fisks vandring forventes dog ikke at blive påvirket af sedimentspildet, men der kan helt lokalt og kortvarigt være fiskearter, der midlertidigt undgår området grundet de forhøjede koncentrationer af suspenderet sediment. Det drejer sig især om fisk, der benytter synet såsom sild, rødspætter og ising. Sedimentspredningen vil dog være lokal i udbredelse, kortvarig (4-88 dage/år dage eller 6-97 dage/år) samt reversibel, og påvirkningen på fisk i ansøgningsområdet og påvirkningszonen vurderes derfor *ubetydelig* negativ. Der vil ikke være en påvirkning i Nordsøen udenom påvirkningszonen.

Forhøjede sedimentkoncentrationer i vandsøjlen kan yderligere påvirke fisks gyde- og opvækstområder. Torsk og fladfisk er kommercielt vigtige arter og har pelagiske æg og larver. Forhøjet koncentration af suspenderet stof øger synkehastigheden af pelagiske æg og kan medføre, at æggene sedimenterer og går til grunde. Påvirkningen vil dog være kortvarig og kun et yderst begrænset område indenfor få hundrede meters afstand af indvindingsfartøjet vil være påvirket. Herudover er området naturligt dynamisk med høj resuspension i forbindelse med stormevents med periodisk naturlige høje sedimentkoncentrationer i vandsøjlen. Det vurderes derfor, at påvirkningen af sedimentspild på fiskeæg og larver er *ubetydelig* negativ i ansøgningsområdet og påvirkningszonen og ingen i havområdet udenfor.

Genindvandringen til forstyrrede områder synes at foregå hurtigt, og et studie af effekterne fra revlefodring på rødspætter og isinger viste således ingen forskel mellem fangsterne fra det revlefodrede område og fra to referencestationer ca. én måned efter revlefodring (Støttrup et al., 2006). Desuden har det tidligere vist sig, at fiskerne ikke har kunnet konstatere entydige forskelle i fangster af konsumfisk og bifangster af krabber, søstjerner, konker m.m. ved genoptagelse af fiskeri allerede dagen efter råstofindvindingen er indstillet (DHI, 2000a).

Ansøgningsområdet er et dynamisk område med hensyn til strøm- og bølgeforhold. Finkornet sediment som ler, silt og fint sand aflejres derfor ikke, men transporteres ud af området for at aflejres på store vanddybder i f.eks. Skagerrak. Desuden viser modellering i flere VVM-undersøgelser, at sedimentspildet fra råstofindvindingen fortrinsvis vil medføre forhøjede sedimentkoncentrationer indenfor en begrænset del af indvindingsområdet lige omkring indvindingsfartøjet og i mindre grad i påvirkningszonen. Fisk i området vil derfor kunne flytte

sig til andre mindre påvirkede områder i indvindingsområdet og i nærområdet, mens indvindingen pågår. Sedimentspredning i ansøgningsområdet vil kun forekomme i begrænsede perioder, og både fisk og fiskeriet vil derfor forventeligt kun blive påvirket kortvarigt. Samlet vurderes påvirkningen fra sedimentspredning at være *ubetydelig* negativ.

9.3.4 Sammenfattende vurdering

Indvindingens betydning for fisk og fiskeri i ansøgningsområdet er angivet i Tabel 9-6. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.

Tabel 9-6. Potentielle påvirkninger af fisk og fiskeri ved indvinding af råstoffer fra ansøgningsområdet.

Tema: Fisk og fiskeri				
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)				
Påvirkning	Omfang	Grad	Varighed (reversibilitet)	Overordnet betydning
Arealinddragelse	Lokal	Lille	Midlertidig	Mindre
Ændring af havbunden (substrat- og dybdeændring)	Lokal	Meget lille	Midlertidig	Ubetydelig
Sedimentspredning	Lokal	Lille	Kort	Ubetydelig

9.4 Fugle

De følgende afsnit beskriver de eksisterende forhold i og omkring ansøgningsområdet og påvirkningszonen. Desuden vurderes de potentielle miljøpåvirkninger på områdets fugle som følge af den ansøgte indvinding. Der er derfor indsamlet oplysninger om, hvilke fugle, der forventes at anvende området og foretaget en vurdering af, i hvilket omfang indvindingen vurderes at ville påvirke disse.

Ansøgningsområdet ligger langt til havs, ca. 15 km fra kysten ved Lodbjerg, og eventuelle påvirkninger af fuglelivet vil derfor hovedsageligt være relevante for havfugle samt rastende hav- og kystfugle på vandet i eller nærområdet, hvor indvindingen i givet fald kommer til at foregå. Fokus for vurderingen vil være på havfugle, der tilbringer størstedelen af året på åbent hav. Områdets potentielle egnethed for rastende vandfugle vurderes ligeledes.

9.4.1 Metode

Ansøgningsområdet er dækket af den seneste totale optælling af vandfugle i hele den danske del af Nordsøen og Skagerrak fra april og maj 2019, der viser fordelingen af havfugle optalt fra fly (Petersen, Sterup, & Nielsen, 2019). Ansøgningsområdet dækkes ikke af DCE's regelmæssige midvintertællinger. Modellerede tætheder fra optællinger fra bl.a. 2006-2007 og 2011-2013 vil ligeledes blive brugt hvor relevant (Petersen l. , 2008; Petersen, Nielsen, & Clausen, 2016). Desuden vil data for arternes udbredelse i området fra undersøgelser for nærliggende vindmølleparker blive inddraget (Energinet.dk, 2015; Petersen & Sterup, 2019a). Den relative fordeling af havfuglearter tæt ved ansøgningsområdet fra de nævnte rapporter vil således indgå i vurderingen. Fokus vil være på arter, der optræder i antal af international betydning i området.

Ansøgningsområdets egnethed og dermed dets betydning for rastende vandfugle som havdykænder vil i høj grad afhænge af dybdeforholdene samt af, hvorvidt det rummer egnede fødeemner for de enkelte arter. Derfor er i vurderingen også inddraget en generel viden om, hvordan rastende vandfugle vides at fordele sig i de i danske farvande i forhold til vanddybden (Petersen et al., 2010) samt den viden om ansøgningsområdets flora, fauna, bundforhold m.m., der er indsamlet i forbindelse med nærværende miljøundersøgelse.

9.4.2 Eksisterende forhold

9.4.2.1 IBA nr. 121

Ansøgningsområdet er beliggende 8 km fra et større havområde af international betydning for hav- og kystfugle, IBA nr. 121 Skagerrak syd for Norske Rende (Figur 9-18). International betydning betyder i denne sammenhæng, at det observerede antal fugle overstiger det gældende 1 %-kriterium fra Ramsarkonventionen. Dette kriterium er også implementeret i Fuglebeskyttelsesdirektivet (se kapitel 10 - Natura 2000).

Området, der omfatter et areal på i alt 12.593 km², er udpeget pga. den høje forekomst af storkjove (12 % af den biogeografiske population), søkonge (25 % af den biogeografiske population) samt store forekomster af mallemuk, sule, sølvmåge lomvie og alk (BirdLife International, 2021), (Vikstrøm, Nyegaard, Fenger, Brandtberg, & Thomsen, 2015).

Nøgletal for bestandene af rastende fokusarter i IBA nr. 121 fremgår af Tabel 9-7. IBA 121 er identificeret som et af de områder, der i 2021 forventes udpeget som nyt fuglebeskyttelsesområde (F126 Skagerrak), med mallemuk og storkjove på udpegningsgrundlaget (<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64971>).

Tabel 9-7 Nøgletal (antal individer) for rastende fokusarter i IBA (Important Bird Area) nr. 121 siden 1992. Manglende markering af artsnavnet indikerer at udviklingen ikke kan bedømmes. Bindestreg (–) betyder manglende oplysninger. Kilde: (Vikstrøm, Nyegaard, Fenger, Brandtberg, & Thomsen, 2015).

Art	Maks. 1992-96	Median af maks. rastetal 2003-2008 (interval)
Mallemuk	701.000 ¹	77.411 (68.715-86.107) ²
Sule	14.000	205 (205-205) ²
Storkjove	3.300	-
Sølvmåge	32.000	-
Lomvie	46.300	24.451 (20.993-27.909) ³
Alk	45.000	24.451 (20.993-27.909) ³
Søkonge	705.000	-

1: Gennemsnit 1980-1994 inkl. De ikke danske dele af IBA' en. 2: Kun data for 2 år. 4: Tallene gælder alk/lomvie.

9.4.2.2 Hav- og kystfugle


Ansøgningsområdet vil, på grund af afstanden til kysten, først og fremmest kunne rumme fuglearter, der lever det meste af deres liv på havet og primært opsøger landjorden i forbindelse med yngletiden, der for de fleste havfugle ligger mellem april og juli. De største koncentrationer af fugle vil hovedsageligt forekomme i forbindelse med trækbevægelser forår og efterår, hvor fuglene enten trækker igennem området eller gør ophold i en kortere eller

længere periode for at søge føde. Andre arter vil i højere grad optræde i området i vinterhalvåret. Havfugle, som forventes at kunne forekomme i ansøgningsområdet, er beskrevet i det følgende.

Lommer (rødstrubet- og sortstrubet lom)

Den nyeste vandfugletælling, der dækkede ansøgningsområdet blev foretaget i april og maj 2019 og viste, at der kun forekommer et mindre antal lommer i området, som primært blev registreret kystnært og øst for ansøgningsområdet (Figur 9-17) (Petersen, Sterup, & Nielsen, 2019).

Baggrundsundersøgelserne for Vesterhav Nord vindmøllepark viste, at antallet af lommer i området var højest fra midten af marts måned og faldt igen hen mod starten af april. Derfor kan antallet af lommer i området potentielt være højere tidligere på året under forårstrækket. Samme undersøgelse fandt at lommerne typisk opholdt sig i området med vanddybder på 8-31 m, med den højeste koncentration i områder med vanddybder på 14-23 m (Energinet.dk, 2015). Optællinger fra undersøgelsesområdet for Ringkøbing syd (Thor Havvindmøllepark, beliggende 54 km syd for ansøgningsområdet) viste, at rød- og sortstrubet lom var talrig i de kystnære områder og med de højeste forekomster i april (Petersen & Sterup, 2019a).




Figur 9-17 Fordelingen af de i alt 517 observerede lommer i den danske del af Nordsøen ved en vandfugletælling fra fly i april og maj 2019. Af de observerede fugle blev 407 individer ikke bestemt til art, mens 110 fugle blev identificeret til rødstrubet lom. De optalte transektlinjer og områdets bathymetri (dybdeforhold) er angivet, og ansøgningsområdets placering er markeret med grøn firkant. Kilde: Figur fra (Petersen, Sterup, & Nielsen, 2019).

Lommerne lever primært af fisk som fanges ved dykning, men kan også spise bl.a. krebsdyr og bløddyr.

Grundet de angivne dybdeforhold for ansøgningsområdet, den beskrevne viden om lommers udbredelse i vandsøjlen og arternes fødevalg, forventes det, at et mindre antal rastende lommer potentielt kan anvende ansøgningsområdet i vinter og forårsmånederne.

Mallemuk

Mallemukken er en mobil art, der opholder sig størstedelen af tiden på åbent hav, hvor den lever af krebsdyr, fisk og fiskeaffald, som tages svømmende fra havoverfladen. Data fra både en forårstælling (Petersen, Sterup, & Nielsen, 2019) og modellerede bestandstætheder fra data indsamlet i sensommeren og efteråret 2006-2007 samt sensommeren 2011-13 og 2015 (Petersen, Nielsen, & Clausen, 2016) viste, at mallemuk forekom i store antal i sensommeren, og at størstedelen af mallemukkerne fouragerede i de dybere dele af Nordsøen. Arten forventes derfor kun at forekomme i mindre grad i og nær ansøgningsområdet og kun i træktiden (Figur 9-18).




Figur 9-18 Modelleret antal og fordeling af mallemuk ved en optælling d. 26. september 2007. Det samlede estimat er på 86.107 fugle, modelleringen er foretaget på baggrund af 2.520 observerede fugle. Ansøgningsområdets beliggenhed er markeret med grøn firkant. Kilde: Modificeret figur fra (Petersen, Nielsen, & Clausen, 2016).

Sule

Under DCE's vandfugletælling i 2019 i den danske del af Nordsøen og Skagerrak blev der optalt 2.448 suler i hele undersøgelsesområdet. De største antal blev registreret i Skagerrak ved Skagen og i områder i en afstand af 100 km fra Vestkysten, se Figur 9-19 (Petersen, Sterup, & Nielsen, 2019). Af figuren fremgår det, at suler også er blevet registreret i og nær ansøgningsområdet.

Ved undersøgelserne ved Vesterhav Nord blev sulerne primært registreret mindre end 6 km fra kysten (dog med sæsonvariationer), mens de ved undersøgelserne for Thor Havvindmøllepark blev registreret spredt i hele undersøgelsesområdet og både tæt og langt fra kysten, og flest fugle i april måned (894 fugle optalt på én dag) (Petersen & Sterup, 2019a; Energinet.dk, 2015; Petersen & Sterup, 2019b). Undersøgelserne for Vesterhav Nord viste en selektion for dybder på 16-17 m og 26-27 m.



Figur 9-19 Fordelingen af de i alt 2.448 observerede suler i den danske del af Nordsøen ved en optælling af fugle fra fly i april og maj 2019. På figuren fremgår de optalte transektlinjer samt dybdeforhold (bathymetri). Ansøgningsområdets placering er markeret med grøn firkant. Kilde: Figur fra (Petersen, Sterup, & Nielsen, 2019).


Suler fanger fisk ved styrtdykning, og gennemsnitsdybden for fouragerende suler er blevet estimeret til 19,7 m og endda dybere end 25 meter, hvilket er inden for de angivne dybder i ansøgningsområdet (Brierley & Fernandes, 2001). Der blev under miljøundersøgelserne ved Lodbjerg B registreret lave dækningsgrader af fisk, men mange forskellige arter såsom 3 arter af fladfisk, kutling, torsk m.fl. (se Tabel 8-2).

Det er derfor sandsynligt, at suler regelmæssigt passerer igennem eller fouragerer i ansøgningsområdet.

Alkefugle

Alkefugle (lomvie og alk) er talrigest i de danske farvande fra november til februar (Skov et al., 1995), men ifølge baggrundsundersøgelserne fra Vesterhav Nord vindmøllepark blev der registreret flest alkefugle i undersøgelsesområdet i marts og april (Energinet.dk, 2015). I samme undersøgelse blev der fundet en præference for dybder på mellem 20 og 30 meter.

På Figur 9-20 ses fordelingen af alkefugle i Nordsøen i og nær ansøgningsområdet i april og maj 2019 (Petersen, Sterup, & Nielsen, 2019). Ved undersøgelserne for Thor Havvindmøllepark blev lomvie og alk observeret som nogle af de mest talrige arter i området (967 fugle fordelt på 5 optællingsdage), med flest fugle i marts og april (Petersen & Sterup, 2019a). Under to tællinger i efteråret i samme område var lomvie og alk også de hyppigst observerede arter med flest observationer i slut oktober (392 fugle optalt på to dage) (Petersen & Sterup, 2019b).



Figur 9-20 Fordelingen af i alt 1.311 observerede alkefugle i den danske del af Nordsøen ved en vandfugletælling fra fly i april og maj 2019. Af de observerede fugle blev 1.241 fugle ikke bestemt til art, og 70 fugle blev bestemt til lomvie. De optalte transektlinjer og dybdeforhold (bathymetri) er angivet. Ansøgningsområdets placering er markeret med grøn firkant. Kilde: Figur fra (Petersen, Sterup, & Nielsen, 2019).

Søkonger registreres kun sjældent i forbindelse med flytællinger, og artens nuværende status inden for IBA nr. 121 kendes ikke (Vikstrøm, Nyegaard, Fenger, Brandtberg, & Thomsen, 2015; Petersen, Sterup, & Nielsen, 2019). Data fra skibstællinger fra 1980-1994 har vist, at op til ca. 26 % af den nordøstlige Atlantiske population opholdt sig i IBA. nr. 121 (Skov et al., 1995). Arten lever af små krebsdyr, plankton og småfisk og til dels invertebrater, som fanges ved dykning fra havoverfladen. Den er særligt tilknyttet områder, hvor føden koncentrerer, f.eks. i forbindelse med salinitetsfronter (Follettstad, A., 1990).

På baggrund af ovenstående er det sandsynligt at alle tre arter af alkefugle anvender ansøgningsområdet til fødesøgning uden for yngletiden, dog forventes søkonger at forekomme i væsentlig lavere antal end alk og lomvie.

Måger

Mågearter som stormmåge, sildemåge, svartbag, sølvmåge, dværgmåge og ride forventes at kunne bruge ansøgningsområdet til fouragering. De lever alle af invertebrater, fisk og fiskeaffald, som tages fra havoverfladen. Riden lever desuden af krebsdyr.

Sølvmåge og svartbag var de hyppigst registrerede mågearter på vandfugletællingen i foråret 2019. Langt de fleste (80%) af sølvmågerne blev registreret under 20 km fra kysten, og størstedelen registreredes vest for Vadehavet. Svartbag blev registreret i større afstand og i dybere områder i den danske del af Nordsøen og Skagerrak. Hættemåge, sildemåge og stormmåge blev registreret i langt færre antal (Petersen, Sterup, & Nielsen, 2019).

Ride er udbredt i hele Nordsøen, og yngler i hhv. Hirtshals og Hanstholm havn samt ved Bulbjerg og kan derfor og forekomme i ansøgningsområdet året rundt. Rider blev primært registreret langt ude i det vestligste område af den danske del af Nordsøen, og kun meget få blev registreret nær ansøgningsområdet (Petersen, Sterup, & Nielsen, 2019). Resultaterne fra baggrundsundersøgelserne for Vesterhav Nord vindmøllepark, der blev foretaget i artens vinterperiode november til april, viste at riderne opholdt sig på dybder på 18 meter og dybere, og undgik områder lavere end 14 meter (Energinet.dk, 2015). Undersøgelserne for Thor Havvindmøllepark viste, at ride var talrigest under februar tællingen med 217 individer, og generelt var observationerne spredt over undersøgelsesområdet på de fem tællinger foretaget fra januar-april 2019.

De hyppigst registrerede mågearter fra baggrundsundersøgelserne i 2013-2014 for Vesterhav Nord vindmøllepark var hhv. stormmåge, sølvmåge og ride, mens svartbag, sildemåge, hættemåge og dværgmåge blev registreret i langt lavere antal (Energinet.dk, 2015). Stormmåger foretrak at fouragere på områder med dybder under 22 meter. Sølvmåge og sildemåge udviste ingen præferencer (Energinet.dk, 2015).

Undersøgelserne for Thor Havvindmøllepark i januar-april 2019 viste at de hyppigst registrerede arter fra tællingerne var sølvmåge (830 registrerede individer), ride (614), svartbag (145) og langt færre stormmåger, dværgmåger, hættemåger og sildemåger (Petersen & Sterup, 2019a). Både stormmåge, sølvmåge, svartbag og sildemåge er udbredte ynglefugle i Danmark og forventes at kunne anvende området til fouragering i yngletiden (Vikstrøm & Moshøj, 2020).

Dværgmåge observeres i Nordsøen i trækperioderne både forår og efterår og kan potentielt bruge ansøgningsområdet til fouragering (Petersen, Sterup, & Nielsen, 2019). Som ynglefugl er arten dog næsten forsvundet fra landet (Nielsen, et al., 2019; Vikstrøm & Moshøj, 2020)

Terner

Hav-, fjordterne og splitterne blev under vandfugletællingen i træktiden april og maj registreret i og nær ansøgningsområdet (Petersen, Sterup, & Nielsen, 2019). Ynglende terner og især splitterne kan forekomme i og nær ansøgningsområdet, da arterne er på udpegningsgrundlaget i flere af de nærliggende Fuglebeskyttelsesområder (se afsnit 10.5 – Natura 2000 vedrørende dette).

Splitterner, der overvejende fouragerer på marine fiskearter, især tobis, er den mest "marine" af de danske terner. Arten fouragerer således ofte længere til havs og længere fra ynglekolonierne end de øvrige ternearter (op til 45 km fra kysten (Garthe & Flore, 2007)), men dog i hovedsagen stadig relativt kystnært.

I modsætning til splitterne søger både hav- og fjordterne helt overvejende føde tæt inde under land på relativt lavt vand. Også dværgterne fouragerer overvejende helt kystnært og på lavt vand (Snow & Perrins, 1998; Garthe & Flore, 2007).

På baggrund af ovenstående samt områdets egnethed til fødesøgning forventes især splitterne at kunne anvende området til fødesøgning, både i træktiden og yngletiden, mens de tre andre arter terner (havterne, fjordterne og dværgterne) ikke forventes at anvende ansøgningsområdet til fødesøgning i yngletiden. Alle de nævnte ternearter kan potentielt anvende området til fouragering under trækket.


Havdykænder

Havdykændernes tilstedeværelse i og nær ansøgningsområdet er betinget af fødeudbuddet som muslinger og invertebrater. Som nævnt er havdykænder primært registreret på havdybder under 20 meter.

Under forårstælling af vandfugle i Nordsøen blev der registreret sortænder nær ansøgningsområdet, men kun sjældent mere end 20 km fra kysten (Figur 9-21).

Baggrundsundersøgelserne for Vesterhav Nord vindmøllepark, som blev foretaget fra november 2013- april 2014, viste at sortænderne ikke blev registreret indenfor ansøgningsområdet, men mere kystnært mindre end 6 km fra kysten. Fløjlsænder og ederfugle blev kun sjældent registreret rastende i området (Petersen, Sterup, & Nielsen, 2019; Energinet.dk, 2015). Ligeledes blev der kun optalt få sortænder i undersøgelsesområdet for Thor Havvindmøllepark, de fleste fugle (228 individer) blev observeret i januar måned og primært tæt ved kysten (Petersen & Sterup, 2019a; Petersen & Sterup, 2019b).

På baggrund af de nævnte undersøgelser, dybdeforholdene og det ringe fødeudbud for denne artsgruppe vurderes ansøgningsområdet at være af meget begrænset betydning for havdykænder.



Figur 9-21 Fordelingen af i alt 14.158 observerede sortænder i den danske del af Nordsøen ved en optælling af fugle fra fly i april og maj 2019. På figuren fremgår de optalte transektlinjer samt områdets dybdeforhold (bathymetri). Ansøgningsområdets placering er markeret med grøn firkant. Kilde: Figur fra (Petersen, Sterup, & Nielsen, 2019).

Andre relevante havfugle

På vandfugletællingen i Nordsøen i 2019 blev dog kun observeret få storkjover (4 i alt), og de blev registreret minimum 55 km fra kysten (Petersen, Sterup, & Nielsen, 2019). Ved baggrundsundersøgelserne for Vesterhav Nord og Thor havvindmøllepark blev der kun registreret ganske få forekomster af kjover (herunder storkjove og almindelig kjove) ved undersøgelser foretaget fra november-april måned (Energinet.dk, 2015; Petersen & Sterup, 2019a; Petersen & Sterup, 2019b).

Resultater fra tre tællinger fra 2011-2013 fra IBA nr. 121 viste, at storkjoverne var talrigest nordvest for Skagen med op til 1.241 fugle, hvilket er over 1 % kriteriet for en internationalt betydende forekomst (Petersen, Nielsen, & Clausen, 2016).

Der blev under miljøundersøgelserne ved Lodbjerg B generelt registreret lave dækningsgrader af fisk (0-1%), med undtagelse af 3 stationer hvor mindre tobis-stimer blev observeret (2-5%), men mange forskellige arter såsom 3 arter af fladfisk, kutling, torsk m.fl. (se Tabel 8-2). På baggrund af foreliggende data og artens fødevalg, der på havet bl.a. omfatter fisk, der stjæles fra måger eller suler, er det sandsynligt, at storkjoven kan forekomme i og nær ansøgningsområdet.

9.4.2.3 Områdets egnethed for rastende fugle

Ansøgningsområdet og påvirkningszonen består af sandbund (98 % af ansøgningsområder). Dækningsgraden af fauna var lav (<1%), men forskellige arter af fødeemner (krabber, søstjerner og fisk) forekom i området. Størstedelen (98 %) af ansøgningsområdet udgøres af fin-grov sandbund med dominans af infauna, som er af lavere fødeværdi for fouragerende fugle i området. Pelagiske fisk som torsk og tobis forekommer dog i området (se afsnit 9.3.2).

DCE/Aarhus Universitets undersøgelser har vist, at udbredelsen af en række fuglearter, foruden tilstedeværelsen af egnede fødeemner, er stærkt afhængig af vanddybden (Petersen et al., 2010). Det drejer sig typisk om arter, der søger føde på havbunden eller lever af vegetation, som fuglene skal dykke efter.

De fleste arter, der lever af bunddyr, foretrækker normalt vanddybder på under 20 m, mens fugle, der lever af bundfæstet vegetation sjældent forekommer på vanddybder over blot et par meter. Havdykænder som sortand, fløjlsland og ederfugl, som primært æder muslinger, kan derfor potentielt forekomme i området. På baggrund af den lave faunadækning og få muslinger (se afsnit 8.2), samt dybdeforholdene i ansøgningsområdet er det dog usandsynligt, at det er et vigtigt fourageringsområde for rastende havdykænder.

Rød- og sortstrubet lom registreres hyppigst på dybder mellem 10 og 22 meter, men kan også forekomme på større dybder. Rastende alkefugle (alk og lomvie) registreres hyppigst på dybder mellem 18-36 meter og forventes derfor også at kunne forekomme inden for ansøgningsområdet (Petersen et al., 2010). Ligeledes kan arter som mallemuk, sule, stormmåge, hættemåge, sildemåge, sølvmåge, svartbag og ride bruge området til fouragering.

Dybden i ansøgningsområdet varierer mellem 22 og 37 m, og dele af området vil derfor, alene vurderet ud fra dybdeforholdene, kunne være potentielt egnet for især alkefugle.

9.4.3 Miljøpåvirkninger

De enkelte fuglearters følsomhed over for råstofindvinding varierer, som beskrevet i (Cook & Burton, 2010) og vil i alle tilfælde afhænge af, om der er alternative raste- eller fourageringsområder til stede i nærområdet.

For de mobile fiskespisende arter (alle nævnte arter af måger, sule, storkjove, mallemuk samt trækkende tern), der dagligt fouragerer over store afstande, er der rig mulighed for at søge føde andre steder i Nordsøen og Skagerrak. For disse arter vil den direkte påvirkning fra forstyrrelse og den indirekte påvirkning af fødegrundlaget generelt være lav.

Rød- og sortstrubet lom samt alk og lomvie er mere følsomme over for såvel direkte påvirkninger som forstyrrelse i forbindelse med indvindingsaktiviteterne samt de indirekte påvirkninger fra påvirkning af fødegrundlaget (Cook & Burton, 2010). Især rødstrubet lom er følsom over for de direkte påvirkninger fra indvindingsaktiviteter og vil kunne fortrænges fra området, mens indvindingen foregår. Alk og lomvie betegnes som værende moderat sensitive over for både den direkte påvirkning fra indvindingsaktiviteter samt de indirekte påvirkninger af fødegrundlaget (Cook & Burton, 2010).

I den følgende gennemgang fokuseres på fire typer af påvirkninger af områdets fugleliv som følge af den ansøgte indvinding:

- Arealinddragelse
- Ændring af havbunden (ændring af substrattype og dybde)
- Sedimentspredning
- Støj og øvrige forstyrrelser, herunder visuelle påvirkninger fra indvindingsfartøjer og indvindingsaktiviteter.

Arealinddragelse

Arealinddragelse betyder, at overfladelaget på havbunden og dermed potentielle fødemener for fuglene fjernes i det område, hvor indvindingen finder sted. Arealinddragelsen kan desuden potentielt påvirke fisk ved at bortskræmme bundfisk, reducere habitat- og fødegrundlaget for fisk samt påvirke gyde- og opvækstområder for visse fiskearter.

Dermed kan arealbeslaglæggelse potentielt påvirke såvel havdykænder som sortand, ederfugl og fløjlsand, der især lever af muslinger, der hentes op fra havbunden samt fiskespisende fuglearter som lommer, alkefugle, suler, kjover, terner og måger.

Indvindingen medfører dog også en blotlægning af bunddyr, hvilket kortvarigt kan medføre øgede fødemuligheder for fugle, der henter deres føde på havbunden.

Som vist i Tabel 6-4 er det påvirkede havbundsareal begrænset. Samlet set påvirkes et havbundsområde på ca. 1,28 km² pr år for en gennemsnitsindvinding, 5,13 km² pr år for en maksimalindvinding og 15,38 km² over den 10-årige indvindingsperiode.

Påvirkningen som følge af arealinddragelsen og dermed fjernelse af bundfauna- og flora vil være størst for de fuglearter, der henter deres føde på havbunden i indvindingsområdet, hvilket først og fremmest vil være havdykænder såsom sortand, ederfugl og fløjlsand.

På baggrund af den eksisterende viden om havdykændernes udbredelse i Nordsøen, områdets lave faunadækning, herunder de få muslinger (se afsnit 8.2), samt dybdeforholdene er det dog usandsynligt, at ansøgningsområdet er et vigtigt fourageringsområde for rastende havdykænder

Arealbeslaglæggelsens påvirkning af levesteder for fisk og dermed fiskespisende fugle vil ligeledes være yderst begrænset. Området rummer, som tidligere beskrevet generelt kun få fisk, det gælder såvel sandbunden som de mindre områder med grusbund og store sten, hvor der generelt er registreret få fisk (0-1% dækningsgrad). På tre stationer ses dog små tobisstimer over havbunden (2-5% dækningsgrad).

Der findes desuden udstrakte alternative fourageringsområder for såvel havdykænder som fiskespisende fugle i havområderne omkring ansøgningsområdet.

På den baggrund vurderes påvirkningen som følge af arealinddragelse og deraf følgende fjernelse af mulige fødeemner for alle arter at være en *ubetydelig* negativ påvirkning i ansøgningsområdet, ingen i påvirkningszonen og i Nordsøen udenfor.

Ændring af havbunden

Fjernelsen af ressourcen i ansøgningsområdet medfører ikke en ændring af havbunden, idet denne stadig vil bestå af sandbund lokalt med lidt finere sand (se afsnit 9.1.3). Der vil således heller ikke ske påvirkninger af fuglene i området som følge af substratændringer.

Fuglene vurderes desuden at kunne søge føde i områder af mindst tilsvarende beskaffenhed i umiddelbar nærhed, indtil ny bundfauna har indfundet sig i den påvirkede del af ansøgningsområdet. Antallet af havdykænder vurderes desuden, som tidligere beskrevet, at være begrænset i området, sandsynligvis pga. dybdeforholdene og et ringe fødeudbud.

En øget dybde kan gøre det vanskeligere for fuglene at dykke ned til deres føde, men en gennemsnitlig dybdeforøgelse på 32 cm over 10, vil være uden betydning for fuglene.

Lokalt kan dybden potentielt øges med op til ca. 1,5 m (se afsnit 9.1.3), hvilket også kan ske som følge af naturlig dynamik i området. Denne dybdeændring vurderes ligeledes ikke kritisk for fuglene i området og vil påvirke et meget lille areal indenfor ansøgningsområdet. Antallet af havdykænder vurderes desuden, som tidligere beskrevet, at være begrænset i området, sandsynligvis pga. et ringe fødeudbud.

Da store dele af området allerede er for dybe til at være attraktive for rastende vandfugle, og da de berørte områder ikke rummer væsentlige forekomster af egnede fødeemner for disse, og da dybdeændringen er lav, vurderes dybdeændringen som følge af indvindingen at være *ubetydelig* negativ for fuglene i ansøgningsområdet, samt ingen i påvirkningszonen og i Nordsøen udenom.

Sedimentspredning

Påvirkningen indebærer, at opslæmmet sediment omkring indvindingsfartøjet i en periode nedsætter vandets sigtbarhed og dermed påvirker fourageringsmuligheder for de fuglearter, der er afhængige af en vis klarhed i vandet.

Modelsimuleringer viser imidlertid, at sedimentspredningen er lav, og at øget sediment i vandet som følge af slæbesugningen vil være helt lokal og kortvarig i en afstand på få hundrede meter omkring indvindingsfartøjet.

Eventuelt tilstedeværende terner, måger, suler eller kjoer kan desuden søge føde i de udstrakte tilstødende havområder, mens der foregår indvinding i området. En sådan midlertidig og helt lokal påvirkning af fourageringsbetingelserne vil være uden betydning for bestandene.

Det er usandsynligt, at ynglefugle fra land i større omfang skulle opsøge området for den ansøgte indvinding, da dets begrænsede forekomster af mulige fødeemner næppe gør det specielt attraktivt som fødesøgningsområde. Hvis terner, herunder især splitterne, eller måger, f.eks. ride, fra fjerntliggende ynglelokaliteter alligevel lejlighedsvis fouragerer i eller nær ansøgningsområdet for den foreslåede indvinding, kan disse søge til alternative fødesøgningsområder i nærområdet, mens arbejdet foregår.

Det vurderes, at en sådan kortvarig og helt lokal påvirkning af fourageringsbetingelserne vil være uden betydning for fuglene, og det vurderes derfor, at påvirkningen som følge af sedimentspredning er *ubetydelig* negativ i ansøgningsområdet og påvirkningszonen samt ingen i området udenfor.

Støj og øvrige forstyrrelser

Støj og visuelle påvirkninger fra indvindingsaktiviteter kan medføre et funktionelt tab af levested for rastende vandfugle, idet fuglene må forlade ellers egnede levesteder i den periode, hvor arbejdet foregår.

Det vides at rastende fugle kan respondere på skibstrafik. Følgende middel flugtafstande er fundet i forhold til skibe, der nærmede sig med en hastighed på 9-10 knob: ederfugl ca. 200 m, fløjlsand ca. 400 m og sortand ca. 800 m (Schwemmer et al., 2011). Det skal understreges at et indvindingsskib sejler langsommere – 0,5 til 3 knob under indvindingen og dermed formodentligt forstyrrer mindre.

Som en følge af sæsonvariabilitet i forekomsterne af vandfugle i området, vil den potentielle påvirkning fra indvindingen i området være størst i tidsrummet fra november - april.

Den konkrete påvirkning afhænger desuden af forekomsten af støj- og forstyrrelsesfølsomme arter. I området forekommer der generelt lave antal af de arter, der er sensitive overfor sådanne påvirkninger, herunder rød- og sortstrubet lom samt alk og lomvie.

Indvindingen finder sted i et område, der allerede i dag er præget af forskellige typer forbigående forstyrrelser i form af eksisterende råstofindvinding, sejlads og fiskeri, og områdets fugle må derfor formodes i deres habitatudnyttelse i nogen grad at være tilvænnet sådanne påvirkninger. Nordsøen er således et af verdens mest produktive områder for fisk og giver ophav til et intensivt kommercielt fiskeri. Af det danske fiskeri foregår næsten 75 % i Nordsøen og Skagerrak (Fiskeri i tal, 2020).

Det midlertidige funktionelle tab af levested som følge af forstyrrelser vil berøre så få fugle og være så kortvarigt og lokalt, at forstyrrelsen ikke vurderes at kunne påvirke fuglenes "fitness" eller bidrage til en øget mortalitet hos vandfuglene i området.

Da der er få fugle til stede i området, da ikke hele området påvirkes på en gang, og da området allerede i dag er påvirket af skibssejlads m.m., vurderes det, at påvirkningen af rastende og fouragerende fugle som følge af støj og forstyrrelser i en kortvarig periode pr år (4-88 dage/år for gennemsnitsindvinding og 6-97 dage/år for maksimalfodring dage) ikke vil medføre en væsentlig merbelastning af fugle i området. Antallet af sejlads vil dog stige lokalt i ansøgningsområdet, hvor 1-6 skibe kan indvinde samtidigt og påvirkningsgraden vurderes derfor til middel i ansøgningsområdet. Påvirkningen vurderes på den baggrund til at være en *mindre* negativ i ansøgningsområdet og ubetydelig i påvirkningszonen og i havområdet udenfor.

9.4.4 Sammenfattende vurdering

Indvindingens betydning for fugle i ansøgningsområdet er sammenfattet i Tabel 9-8

Tabel 9-8. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.

Tabel 9-8. Potentielle påvirkninger på fugle i ansøgningsområdet og påvirkningszonen ved indvinding af råstoffer.

Tema: Fugle				
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)				
Påvirkning	Omfang	Grad	Varighed (reversibilitet)	Overordnet betydning
Arealinddragelse	Lokal	Lav	Midlertidig	Ubetydelig
Ændring af havbunden	Lokal	Lav	Midlertidig	Ubetydelig
Sediment- spredning	Lokal	Lille	Kort	Ubetydelig
Støj og øvrige forstyrrelser	Lokal	Middel	Kort	Mindre

9.5 Havpattedyr

I det følgende gennemgås metode, eksisterende forhold og miljøkonsekvensvurdering for havpattedyr – marsvin og sæler i forhold til påvirkning fra den ansøgte råstofindvinding.

9.5.1 Metode

I det følgende beskrives de eksisterende forhold for marsvin, spættet sæl og gråsæl. Desuden vurderes den potentielle miljøpåvirkning, som indvindingen kan have på havpattedyr i Nordsøen omkring ansøgningsområdet.

Områdets forekomst af havpattedyr er kortlagt på baggrund af eksisterende data og videnskabelige undersøgelser. Vurderingerne er foretaget på baggrund af eksisterende viden om dyrenes tålegrænser og adfærd fra videnskabelige studier og andre miljøkonsekvensvurderinger.

9.5.2 Eksisterende forhold

I de indre danske farvande er tre havpattedyr hjemmehørende: Marsvin (*Phocoena phocoena*), gråsæl (*Halichoerus grypus*) og spættet sæl (*Phoca vitulina*). Havpattedyr er generelt beskyttede. Derudover er marsvin særligt beskyttede under Habitatdirektivets bilag IV.

Gråsæl og spættet sæl er ikke Bilag IV-arter, men er beskyttede gennem EU-Habitatdirektiv Bilag II samt Bilag V. Havområderne omkring ansøgningsområdet er ikke vigtigt for nogle af de to sælarter (Hansen & Høgslund, 2019), om end der kan forekomme gennemstrejfende individer. Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø 24 km fra ansøgningsområdet har spættet sæl på udpegningsgrundlaget.

Marsvin (*Phocoena phocoena*)

Marsvin er en Bilag IV-art og er dermed en strengt beskyttet art, der er omfattet af beskyttelse, uagtet om de forekommer i eller uden for et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000-område).

Marsvin er den mest almindelige og den eneste ynglende hval i de danske farvande. Baseret på studier af morfologi, genetik og satellitmærkning opdeles marsvin i de danske farvande i minimum tre populationer: 1) Østersøpopulationen – farvandet omkring Bornholm og østover ind i Østersøen, 2) Bælthavs-populationen – de indre danske farvande (inkl. Bælthavet, Øresund, sydlige Kattegat og vestlige Østersø) og 3) Nordsø-populationen – nordlige Kattegat, Skagerrak og Nordsøen (Hansen & Høgslund, 2021). Marsvin der opholder sig ud for Limfjorden tilhører populationen i Nordsøen og Skagerrak.



Hunnerne er drægtige i 11 måneder og føder i maj-juli. Det må formodes, at marsvin er mere følsomme over for forstyrrelser i denne periode samt i parringssæsonen juli-august (Søgaard & Asferg, 2007). Det vides ikke om marsvinene yngler i de to nærmeste Natura 2000-områder, hvor marsvin er på udpegningsgrundlaget (N219 og N250), men generelt er der observeret flere individer inden for områderne end udenfor (Sveegaard, Nabe-Nielsen, & Teilmann, 2018).

Dyrenes vigtigste opholdssteder varierer over året (se Figur 9-22). Der forekommer højtæthedsområder for marsvin i og omkring Natura 2000-områderne nr. 1 *Skagens Gren og Skagerrak* samt nr. 249 *Store Rev* afhængigt af årstiden (Figur 9-22) mere end 95 km fra ansøgningsområderne. Natura 2000-område nr. 250 *Gule Rev* ca. 21 km fra ansøgningsområdet har desuden marsvin på udpegningsgrundlaget. Vigtigheden af Natura 2000-område nr. 250 *Gule Rev*, hvor marsvin er på udpegningsgrundlaget, er vurderet af DCE til at have middel tæthed både sommer og vinter, men uden væsentlig betydning for marsvinepopulationen (Svegaard et al., 2018).

De seneste optællinger og bestandsestimater i Skagerrak i det nationale overvågningsprogram er fra 2019, hvor der blev gennemført flytællinger som estimerede en bestandsstørrelse for Nordsøpopulationen på 6343 individer med en tæthed på 1,19 individer /km² (Hansen & Høgslund, 2021). Der er dog en vis usikkerhed på bestandsstørrelsen, der har et 95 % konfidensinterval på 4707-8438 individer.

Undersøgelser udført af Danmarks Miljøundersøgelser har vist, at dyrene ofte dykker til bunden, hvor mange fisk holder til. Marsvinene er aktive hele døgnet og dykker næsten lige så ofte om natten som om dagen. I de danske farvande foretrækker marsvinene dyk til mindre end 40 m, men i Skagerrak er der målt dykke-dybder på ned til 200 m (Søgaard & Asferg, 2007). Marsvin kan altså forekomme ud for Lodbjerg hele døgnet og kan potentielt søge føde på dybderne i ansøgningsområdet.

2007 - 2016




Figur 9-22. Udbredelse af satellitmærkede marsvin i Nordsøen og Skagerrak analyseret som Kernel-tætheder (jo mørkere farve, desto højere tæthed i hhv. sommer (øverste figur) og vinter (nederste figur). Rød firkant angiver ansøgningsområdets placering. Kilde: (Sveegaard, Nabe-Nielsen, & Teilmann, 2018).

Sæler

I de danske farvande forekommer og yngler både gråsæl og spættet sæl. Begge arter er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag II. Bevægelsesmønstre og sæsonvariation med hensyn til levested for spættet sæl og gråsæl er ukendt. Begge arter bevæger sig dog over store distancer mellem rasteplasser og fourageringsområder. Karakteristika for henholdsvis spættet sæl og gråsæl er beskrevet i det følgende.

Spættet sæl (Phoca vitulina)

Spættet sæl er den mest almindelige sælart i Danmark og forekommer især i kystnære farvande, hvor der er rigelig føde til stede, og hvor der findes uforstyrrede yngle- og hvilepladser på sandbanker, rev, holme og øer. Den danske bestand af sæler er opdelt i fire forvaltningsområder (Vadehavet, Limfjorden, Kattegat og den vestlige Østersø) (Hansen, J.W. (red.), 2018; Hansen & Høgslund, 2019; Jepsen et al., 2005). Som det fremgår af Figur 9-23 findes de nærmeste sællokaliteter for spættet sæl i Limfjorden mere end 32 km fra ansøgningsområdet og i Vadehavet. Der findes ingen fældnings- eller ynglelokaliteter i umiddelbar nærhed af ansøgningsområdet. Spættet sæl må formodes at kunne forekomme sporadisk i Nordsøen i og omkring ansøgningsområdet.




Figur 9-23. Populationsopdeling for spættet sæl med estimerede udbredelsesområder for populationerne i Vadehavet, Limfjorden, Kattegat og vestlige Østersø markeret med blåtoner. Betydelige hvilepladser er markeret med angivelse af relativ størrelse, baseret på gennemsnitligt antal sæler på hvilepladsen i forbindelse med optællingerne i fældesæsonen i august 2015 og 2016. Kun danske hvilepladser er vist på kortet. Ansøgningsområdet er angivet med rød firkant. Kilde: (Galatius, A., 2017).

Spættet sæl er især følsom overfor forstyrrelser i yngleperioden (juni-juli), samt under den efterfølgende pelsfældning (august-september), som hovedsageligt foregår på land. Ungerne er veludviklede fra fødslen og kan følge hunnsælen i vandet, men efterlades som regel på ynglelokaliteten, mens moderen fouragerer (Miljøministeriet, 2005).

Bevaringsstatus for spættet sæl vurderes som gunstig i begge marine regioner (atlantiske og kontinentale region). Bestandene i Vadehavet og Kattegat er store og langsigtet levedygtige, mens bestandene i Limfjorden og Østersøen er mindre og mere sårbare (Fredshavn et al, 2019).

Gråsæl (*Halichoerus grypus*)

Gråsælen er som spættet sæl knyttet til de kystnære farvande, hvor der er rigeligt føde, og hvor der findes uforstyrrede yngle- og hvilepladser på ubeboede øer, samt sandbanker, rev og skær (Figur 9-24). Gråsælen forekommer regelmæssigt på lokaliteter i Kattegat, Østersøen og Vadehavet (Hansen, J.W. (red.), 2018; Hansen J.W. & Høgslund S. (red.), 2019). Den nærmeste lokalitet, hvor gråsæler raster er i Limfjorden mere end 32 km fra ansøgningsområdet og i Vadehavet. Gråsælen kan forekomme sporadisk i Nordsøen ud for Limfjorden.



Figur 9-24. Populationsopdeling for gråsæl med estimerede udbredelsesområder for populationerne i Nordsøen og Østersøen, samt det overlappende område i Kattegat markeret med blåtoner. Betydelige hvilepladser er markeret med angivelse af relativ størrelse, baseret på det maksimale antal sæler på hvilepladsen i forbindelse med flyoptællingerne i 2015 og 2016. Kun danske hvilepladser er vist på kortet. Kilde: (Galatius, A., 2017).

Gråsælen er afhængig af land i en længere periode efter diegivning, da parring sker på land eller i vandkanten i fældeperioden (maj-juni). Gråsælen er meget følsom over for forstyrrelser, især i yngletiden.

Gråsælens status vurderes som stærkt ugunstig, da forekomst og yngleaktivitet i Danmark vurderes at være meget langt fra tidligere niveauer. Tilstanden er dog i bedring i begge marine regioner (Atlantiske og kontinentale region) (Fredshavn et al, 2019).

9.5.3 Miljøpåvirkninger

Indvindingsaktiviteten i det ansøgte område i Nordsøen kan potentielt medføre forstyrrelse og levestedsforringelse for havpattedyr, som evt. måtte forekomme i området.

I relation til en kommende indvindingsaktivitet vurderes det, at følgende elementer potentielt set vil kunne påvirke evt. forekommende marsvin og sæler negativt:

- Arealinddragelse
- Ændring af havbunden (substrattype og dybde)
- Sedimentspredning
- Støj og øvrige forstyrrelser, herunder støj fra indvindingsfartøjets skrue og pumpeaktivitet

Baseret på afstanden fra ansøgningsområdet til hvile-, pelsfældnings- eller ynglesteder for sæler (>32 km) og marsvin (ingen definerede yngleområder) foretages der ikke en nærmere vurdering af eventuelle påvirkninger af disse lokaliteter.

I det følgende foretages en vurdering af påvirkning på henholdsvis marsvin og sæler, som forventes at kunne passere og muligvis fouragere i ansøgningsområdet.

Arealinddragelse

Indvindingen kan påvirke tilgængeligheden af føde som følge af fjernelse af fødeorganismer på havbunden. Ligesom antallet af fisk kan reduceres lokalt omkring indvindingslokaliteten i perioden, hvor råstofindvindingen finder sted. Det påvirkede område vil dog være meget lille i forhold til udbredelsen af lignende havbund/fødesøgningsområder, som er tilgængeligt for marsvin og sæler i området. Det er vurderet under flora og fauna at bundfaunaen i området vil genetablere sig indenfor en midlertidig periode på ca. 2-5 år. Det vurderes desuden, at potentielt tilstedeværende individer vil kunne søge føde andetsteds i perioden for råstofindvinding. Det vurderes derfor samlet set, at forstyrrelse af havbunden vil påvirke havpattedyr *mindre* negativt i ansøgningsområdet, samt at der ikke vil være en påvirkning i påvirkningszonen og Nordsøen udenfor.

Ændring af havbunden

Substrattypen i ansøgningsområdet ændres ikke væsentligt og vil dermed ikke påvirke havpattedyrene i og omkring ansøgningsområdet.

En gennemsnitlig dybdeændring på ca. 32 cm og op til 1,5 m påvirker ikke fødeudbuddet i ansøgningsområdet væsentligt og ligeledes ikke havpattedyrene (se afsnit 9.2.3 og 9.3.3).

Samlet set vurderes ændring af havbunden som følge af indvindingen at have en *ubetydelig* negativ påvirkning på marsvin og sæler, der fouragerer eller passerer ansøgningsområdet.

Sedimentspredning

Råstofindvindingen vil medføre en forøgelse af suspenderet sediment i vandsøjlen, indenfor ansøgningsområdet og i mindre grad i påvirkningszonen. Mængden af dette afhænger af de lokale strømforhold på det pågældende indvindingsstidspunkt.

Marsvin søger fortrinsvist føde ved brug af ekkolokalisering, og en direkte forstyrrelse af marsvin, som følge af sedimentspild i vandet, er derfor meget begrænset (Teilmann et al., 2004). Suspenderet sediment forventes derfor ikke at medføre en direkte påvirkning af marsvin, men kan indirekte påvirke marsvin ved at reducere tilgængeligheden af føde.

Sedimentspild forventes ikke at påvirke sælernes mulighed for at lokalisere byttedyr, da sæler lokaliserer deres bytte ved hjælp af deres knurhår, og kun i mindre omfang er afhængige af deres syn (Dehnhardt et al., 2001). De områder, der påvirkes af uklart vand som følge af spildt sediment under indvindingsaktiviteten, er af begrænset arealmæssig udstrækning og graden anses for ubetydelig. Sedimentspildet forsvinder hurtigt efter indvindingens ophør og påvirkningen er således kortvarig (se afsnit 6.3.3 Sedimentspredning). Set i forhold til spættet sæl og gråsæls forventeligt ret beskedne forekomst i området omkring det aktuelle ansøgningsområde, samt artens mobilitet og evne til at opsøge gunstige fourageringsområder over store afstande, betragtes effekten af indvindingen som værende uden betydning for spættet sæl og gråsæls fødesøgningssucces.

Det vurderes derfor, at sedimentspredningen fra indvindingen vil medføre en *ubetydelig* negativ påvirkning på marsvin og sæler i ansøgningsområdet og påvirkningszonen.

Støj og øvrig forstyrrelse

Under indvindingen kan fartøjet, alene ved sin tilstedeværelse, virke forstyrrende på havpattedyr. Den primære kilde til undervandsstøj ved råstofindvinding vil være motorstøj fra indvindingsfartøjet, samt støj forårsaget af selve pumpeaktiviteten ved havbunden samt i sugerøret. Påvirkninger af støj fra råstofindvinding afhænger primært af støjemissionen samt afstanden til følsomme områder og habitater.

Det er begrænset hvor mange målinger af undervandsstøj, der er lavet i forbindelse med råstofindvinding. Et notat udarbejdet af DHI (By- og Landsskabsstyrelsen, 2010) samlede tilbage i 2010 den viden, der var om undervandsstøj ved slæbesugning. Her fandt man, at den beregnede kildestyrke for slæbesugere lå mellem 178 og 190 dB re at 1 μ Pa 1m for skibe med en lastevolumen på mellem 2.500 m³ og 35.500 m³, og der var ikke umiddelbart nogen direkte sammenhæng mellem kildestyrken og fartøjets størrelse (By- og Landsskabsstyrelsen, 2010). Det målte lydniveau for indvindingsfartøjer ved råstofindvinding kan sammenlignes med lydniveauet, som forventes fra et fragtskib, som sejler 8-16 knob (Tood et al., 2015).

Indvindingsfartøjer, som anvendes ved råstofindvinding, producerer lavfrekvent støj, hovedsageligt under 1.000 Hz (Robinson et al., 2011). Til sammenligning er marsvins hørbare område 200 Hz-180 kHz og sælers 75Hz-75kHz (i vand) (Tougaard, J., 2014). Marsvin anvender kommunikationslyde af højere frekvens, men kan dog stadig forstyrres af lavfrekvent støj, som maskerer dyrenes kommunikationslyde (DCE, 2011). Sæler har generelt en bedre hørelse end marsvin ved lavere frekvenser. På trods af at sæler kan detektere støjen på længere afstand end marsvin, vil man formentligt, grundet større følsomhed overfor støj hos marsvin, se adfærdssændringer hos marsvin tidligere end hos sæler. Generelt reagerer marsvin afvigende på skibs-støj i en radius af ca. 200-300 m (Teilmann et al., 2004). Det vurderes imidlertid, at marsvin er i stand til at tilvænne sig lyden fra skibstrafik, da forekomsten af arten er stor i områder som Storebælt, hvor skibstrafikken er intensiv.

Med antagelsen af en imaginær støjkilde på 190 dB re 1 μ Pa rms (1/3 oktav-bånd), en sfærisk spredning (uden absorption og refleksion) og en baggrundsstøj på 80 dB re 1 μ Pa rms (1/3 oktav-bånd) er de maksimale afstande, hvor der observeres ændret dykke- og

svømmeadfærd, 11 km for marsvin og 1 km for sæler. Egentlig flugtaadfærd må forventes op til 1 km fra indvindingen for marsvin mens risiko for midlertidigt høretab kun kan forekomme mindre end 1 m fra støjilden for marsvin og op til 100 m fra støjilden for sæler. Råstofindvinding med det ovenfor nævnte støjniveau (178-190 dB re 1 µPa at 1 m) vurderes derfor ikke at medføre risiko for at få permanente høreskader for marsvin eller sæler (By- og Landsskabsstyrelsen, 2010). Antallet af fartøjer (1-6 fartøjer), der potentielt kan forekomme i ansøgningsområdet under indvindingen ændrer ikke denne vurdering, idet skibene af sikkerhedsmæssige hensyn vil holde afstand til hinanden, om end dyrene samlet vil blive fortrængt fra/forstyrret i et større område, hvis der indvindes med flere fartøjer samtidigt. Et nyligt studie gennemført af DCE har netop set på sandsugning i forhold til visuelle observationer og akustisk aktivitet for marsvin (J. Teilmann et al. , 2018). Her fandt man ingen sammenhæng mellem den indvundne sandmængde og antallet af marsvineobservationer i højtæthedsområdet for marsvin omkring Lappegrunden i Øresund eller noget generelt fald i antallet af marsvin i området i forbindelse med sandsugningen på Lappegrund, som befinder sig ca. 3,5 km øst for Natura 2000-område nr. 195 *Gilleleje Flak og Tragten* med marsvin på udpegningsgrundlaget (J. Teilmann et al. , 2018). Indvindingsaktiviteten så således ikke ud til at genere marsvinene i målbar grad. Ved den ansøgte indvinding vil der være ca. 21 og 22 km til de nærmeste Natura 2000-områder med marsvin på udpegningsgrundlaget – henholdsvis N219 *Sandbanker ud for Thyborøn* og N250 *Gule Rev*.

Ansøgningsområdet er beliggende i et område med moderat til høj tæthed af skibstrafik primært domineret af fiskebåde og tankskibe (se afsnit 9.9 – Sejladsforhold). Udbredt ligger trafiktætheden på op til 78 skibe pr. år i området. Havpattedyrene vurderes at være tilpasset til skibstrafik i området, der i forvejen er præget af moderat-høj skibstrafik og at kunne fortrække til andre lignende fødesøgningsområder mens indvindingen pågår i ansøgningsområdet.

Støjpåvirkningsgraden og forstyrrelse fra indvindingsaktiviteten og indvindingsfartøjerne vurderes på baggrund af ovenstående som lav og lokal lige omkring skibet. Påvirkningen vurderes desuden til kortvarig tilknyttet indvindingsaktiviteten som foregår maksimalt 4-97 dage pr/år i ansøgningsområdet. Samlet set vurderes indvindingsstøjens påvirkning på havpattedyrene i ansøgningsområdet og påvirkningszonen som *ubetydelig* negativ.

9.5.4 Sammenfattende vurdering

Indvindingens betydning for havpattedyr i ansøgningsområdet er angivet i Tabel 9-9. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.

Tabel 9-9. Potentielle påvirkninger af marine pattedyr ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.

Tema: Havpattedyr				
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)				
Påvirkning	Omfang	Grad	Varighed (reversibilitet)	Overordnet Betydning i ansøgningsområdet
Arealinddragelse	Lokal	Lav	Midlertidig	Ubetydelig
Ændring af havbunden/habitattab	Lokal	Lav	Midlertidig	Ubetydelig
Sedimentspredning	Lokal	Lav	Kort	Ubetydelig
Støj og øvrig forstyrrelse	Lokal	Lav	Kort	Ubetydelig

9.6 Vandplaner, vandkvalitet og havstrategi

Vandområdeplaner og vandkvalitet

Vandområdeplanerne (2015-2021) er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De danske vandområdeplaner indeholder en beskrivelse af, hvordan Danmark vil nå målsætningen i EU's vandrammedirektiv og skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark. Målet med vandområdeplanerne er, at alle vandløb, søer og kystvande skal opnå god økologisk og kemisk tilstand. Miljømålet for den samlede økologiske tilstand gælder ud til 1-sømilgrænsen og den samlede kemiske tilstand gælder ud til 12-sømilgrænsen. Vandområderne er opdelt i vandløb, søer og kystvande. Den marine del af vandplanerne er omfattet af kystvande, hvor målet med vandplanerne at forbedre tilstanden i fjorde og de kystnære områder ved at reducere udledningen af kvælstof (Naturstyrelsen, 2016). Den samlede økologiske tilstand i kystvandområderne vurderes i vandområdeplanerne på baggrund af kvalitetselementerne ålegræs (dybdegrænsen), klorofyl og bundfauna (Dansk Kvalitetsindeks, DKI), samt miljøfarlige og forurenende stoffer. De enkelte kvalitetselementers tilstand vurderes separat i forhold til de foreliggende overvågningsdata. Den samlede økologiske tilstand for et vandområde svarer til den laveste tilstand blandt kvalitetselementerne for det pågældende vandområde (Naturstyrelsen, 2016). Vandkvaliteten i kystvandene er væsentlig for dyr og planter, som lever i de givne områder.

Havstrategi

EU's havstrategidirektiv er i Danmark implementeret ved Bekendtgørelse af lov om havstrategi (LBK nr. 1161 af 25/11/2019). Danmarks Havstrategi er et led i gennemførelsen af EU's havstrategidirektiv (direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008) (Miljø- og Fødevarerministeriet, 2019). Havstrategiloven omfatter de danske havområder, herunder havbund og undergrund, på søterritoriet og i de eksklusive økonomiske zoner (EEZ).

EU's havstrategidirektiv skal sørge for, at der opnås eller opretholdes god miljøtilstand i havets økosystemer samtidig med, at bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer muliggøres. Dette mål skal opnås ved, at hvert land udarbejder havstrategier bestående af tre dele: en basisanalyse, et overvågningsprogram og et indsatsprogram, der revideres hvert 6. år (Miljøstyrelsen, 2021).

En god miljøtilstand beskrives og vurderes ud fra emner, som definerer en række fokusområder. Disse emner kaldes for deskriptorer. For hvert emne angiver havstrategien en status, som skal være opfyldt for at opnå en god miljøtilstand. De 11 emner i havstrategidirektivet dækker både forhold, der beskriver miljø- og naturtilstanden og påvirkningerne fra menneskelige aktiviteter. Emnerne/deskriptorerne omfatter følgende: (D1) Biodiversitet, (D2) Ikke-hjemmehørende arter, (D3) Erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande, (D4) Havets fødenet, (D5) Eutrofiering, (D6) Havbundens integritet, (D7) Hydrografiske ændringer, (D8) Forurenende stoffer, (D9) Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum, (D10) Marint affald og (D11) Undervandsstøj (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019).

På baggrund af de foretagne vurderinger i Basisanalysen II er, der fastsat nedenstående 68 miljømål, hvoraf 29 er operationelle miljømål og skal således angive konkrete handlinger for enten at understøtte opfyldelsen af de øvrige mål eller for at anvise, hvad der skal arbejdes videre med på sigt (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019c).

Herudover er der udpeget nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen, som er relevante og inkluderede i vurderingen af indvindingens påvirkning i forhold til havstrategi (Figur 9-26).

Områderne er udpeget med fokus på at supplere og skabe synergi med det eksisterende netværk af beskyttede havområder (Natura 2000-områder) i de to farvande (Nordsøen og Skagerrak samt Østersøen omkring Bornholm). Udpegningen har fokus på beskyttelse af en række naturtyper og arter, som enten ikke ligger indenfor eksisterende beskyttede områder, eller ikke er omfattet af beskyttelsestiltag indenfor et eksisterende beskyttet område. Det omfatter fx beskyttelse af dybereliggende naturtyper med sand, grus og mudrede substrater, såvel som vandsøjlen og en række rødlistede arter og truede naturtyper (Miljøministeriet, 2021).

Beskyttelsestiltag i områderne fokuserer på hele økosystemet, men dog med et særligt fokus på havbunden. Inden for områderne vil, der blive forbud mod fiskeri med bundsløbende redskaber (herunder bomtrawl, bundtrawl og snurrevod mv.), havvind og energiøer (herunder konstruktioner, seismiske undersøgelser mv.), olie- og gasaktiviteter (herunder konstruktioner, boringer, seismiske undersøgelser mv.), råstofindvinding (herunder seismiske undersøgelser mv.), klapning, CO₂-lagring (herunder konstruktioner, boringer, seismiske undersøgelser mv.), akvakultur (herunder havbrug (fiskeopdræt), muslingebrug og tangleanlæg mv.), ny transportinfrastruktur (herunder broer og tunneller mv.) samt geologiske / seismiske undersøgelser, der ikke er relateret til naturvidenskabelig forskning, forvaltning af naturbeskyttelse eller anlæg og vedligehold af kabler, rør, ledninger mv. I de dele af områderne, som er strengt beskyttede, vil der desuden blive forbud mod fiskeri med alle redskaber (både erhvervsfiskeri og fritids/rekreativt fiskeri) (Miljøministeriet, 2021).

Begrænsningerne indføres inden for de beskyttede og strengt beskyttede havstrategiområder, og der sættes således ikke begrænsninger ift. aktiviteter, der finder sted uden for områderne, uanset om de kan medføre en påvirkning ind i områderne (Miljøministeriet, 2021).

Tabel 9-10. Deskriptorer i Danmarks Havstrategi II med tilhørende relevante miljømål og indikatorer¹.

Deskriptor	Beskrivelse	Relevante miljømål ¹	Indikator
(D1) Biodiversitet Biodiversiteten opretholdes Tætheden af arter svarer til de fremherskende forhold Habitattypens tilstand er ikke påvirket negativt af menneskeskabte belastninger	God biodiversitet for fire områder: 1. Fugle 2. Pattedyr 3. Fisk, der ikke udnyttes erhvervsmæssigt 4. Pelagiske habitater (åbne vandmasser)	Ad 1. Utilsigtet bifangst af havfugle må ikke være bestandstruende Ad 1. Målsætning for havfugle og levesteder jf. fuglebeskyttelses-direktivet Ad 2. Utilsigtet bifangst af marsvin reduceres mest muligt (min. <1,7 % af den samlede bestands-størrelse) Ad 2. Utilsigtet bifangst af sæler må ikke være bestandstruende Ad 2. Marsvin, spættet sæl og gråsæl opnår gunstig bevaringsstatus i overensstemmelse med habitat-direktivet. Ad 4. Forekomsten af plankton følger langtidsgennemsnittet.	Ad 1. Bifangst af havfugle (antal) Bestandsstørrelse af havfugle (antal) Ad 2. Bifangst af sæler og marsvin (antal) Bestandsstørrelse af sæler og marsvin (antal) Spæklagets tykkelse (mm) Udbredelsesområde (km ²) Ad 3. Bifangst af hajer og rokker (antal) Ad 4. Ændringer i biomassen af plankton
(D2) Ikke-hjemmehørende arter	Ikke-hjemmehørende arter, er arter der via menneskelige aktiviteter indført til områder, hvor de ikke findes naturligt, og hvortil de ikke naturligt kan spredes. Indførslen kan påvirke eksisterende fødenet og økosystemer negativt	Geografiske udbredelse af ikkehjemmehørende arter, særligt invasive arter, introduceret viamenneskelige aktiviteter, skal så vidt muligt ligge på et niveau, der ikke medfører negative effekter på havets arter og naturtyper	Antal nye marine ikke-hjemmehørende arter (6-årig periode) Udbredelse af visse invasive arter overvåget ved brug af eDNA

¹ I basisanalysen til Havstrategi II er der for flere deskriptorer defineret miljømål, der forpligter myndigheder til at definere tærskelværdier og indikatorer eller indhente nye data til udvikling af disse, for eksempel analyser af bifangst og lavfrekvent støj. Disse er ikke medtaget her, da projektet ikke vil påvirke opfyldelsen af sådanne mål. Ligeledes er miljømål uden operationelle indikatorer og tærskelværdier, såsom lavfrekvent støj under D11 ikke medtaget.

Deskriptor	Beskrivelse	Relevante miljømål ¹	Indikator
(D3) Erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande	Fiskeri har betydning for fiskebestandenes størrelse, fiskenes alder og størrelsesfordeling, diversitet og gydebiomassen	Antallet af kommercielt fiskede bestande, der reguleres efter MSY principper (bæredygtig udnyttelse) stiger. Fiskeridødelighed og gydebiomasse skal være på niveauer, der kan sikre maksimalt bæredygtigt udbytte	Andelen af kommercielt fiskede bestande, der reguleres efter MSY principper. Andelen af kommercielt fiskede bestande, hvor fiskeridødeligheden er over maksimalt bæredygtigt udbytte Andelen af kommercielt fiskede bestande, hvor gydebiomassen er under tærsklen for bæredygtig udnyttelse.
(D4) Havets fødenet	Alle kendte elementer i havets fødenet er til stede og forekommer med normal tæthed og diversitet	Ingen relevante miljømål, se fodnote	Der anvendes relevante indikatorer fra D1
(D5) Eutrofiering	Øgede næringsstoffer (kvælstof og fosfor) tilført havmiljøet fra landbaserede kilder og atmosfæren, herunder via skibstrafik kan forårsage øget algevækst. Øget algevækst kan føre til iltvind og dårlige lysforhold i vandet og dermed forringede forhold for bundplanter, fisk og andre dyr.	Dansk andel af tilførsler af kvælstof og fosfor (TN, TP) følger de maksimalt acceptable tilførsler fastsat i HELCOM. Målbeklastninger og indsatsbehov for fjorde og kystvande fastsat i henhold til vandramme-direktivet overholdes. Mål og behov fremgår af de danske vandområdeplaner	Udledningsopgørelser fra HELCOM for TN og TP (ton år ⁻¹) Koncentrationer af næringsstoffer (DIN, DIP, TN, TP) i vandsøjlen (μmol L ⁻¹) Koncentrationer af klorofyl a i vandsøjlen (μg L ⁻¹) Koncentrationer af ilt nederst i vandsøjlen (mg L ⁻¹) Kvalitetsselementer til vurdering af økologisk tilstand i fjorde og kystvande efter vandrammedirektivet (udbredelse af ålegræs, koncentration af fytoplankton, bundfauna abundans og diversitet)
(D6) Havbundens integritet	Havbundens kombinationen af forskellige sedimenttyper, dybdeforhold og andre forhold såsom saltkoncentration og næringsstoffer i vandsøjlen, er grundlag for diverse habitattyper og dermed levesteder. Menneskelige aktiviteter	Habitatdirektivets marine naturtyper opnår gunstig bevaringsstatus jf. habitatdirektivet. Det nordlige Øresund udpeges som beskyttet område under havstrategi-direktivet, og der gennemføres et stop for tilladelser til indvinding af råstoffer.	Udstrækning af negativt påvirket habitat (km ² og andel af habitattypens samlede udstrækning) Artssammensætning og eller biomasse pr habitattype

Deskriptor	Beskrivelse	Relevante miljømål ¹	Indikator
	kan påvirke havbunden, der kan føre til fysisk tab af den naturlige havbund og andre påvirkninger	De væsentligste habitater indeholder de for danske havområder almindeligt forekommende arter og samfund	
(D7) Hydrografiske ændringer	Havets fysiske egenskaber såsom temperatur, saltholdighed, havstrømme og bølgepåvirkning er afgørende for de marine økosystemer. De er i høj grad bestemt af vind, tidevand, lufttryk og ikke mindst klima, men kan også påvirkes af menneskelige aktiviteter	Menneskeskabte aktiviteter, som især er forbundet med fysisk tab af havbunden, og som forårsager permanente, hydrografiske ændringer må kun have lokale virkninger på havbunden og i vandsøjlen og skal udformes under hensyn til miljøet for at forebygge skadelige virkninger på havbunden og i vandsøjlen	Areal af hydrografiske ændringer i vandsøjlen og på havbunden (km ²) Areal pr. habitattype, der er negativt påvirket som følge af hydrografiske ændringer (km ² el. % af samlet areal af habitattypen)
(D8) Forurenende stoffer	Miljøfarlige stoffer er syntetiske og ikke-syntetiske forbindelser, som kan forårsage negative effekter på dyre- og planteliv og forårsage direkte negative biologiske effekter på marine organismer. Stofferne kan akkumuleres i fødekæden og ende med at forårsage en særlig stor risiko øverst i fødekæden	Udledninger af forurenende stoffer i vand, sediment og levende organismer må ikke overskride miljøkvalitetskrav jf. gældende lovgivning Emissioner, udledninger og tab af PBDE og kviksølv standses eller udfases Gradvist fald i niveauer af imposex / intersex hos havsnegle	Koncentration af PFOS i fisk (µg kg ⁻¹ vådvægt) Koncentration af PBDE i fisk (µg kg ⁻¹ vådvægt) Koncentration af benz(a)pyren i muslinger (µg kg ⁻¹ vådvægt) Koncentration af kviksølv i fisk eller muslinger (µg kg ⁻¹ vådvægt) Graden af imposex/intersex hos havsnegle (VDSI eller ISI)
Akutte forureningshændelser (Spild af oliestoffer og kemikalier)	Spild af olie og kemikalier kan udgøre en alvorlig trussel mod havmiljøet og kan have negative virkninger på marine dyr og planter	Forekomst og omfang af akutte spild nedbringes løbende ved forebyggelse, overvågning og dimensionering af beredskab Negative effekter på havpattedyr og -fugle, ved spild forebygges og minimeres i muligt omfang.	<u>Østersøen og Kattegat:</u> Mængde af ulovligt oliespild fra skibe (m ³ /år). Antal døde/aflevede fugle som følge af spild (antal/år). (Foreløbig indikator)

Deskriptor	Beskrivelse	Relevante miljømål ¹	Indikator
(D9) Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum	Forurenende stoffer i havmiljøet, optages i havets organismer, og nogle bioakkumuleres gennem fødekæden. Et for højt indhold af sundhedsskadelige kemiske stoffer kan være et problem i fisk og fiskevarer, der indtages af mennesker.	Udledning af forurenende stoffer må generelt ikke overskride miljøkvalitetskrav jf. gældende fødevarelovgivning for fisk og skaldyr til konsum De samlede danske dioxinudledninger til luften stiger ikke	Koncentrationer af bly, cadmium, kviksølv, dioxin og dioxinlignende PCB, ikke dioxinlignende PCB og benz(a)pyren (mg/kg vådvægt) i de arter af fisk og skaldyr som er udvalgt under Havstrategi II Årlig udledning til luft af dioxiner (g I-Teq) og PCB (kg)
(D10) Marint affald	Marint affald er affald, som er efterladt på havet eller stranden, eller tilført havet fra vandløb, spildevand, fra land eller luften. Omkring 70-90 % af det marine affald består af plast	Mængden af marint affald og tab af fiskeretskaber reduceres væsentligt med henblik på at nå FN mål	Antal affaldsstykker på referencestrande i Danmark (pr. 100 meter) Plast i maveindholdet i trandede mallebukker (gram plastik og antal plastikstykker pr. fugl) Affald på havbunden (antal affaldsstykker pr km ²) Antallet af indrapporteringer af tabte fiskeretskaber
(D11) Undervandsstøj	Menneskeskabte lyde, der frembringes i forbindelse med f.eks. anlægsarbejder på havet, råstofefterforskning, havbunds-undersøgelser, militære øvelser og skibsfart. Undervandslyd kan påvirke havets dyr ved fysiske skader og påvirke dyrenes høreelse.	Miljømål for impulslyd: Arter under habitatdirektivet udsættes så vidt muligt ikke for impulslyde, der medfører permanente høreskader (grænseværdi på 200 og 190 dB re.1 uPa ² s SEL for hhv. sæler og marsvin akkumuleret over 2 timer) Impulslyd fra menneskelige aktiviteter, planlægges så direkte skadelige virkninger på sårbare populationer af havdyr i videst muligt omfang undgås både i rum, tid og niveau, og at påvirkningerne ikke vil have langsigtede negative effekter på populationsniveau.	Antallet af indberettede aktiviteter der forårsager impulslyde Antal dage med impulslyde (dB re 1 µPa ² s) eller lydtrykniveau (dB re 1 µPa m) målt over frekvensbåndet 10 Hz-10 KHz fra udvalgte menneskelige aktiviteter

Deskriptor	Beskrivelse	Relevante miljømål ¹	Indikator
		I forbindelse med udførelsen af seismiske forundersøgelser gennemføres tilstrækkelige afværgeforanstaltninger jf. Energistyrelsens vejledning	

9.6.1 Metode

Projektet skal vurderes i forhold til miljømål og indsatsprogrammer fastsat i Miljømålsloven, lov om vandplanlægning og Havstrategiloven. Miljømålsloven implementerer EU's Vandrammedirektiv og dele af Habitatdirektivet til dansk lov med henblik på at gennemføre en fælles vand- og naturplanlægning, der skal sikre såvel vand- som naturkvaliteten i Danmark. De internationale forpligtelser behandles i Kapitel 10 om Natura 2000-væsentlighedsvurdering. Nærværende projekt er omfattet af reglerne i Vandrammedirektivet og Havstrategiloven.

De eksisterende forhold er kortlagt på baggrund af de relevante vandplaner og vandområdeplaner for nærområdet omkring ansøgningsområdet "Lodbjerg B" og vurderingen er foretaget på baggrund af eksisterende forhold og sedimentets sammensætning i undersøgelsesområdet.


Der er foretaget en vurdering af, om den ansøgte indvinding kan have en påvirkning på hver af de 11 deskriptorer. For de deskriptorer, hvor det vurderes, at der potentielt kan være en påvirkning, er påvirkningen vurderet for de relevante og operationelle miljømål, som angivet i Basisanalysen for Danmarks Havstrategi II (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019c). Der er desuden foretaget en vurdering i forhold til kumulative effekter for havstrategiens deskriptorer og en samlet vurdering af råstofindvindingens påvirkning på Danmarks havstrategi under afsnit 9.6.4 – Sammenfattende vurdering og 9.12.6 – Kumulative effekter/Havstrategi.

Der er ligeledes foretaget en vurdering i forhold til indvindingens påvirkning af de udpegede nye beskyttede havstrategiområder.

9.6.2 Eksisterende forhold

9.6.2.1 Vandplaner og vandkvalitet

Ansøgningsområdet er beliggende ca. 15 km fra kystlinjen på åbent vand indenfor Vandrammedirektivets 12-sømil grænse men udenfor 1-sømil grænsen (se Figur 9-25). Den ansøgte indvinding er derfor udelukkende vurderet i forhold til potentiel påvirkning af kemisk tilstand.



Figur 9-25 Ansøgningsområdets placering i forhold til vandrammedirektivets 1 og 12 sømils grænser

Ansøgningsområdet er beliggende i vandområdedistrikt Jylland og Fyn i vandområde 223 Skagerrak 12 sm og vest for vandområde 221 Skagerrak. Den kemiske tilstand for vandområdet er vurderet, som god (Tabel 9-11). Tilstanden er baseret på tilstandsvurderingerne for vandområdeplaner 2015-2021 og er hentet via Miljøstyrelsens MiljøGIS (MiljøGIS, 2021).

Tabel 9-11. Oversigt over økologisk og kemisk tilstand i vandområde 221 og 223. Tilstanden er baseret på tilstandsvurderingerne for vandområdeplaner 2015-2021 og er hentet via Miljøstyrelsens MiljøGIS (MiljøGIS, 2021).

ID/Vandområde	Ålegræs	Bund-fauna	Klorofyl	Miljøfarlige stoffer	Samlet økologisk tilstand	Kemisk tilstand
221 - Skagerrak	Ukendt	Høj	Ringe	Ukendt	Ringe	God
223 - Skagerrak, 12 sømil	-	-	-	-	-	God

9.6.2.2 Havstrategi

Deskriptorer

Der er redegjort for Havstrategiens 11 deskriptorer, miljømål og indikatorer i Tabel 9-10. Påvirkningen af indvindingen for hver enkelt deskriptor er vurderet i afsnit 9.6.3.2. Eksisterende forhold er inkluderet i dette afsnit for de deskriptorer, som er vurderet til at have en påvirkning i selve ansøgningsområdet og for D11 undervandsstøj, som potentielt kan påvirke lokalt omkring ansøgningsområdet. Tilstanden i Nordsøen er derfor beskrevet

nedenfor for følgende Deskriptorer: D1 Biodiversitet, D5 Eutrofiering, D6 Havbundens integritet og D11 Undervandsstøj.

D1 Biodiversitet:

For **fugle** svarer god miljøtilstand til vurderingen under fuglebeskyttelsesdirektivet. Data fra den seneste afrapportering (2013) af ynglende fugle viser, at visse artsgrupper overordnet set er stabile eller i fremgang såsom planteædende fugle og fugle, som fouragerer i vandsøjlen. For grupper som vadefugle og fugle, der fouragerer i overfladen, er under 75 % af arterne stabile eller i fremgang. For overvintrende fugle er hovedparten af artgrupperne stabile, i fremgang eller fluktuerende, dog ikke fugle, som søger føde på havbunden.

For **havpattedyr** svarer god miljøtilstand til gunstig bevaringsstatus under habitatdirektivet. Der er opnået god miljøtilstand for spættet sæl. Gråsæler er i fremgang, men havde ikke opnået god tilstand i 2013. Bestanden af marsvin i Nordsøen er stabil. Viden om bifangst er begrænset, særligt for sæler, men for marsvin vurderes bifangstraten at være under 1 % af bestanden.

Tilstanden for **fisk**, der ikke udnyttes erhvervsmæssigt, er vurderet på baggrund af 14 udvalgte arter. I forhold til fiskeridødeligheden er knap 1/4 af de undersøgte bestande i god tilstand. I forhold til populationstætheden er lidt under halvdelen af de undersøgte bestande i god tilstand.


D5 Eutrofiering: I forhold til eutrofiering er der god tilstand i de åbne danske havområder i Nordsøen inklusive Skagerrak, der er beliggende langt fra land. Der er derimod endnu ikke opnået god tilstand i de åbne havområder, der er tættere på land, og ingen af kystvandområderne har nået målopfyldelse.

D6 Havbundens integritet: Havbunden i Danmark er stærkt udnyttet med forstyrrelsesrater på omkring 85 % i Nordsøen og 67 % i Østersøen. Det samlede tab er ca. 1 % for henholdsvis Nordsøen og Østersøen, men for enkelte habitattyper er tabsandelen høj. Data fra stenrev og den bløde bund i åbne farvande viser, at lysnedtrængning i havet er forbedret, hvilket optimerer forholdene for havbundens arter. Der er ikke fastsat tærskelværdier for god tilstand endnu, men på baggrund af ovenstående opgørelser formodes det, at der ikke er god tilstand for havbunden i forhold til forstyrrelse og for visse habitattyper heller ikke i forhold til tab.

D11 Undervandsstøj: En analyse fra 2015 viser, at der registreres støjende aktiviteter i form af impulslyd i Nordsøen og det Nordlige Kattegat. Lydniveauet er på et niveau, der kan have en skadelig virkning. Størstedelen af de danske havområder er påvirket af impulsstøj i mindre end 10 dage. Lavfrekvent lyd er ikke undersøgt i Nordsøen.

Havstrategiområder

Der er udpeget flere nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen (Miljøministeriet, 2021) (Figur 9-26). Ansøgningsområdet ligger ca. 27 km fra det nærmeste havstrategiområde B. Område F ligger ca. 41 km fra ansøgningsområdet og øvrige områder i mere end 100 km afstand.




Figur 9-26. Nye havstrategiområder omkring ansøgningsområdet. Ansøgningsområdet er markeret med rød firkant på figuren. Kilde: (Miljøstyrelsen, 2019).

Område B: Område B ligger ca. 27 km sydvest for ansøgningsområdet. Området ligger vest for Thyborøn og er på ca. 287 km² med varierende dybde (22-37 m) i området. 78 km² af området udpeges som strengt beskyttet (Figur 9-27). Området er domineret af bundhabitattyperne, circalittoralt groft sediment, circalittoralt blandet sediment og circalittoralt sand. Det strengt beskyttede område er identisk med Natura 2000-område N256 Thyborøn stenvolde. Området er karakteriseret ved lange, smalle stenrygge (svarende til circalittoralt blandet sediment), der rejser sig op til 8 meter over havbunden med en mangfoldighed af fauna bestående af både stationære og mobile dyr kendetegnende for rev. På grund af vanddybden ligger revene uden for den fotiske zone, derfor er revene i området helt uden vegetation, mens dyrelivet er artsrigt (Miljøministeriet, 2021).

Artssammensætningen og de dominerende arter er forskellige på de forskellige rev-områder, men overordnet set er særligt dødningshånd, bladmosdyr, polypdyr talrige med observationer af arter af slangestjerner, pigget og alm søstjerne, sort hummer, stort søpindsvin, kolonidannende polypdyr og taskekrabbe samt fiskene kutlinger, havkarusser, torsk og rødspætte (Miljøministeriet, 2021).

Området er i et pelagisk højproduktivt område med observationer af flere arter af havfugle, og derudover forekommer marsvin og vågehval i området (Miljøministeriet, 2021).



Figur 9-27. Bundhabitattyper og bundfauna i område B i Nordsøen. Kilde: (Miljøministeriet, 2021).

Området er udsat for et intensivt fiskeri. Særligt i 2019 var der et intenst fiskeri af danske fartøjer, og den sydlige del af området har været fisket jævnlige af udenlandske fartøjer i perioden 2015-2019, med både bundsløbende redskaber og pelagiske redskaber (Miljøministeriet, 2021).

9.6.3 Miljøpåvirkninger

I det følgende er indvindingens påvirkning i forhold til vandkvalitet, vandplaner og havstrategidirektivet vurderet.

9.6.3.1 Vandplaner og vandkvalitet

Ansøgningsområdet ligger indenfor 12 sømil grænsen og udenfor 1-sømil grænsen, hvorfor der udelukkende vurderes i forhold til vandområdets kemiske tilstand.

Sandet der indvindes er rent, fint sand med generelt lavt organisk indhold og dermed også lav bindingsevne for miljøfarlige stoffer, tungmetaller mm. Kemisk tilstand vurderes derfor ikke at blive påvirket som følge af sedimentspild fra indvindingen, og projektet vurderes ikke at være til hindring for målopfyldelse i vandområde 223 og 221.

9.6.3.2 Havstrategi

Deskriptorer

I det følgende er alle deskriptorer gennemgået og eventuelle potentielle påvirkninger på disse emner er vurderet, med udgangspunkt i vurderingerne for de relevante parametre i denne rapport.

D1: Biodiversiteten målt som antal arter og artssammensætningen er vurderet til at blive påvirket i forbindelse med indvindingen af sand i ansøgningsområdet. Bundflora- og fauna-diversiteten i påvirkningszonen og i Nordsøen udenfor området vil ikke blive påvirket. Forstyrrelsen af bundfaunaen i ansøgningsområdet er reversibel med en genetableringstid for bundfaunasamfundet på ca. 2-5 år (se afsnit 9.2 - Flora og fauna) og vil således ikke være til hindring for at opnå og fastholde god miljøtilstand i Nordsøen generelt.

Bifangst i havstrategien foregår ved konsum og industrifiskeri og er ikke relevant for råstofindvindingsprojekter, hvor fiskeri ikke forekommer, og dermed heller ikke i dette projekt.

Bestandsstørrelser af fugle og havpattedyr kan påvirkes direkte og indirekte. Direkte ved påvirkninger, der øger dødeligheden i en bestand eller indirekte ved at reducere bestandenes mulighed for at yngle, søge føde eller raste.

Der forekommer ikke væsentlig fortrængning (evt. kun kortvarig og lokal, se nedenstående vedrørende D11 undervandsstøj) eller direkte dødelighed af fugle og havpattedyr fra dette projekt, og dermed vil projektet heller ikke kunne påvirke bestandsstørrelser af disse arter. Samlet set er det vurderet i miljøkonsekvensvurderingerne, at projektets påvirkninger på fugle og havpattedyr ingen overordnet betydning har for bestandene, idet der kun er potentielle mindre til ubetydelige påvirkninger indenfor ansøgningsområdet.

Spæklag af havpattedyr varierer med dyrenes fødeoptag og generelle sundhedstilstand, som ikke berøres af dette projekt.

Størrelse og tilstand af habitatområder for fugle og havpattedyr kan påvirkes negativt ved forringelse af vandkvalitet og fysisk forstyrrelse eller fortrængning fra opholdssteder og havområder, hvor dyrene søger føde.

Habitatområdernes tilstand og størrelse vurderes ikke at blive påvirket af dette projekt, da påvirkninger fra projektet kun er lokale og kortvarige samtidig med, at ansøgningsområdet ikke er væsentlige habitater for fugle og havpattedyr.

Biomassen af plankton i havområdet forventes ligeledes ikke påvirket, idet sandet er rent og frigivelsen af næringsstoffer fra sedimentet vil være lav (se afsnit for D5 Eutrofiering).

På det grundlag vurderes det derfor, at projektet ikke vil kunne påvirke havstrategiens miljømål eller hindre opnåelse af god miljøtilstand for denne deskriptor.

D2: Ikke-hjemmehørende arter

Ikke-hjemmehørende arter, er arter der via menneskelige aktiviteter bliver indført til områder, hvor de ikke findes naturligt, og hvortil de ikke naturligt kan spredes. Indførslen kan påvirke eksisterende fødenet og økosystemer negativt.

Denne deskriptor vurderes ikke at være relevant for dette projekt, da de benyttede indvindingsskibe opererer i danske farvande, og hvis der mobiliseres skibe fra andre farvande, vil man følge procedurer for behandling af ballastvand jævnfør IMO vejledninger.

På det grundlag vurderes det, at projektet ikke vil kunne påvirke havstrategiens miljømål eller forhindre opnåelsen af god miljøtilstand for denne deskriptor.

D3: Erhvervsmæssigt udnyttede bestande

Fiskeri har betydning for fiskebestandenes størrelse, dødelighed, fiskenes alder og størrelsesfordeling, diversitet og gydebiomassen. Det skal derfor vurderes om indvindingen kan påvirke fiskeridødeligheden, gydebiomassen og alders- og størrelsesfordelingen af individer i populationerne og den genetiske diversitet for de kommercielt fiskede arter i Nordsøen/Skagerrak.

Indvindingsaktiviteter vil medføre en arealinddragelse, som kan forstyrre fisk ved at indskrænke mulige gyde- og opvækstområder samt føre til en reduktion af habitat- og fødegrundlag. Det påvirkede område i ansøgningsområdet udgør en ubetydelig del af det samlede fourageringsområde, samt gyde- og opvækstområde for fisk i Nordsøen og Skagerrak, herunder for de kommercielle arter (7-28% af ansøgningsområdet påvirkes pr år). Substrattype og dybder er desuden almindelige i Nordsøen og langs Vestkysten udenfor ansøgningsområdet. Indvindingens påvirkning på fiskebestandene og disses gydeområde- og opvækstområder er vurderet som mindre til ubetydelig i ansøgningsområdet, ubetydelig i påvirkningszonen og ingen i havområdet udenfor i afsnit 9.3.3. Ansøgte indvinding vurderes derfor ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger på havbunden, gyde- og opvækstområder, fødegrundlaget og bestandene af kommercielle fiskearter i Nordsøen og Skagerrak generelt. På det grundlag vurderes det derfor, at projektet ikke vil kunne påvirke havstrategiens miljømål eller forhindre opnåelsen af god miljøtilstand for denne deskriptor i Nordsøen/Skagerrak.

D4: Havets fødenet

Beskrives som: alle kendte elementer i havets fødenet er til stede og forekommer med normal tæthed og diversitet. Der er ingen relevante miljømål for denne deskriptor. Der anvendes derfor relevante indikatorer fra D1. Det er beskrevet under D1, at indvindingen ikke medfører væsentlig påvirkning på havbund, bundflora og -fauna, fisk, fugle, havpattedyr eller planktonbiomassen. På det grundlag vurderes det derfor, at projektet ikke vil kunne påvirke havstrategiens miljømål eller forhindre opnåelsen af god miljøtilstand for denne deskriptor.

D5: Eutrofiering

En øget koncentration af næringsstofferne kvælstof og fosfor i havmiljøet kan forårsage øget algevækst. Dette er ikke nødvendigvis negativt for miljøet, men det kan følgevirkningerne være. Øget algevækst kan føre til iltvind og dårlige lysforhold i vandet og dermed forringe forholdene for bundplanter, fisk og andre dyr. Endvidere kan det medvirke til opblomstring af giftige alger. Samlet set er eutrofiering et udtryk for processer i havmiljøet, hvor en øget mængde næringsstoffer (kvælstof og fosfor) påvirker det samlede havmiljø (Miljø- og Fødevarerministeriet, 2019c).

Sandet der indvindes er rent, fint sand med meget lavt organisk indhold og dermed også lav bindingsevne for miljøfarlige stoffer, tungmetaller mm. Det er derfor vurderet, at indvindingen ikke vil medføre frigivelse af næringsstoffer over den naturlige baggrundskoncentration i området og dermed ikke vil medføre øget næringsstofbelastning og dermed afledt eutrofiering hverken i eller omkring ansøgningsområdet eller i Nordsøen generelt. På det grundlag

vurderes det derfor, at projektet ikke vil kunne påvirke havstrategiens miljømål eller forhindre opnåelsen af god miljøtilstand for denne deskriptor.

D6: Havbundens integritet

Indvindingen kan potentielt påvirke havbundens integritet, dvs. havbundens fysiske egenskaber, som er bestemt ved indholdet af ler, mudder, sand, sten samt struktur. Havbundens plante- og dyresamfund er tilpasset de fysiske karakteristika, hvorfor ændringer i fordelingen af disse substrattyper kan have stor betydning (Miljøstyrelsen, 2017). Det er vurderet i afsnit 9.1.3 – Havbund, dybde og dynamik, at råstofindvindingen vil medføre en lokal ubetydelig påvirkning af substratforholdene og en mindre ændring af dybdeforholdene, idet fjernelse af ressource ved indvindingen lokalt kan medføre blotlæggelse af den underliggende finere sandbund. Substrattype 1b sandbund i ansøgningsområdet vil således ikke blive ændret ved fjernelse af ressourcen, og indvindingen vurderes at medføre en *ubetydelig* ændring af substrattypen i ansøgningsområdet og ingen i påvirkningszonen og Nordsøen udenfor. Det er vurderet, at artssammensætningen af bundflora, -fauna og fisk ikke eller kun lokalt og kortvarigt ændres som følge af indvindingen i ansøgningsområdet, men ikke generelt eller i Nordsøen og Skagerrak. Biomassen kan ændres lokalt i en midlertidig periode og genetableres indenfor 2-5 år i den indvindingspåvirkede del af ansøgningsområdet og påvirker ikke diversiteten, udbredelsen og biomassen i habitattyperne generelt i Nordsøen. En mindre ændring af dybden, samt diversiteten og biomassen af dyr og planter lokalt i ansøgningsområdet vil ikke være til hindring for at opnå og fastholde god miljøtilstand for deskriptoren "havbundens integritet" i Nordsøen og Skagerrak.

D7: Hydrografiske ændringer

Havets fysiske egenskaber såsom temperatur, saltholdighed, havstrømme og bølgepåvirkning er afgørende for de marine økosystemer. De er i høj grad bestemt af vind, tidevand, lufttryk og ikke mindst klima, men kan også påvirkes af menneskelige aktiviteter. Menneskeskabte aktiviteter, som især er forbundet med fysisk tab af havbunden og som forårsager permanente, hydrografiske ændringer, må kun have lokale virkninger på havbunden og i vandsøjlen og skal udformes under hensyn til miljøet for at forebygge skadelige virkninger på havbunden og i vandsøjlen.

Indvindingen påvirker udelukkende dybden i lokale dele af ansøgningsområdet, hvor der indvindes. Indvindingen vil gennemsnitligt medføre en dybdeændring på ca. 1,04 m over 10 år og maksimalt op til ca. 1,5 meter lokalt i ansøgningsområdet (se evt. afsnit 9.1.3). En så lille dybdeændring, der ligger indenfor den naturlige variation i havbunden langs Vestkysten, påvirker ikke de hydrografiske parametre hverken i ansøgningsområdet eller udenfor. På det grundlag vurderes det derfor, at projektet ikke vil kunne påvirke havstrategiens miljømål eller forhindre opnåelsen af god miljøtilstand for denne deskriptor.

D8: Forurenende stoffer

Miljøfarlige stoffer er syntetiske og ikke-syntetiske forbindelser, som kan forårsage negative effekter på dyre- og planteliv og forårsage direkte negative biologiske effekter på marine organismer. Stofferne kan akkumuleres i fødekæden og ende med at forårsage en særlig stor risiko øverst i fødekæden. Miljømålene for deskriptoren er koblet til vandrammedirektivets vandområdeplaner og de tilhørende fastsatte miljøkvalitetskrav for koncentrationer af stoffer

i vand, sediment og biota (Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, BEK nr. 1625 af 19/12/2017).

Spild af olie eller kemikalier vurderes ikke at være relevante i dette projekt, da den eneste kilde vil være fra indvindingsfartøjerne ved en ulykkehændelse eller havari. Risikoen herfor er ikke anderledes end ved øvrig sejlads. Ligesom indvindingsfartøjerne overholder gældende regler for søfart. Risikoen vurderes således som minimal og uden betydning.

Miljøkvalitetskrav for miljøfarlige stoffer kan potentielt påvirkes fra projektet ved frigivelse af miljøfarlige stoffer fra sedimentspild under råstofindvindingen. Sedimentet i indvindingsområdet er vurderet til at have lavt organisk indhold, og dermed også med lave koncentrationer af miljøfarlige stoffer, som primært er organisk bundet. Ligeledes er der ingen kilder til miljøfarlige stoffer i området. Derfor er den potentielle frigivelse yderst begrænset, og det er vurderet, at indvindingen ikke vil forringe tilstanden for kvalitetselementet miljøfarlige stoffer i de omgivende vandområder eller hindre opnåelse af god økologisk tilstand for vandområderne.

På det grundlag vurderes det derfor, at projektet ikke vil kunne påvirke havstrategiens miljømål eller hindre opnåelse af god miljøtilstand for denne deskriptor.

D9: Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum

Mange af de forurenende stoffer, der findes i havmiljøet, optages i havets organismer, og nogle af stofferne ophobes gennem fødekæden. Stofferne kan komme fra menneskelige aktiviteter på havet såsom skibsfart, akvakultur og udvinding af olie og gas eller fra landbaserede kilder såsom industri, byer og landbrug.

Deskriptor 9 er tæt knyttet til deskriptor D8, men relaterer specifikt til koncentrationer af miljøfarlige stoffer i fisk og skaldyr til konsum. Da der ikke vurderes at være nogen væsentlig påvirkning fra projektet på deskriptor D8, fremgår det, at der ikke vil være nogen påvirkning på denne deskriptor.

D10: Marint affald

Marint affald er affald, som er efterladt på havet eller stranden, eller som tilføres havet via vandløb, spildevand, fra land eller luften. Omkring 70-90 % af det marine affald består af plast. Det vurderes ikke at være relevant for dette projekt, da indvindingen ikke medfører tilførsel af affald til det marine miljø.

D11: Undervandsstøj

Undervandslyd kan påvirke havets dyr på mange forskellige måder. Kraftige kortvarige lyde (impulslyd) kan forårsage fysiske skader og påvirke dyrenes hørelse. For havpattedyr som f.eks. sæler og marsvin er hørelsen vigtig både i forbindelse med fødesøgning og for at kunne kommunikere med artsfæller. Den lavfrekvente og mere konstante lyd, der frembringes ved f.eks. skibsfart kan potentielt påvirke dyrenes adfærd, mulighed for at kommunikere med hinanden og lyst til at opholde sig i bestemte områder. Selvom der efterhånden er en del viden om effekten af menneskeskabt støj på enkelte individer og arter, er der ikke tilstrækkelig viden om konsekvenserne på bestandsniveau. Deskriptoren har fokus på menneskeskabte lyde, der frembringes i forbindelse med f.eks. anlægsarbejder på havet, råstofefterforskning,

havbundsundersøgelser, militære øvelser og skibsfart. Indikatoren er opgørelser af varigheder af påvirkninger fra impulslyd, såsom ramning af monopæle eller seismiske undersøgelser.

Der produceres ikke impulsstøj fra råstofindvinding. Den primære kilde til undervandsstøj ved råstofindvinding vil være motorstøj fra indvindingsfartøjet, samt støj forårsaget af selve pumpeaktiviteten ved havbunden samt i sugerøret. Støjniveauet for slæbesugere uanset størrelse er vurderet til at være 186-190 re 1 μPa @1m, som er sammenligneligt med lydniveauet fra et fragtskib, som sejler 8-16 knob. Støjpåvirkningen stammer fra indvinding med 1-6 skibe i 4-97 dage/år. Samlet set vurderes indvindingsstøjens påvirkning på havpattedyrene i ansøgningsområdet, påvirkningszonen og havområdet udenfor som *ubetydeligt* negativ. Undervandstøjen fra råstofindvindingen vurderes derfor ikke at være til hindring for at opnå og fastholde god miljøtilstand i Nordsøen.

Lavfrekvent lyd er ikke specifikt vurderet, idet der ikke er data tilgængelige for dette og operationelle tærskelværdier. Det er dog ikke sandsynligt, at den meget begrænsede indvinding i ansøgningsområdet i få dage om året vil medføre væsentlig merbelastning i forhold til lavfrekvent støj for havets dyr, hverken alene eller kumulativt i forhold til den eksisterende skibstrafik i området.

På det grundlag vurderes det derfor, at projektet ikke vil kunne påvirke havstrategiens miljømål eller forhindre opnåelsen af god miljøtilstand for denne deskriptor.

Havstrategiområder

Det nærmeste beskyttede havstrategiområde B ligger ca. 27 km fra ansøgningsområdet. Øvrige havstrategiområder ligger >40 km fra ansøgningsområdet (Figur 9-26). Indvindingen kan potentielt påvirke nærliggende havstrategiområder i forbindelse med sedimentspild og støj.

Det er anført i (Miljøministeriet, 2021): "Begrænsningerne indføres inden for de beskyttede og strengt beskyttede havstrategiområder, og der sættes således ikke begrænsninger ift. aktiviteter, der finder sted uden for områderne, uanset om de kan medføre en påvirkning ind i områderne."

Indvindingen påvirker ikke havstrategiområderne, hverken direkte eller indirekte som følge af den store afstand (27 km).

Der vurderes således ikke at være en påvirkning fra den ansøgte indvinding på de nærliggende beskyttede havstrategiområder.

9.6.4 Sammenfattende vurdering

Samlet set vurderes der ikke væsentlige påvirkninger fra råstofindvindingen på vandkvalitet og tilstanden og målsætningen for vandplanernes kvalitetselementer.

Indvindingen vil ligeledes ikke påvirke Havstrategiens enkelte deskriptorer og disses miljømål. Ligesom de beskyttede havstrategiområder ikke vil blive påvirket af den ansøgte indvinding. Indvindingen påvirker således ikke Danmarks Havstrategi.

9.7 Marinarkæologiske interesser

I det følgende kapitel beskrives de marinarkæologiske interesser i ansøgningsområdet samt i tilhørende påvirkningszone. Der er fokus på skibsvrag og andre menneskeskabte genstande på havbunden samt eventuelle begravede stenalderbopladser.


9.7.1 Metode

De marinarkæologiske interesser beskrives ud fra de geofysiske undersøgelser af havbunden samt registreringer baseret på Slots- og Kulturstyrelsens database over fund og fortidsminder (Slots- og Kulturstyrelsen, 2021). Det skal dog nævnes, at styrelsens database ikke er et komplet register, og den vurderes kun at indeholde 10-20 % af den danske undersøiske kulturarv. Databasen giver dermed ikke et komplet billede af de kulturhistoriske interesser på havbunden (Slots- og Kulturstyrelsen, 2021). Der er ikke foretaget en marinarkæologisk forundersøgelse eller arkivalisk kontrol i ansøgningsområdet.

De geofysiske data og den geofysiske baggrundsrapport er fremsendt til Nordjyllands Kystmuseum, som er det ansvarlige marinarkæologiske museum for aktiviteter i Nordsøen/Skagerrak ved ansøgningsområdet. På baggrund heraf kan eventuelle områder med særlig kulturhistorisk interesse udpeges af det marinarkæologiske museum, og museet fastlægger de endelige marinarkæologiske værdier i ansøgningsområdet.

9.7.2 Eksisterende forhold

Ansøgningsområdet er beliggende inden for Nordjyllands Kystmuseums marinarkæologiske ansvarsområde. Museet har vist stor interesse for de geofysiske data i høringssvaret, som kan være med til at afklare, hvor under havbunden stenalderbopladserne i dag er bevaret. De geofysiske data er blevet fremsendt til Nordjyllands Kystmuseum.



Figur 9-28. Ansøgningsområdet og påvirkningszone, med lokationer for registrerede Fund og Fortidsminder.

Ifølge Kulturstyrelsens database "Fund og Fortidsminder" findes der ingen registreringer af fund og fortidsminder inden for undersøgelsesområde for Lodbjerg B (Figur 9-28) (Slots-og Kulturstyrelsen, 2021).

Derudover er der andre nærliggende vrag-registreringer på Fund-og fortidsminder (Slots-og Kulturstyrelsen, 2021) (Figur 9-28), og der bliver gjort opmærksom på fem vrag fra Kystmuseets høringssvar og to nærliggende registreringer (Systemnr. 183426 og 180929). Disse er medtaget grundet registreringerne af dem kan være unøjagtige, og dermed kan potentielt de befinde sig inden for ansøgningsområdet:

Systemnr. 183422

Sted- og lokalitetsnr. – 400110d-88. Ligger sydøst for ansøgningsområdet.

Vrag, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

- 1986 Registrering af forlisdata
Journal nr.: GB-1777
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Position på vrag, uvis forlisdato, reg. af fisker. (Uden ref. til EFS)
- 1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: GB-1777
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Systemnr. 183423

Sted- og lokalitetsnr. – 400110d-89. Ligger sydøst for ansøgningsområdet.

Vrag, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

- 1986 Registrering af forlisdata
Journal nr.: GB-1778
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Position på vrag, uvis forlisdato, reg. af fisker. (Uden ref. til EFS)
- 1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: GB-1778
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Systemnr. 183424

Sted- og lokalitetsnr. – 400110d-92. Ligger syd for ansøgningsområdet.

Vrag, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

- 1986 Registrering af forlisdata
Journal nr.: GB-1780
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Position på vrag, uvis forlisdato, reg. af fisker. (Uden ref. til EFS)
- 1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: GB-1780
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Systemnr. 183426

Sted- og lokalitetsnr. – 400110d-90. Ligger syd for ansøgningsområdet.

Vrag, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

- 1986 Registrering af forlisdata
Journal nr.: GB-1782
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Miner. Reg. af fisker.
- 1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: OJ-217
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor Miner.

Systemnr. 180929

Sted- og lokalitetsnr. – 400110d-49. Ligger nordøst for ansøgningsområdet.

Luftfartøj, Nyere tid (dateret 1990 - 1999 e.Kr.)

- 1986 Registrering af forlisdata
Journal nr.: OJ-218
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Position på vrag, uvis forlisdato, reg. af fisker. (Uden ref. til EFS)
- 1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: OJ-218
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
- 1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: GB-1779
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Reg. af fisker på samme position

Systemnr. 183432

Sted- og lokalitetsnr. – 400110d-95. Ligger sydøst for ansøgningsområdet.

Vrag, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

- 1986 Registrering af forlisdata
Journal nr.: GB-1795
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Position på vrag, uvis forlisdato, reg. af fisker. (Uden ref. til EFS)
- 1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: GB-1795
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Systemnr. 180946

Sted- og lokalitetsnr. – 400110d-54. Ligger nordøst for ansøgningsområdet.

Vrag, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

- 1986 Registrering af forlisdata
Journal nr.: OJ-240
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Position på vrag, uvis forlisdato, reg. af fisker. (Uden ref. til EFS)
- 1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: OJ-240
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Udover disse registreringer kan der potentielt ligge rester af skibe og ladninger samt andre genstande, der kan være beskyttet i henhold til museumsloven. Skulle der under eventuelt indvindingsarbejde påtræffes spor af fortidsminder eller vrag skal dette straks anmeldes til Nordjyllands Kystmuseum i henhold til museumslovens §29 h.

I forbindelse med de gennemførte akustiske undersøgelser med seismik og sidescan sonar samt i forbindelse med den efterfølgende visuelle verifikation blev der ikke registreret vrag eller andre spor af menneskelig aktivitet i undersøgelsesområdet, som kan have en marinarkæologisk interesse (GEUS, 2021a).

Der er ikke foretaget en marinarkæologisk forundersøgelse i området, og det er i sidste ende Nordjyllands Kystmuseum, der fastlægger de endelige marinarkæologiske kulturarvsværdier i ansøgningsområdet. Hvis der ved museets gennemgang af de geofysiske data forefindes kulturhistoriske værdier i form af vrag, kan der fastlægges et punkt med en sikkerhedszone indenfor hvilken, man ikke må indvinde. Hvis det vurderes, at der kan være begravede stenalderlandskaber, kan det ligeledes indføres i indvindingstilladelsen, at der skal efterlades minimum 1 m sand over det potentielt kulturbærende lag, hvorved potentielle marinarkæologiske værdier med sikkerhed ikke berøres.

9.7.3 Miljøpåvirkninger

I forbindelse med indvindingsaktivitet på havbunden kan kulturhistoriske fortidsminder potentielt gå tabt, idet de kan ødelægges af aktiviteter, som forstyrrer havbunden i forbindelse med råstofindvindingen. Den mulige påvirkning af marinarkæologiske forekomster vil under råstofindvinding være knyttet til en direkte fysisk påvirkning i forbindelse med slæbesugning, hvorved påvirkningen i så fald vil have stor betydning. Disse indvindingsaktiviteter vil udelukkende have en effekt på de marinarkæologiske forhold, hvis objekter af kulturhistorisk interesse er beliggende netop der, hvor den fysiske påvirkning finder sted.

Under indvindingen overvåges det, om der påtræffes marinarkæologiske genstande samt vrag. Påtræffes sådanne genstande, følges anvisningerne i Kulturstyrelsens "Instruks vedrørende registrering af marinarkæologiske fund".

Ansøgningsområdet er beliggende i et område, hvor de holocæne sand aflejringer (aflejringer fra ca. 12.000 år siden til nu) er 7-8 m tykke, som overlejrer de senglaciale lag (aflejringer fra ca. 20.000-12.000 år siden), dvs. de kulturbærende lag ligger 7-8 m under havbunden (se afsnit 4.6 - Indvindingsressource). Sandforekomsten/ressourcen udgør de øverste lag med en tykkelse på 1-8 m. Derudover er ansøgningsmængden på 6,0 mio. m³ væsentlig under den kortlagte mængde i området på 50 mio. m³. Da indvindingen udelukkende vil gennemføres med slæbesugning, hvor det kun er de øverste meter der påvirkes, vurderes det som usandsynligt, at der bliver suget til bunden af ressourcen.

Det vurderes, at forstyrrelsen af havbunden fra indvindingen vil medføre en *ubetydelig negativ* påvirkning af de marinarkæologiske interesser. Det vurderes ikke nødvendigt at foretage yderligere marinarkæologiske forundersøgelser, men det er dog i sidste ende Nordjyllands Kystmuseum, som det ansvarlige museum samt Slots- og Kulturstyrelsen, der skal fastlægge omfanget af de marinarkæologiske interesser i området og derved den potentielle påvirkning herpå.

9.7.4 Sammenfattende vurdering

Indvindingens betydning for marinarkæologiske interesser i ansøgningsområdet er angivet i Tabel 9-11. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.

Tabel 9-12. Potentielle påvirkninger af marinarkæologiske interesser ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.

Tema: Marinarkæologiske interesser				
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)				
Påvirkning	Omfang	Grad	Varighed (Reversibilitet)	Overordnet betydning
Forstyrrelse af havbunden	Lokal	Lille	Kort	Ubetydelig

9.8 Rekreative interesser

Indvinding af råstoffer kan potentielt påvirke rekreative interesser i et område. Indvindingsaktiviteten vil dog foregå ca. 15 km fra kysten, hvorfor påvirkningen af de rekreative interesser forventeligt vil være meget begrænset.

9.8.1 Metode

Rekreative interesser ud for Lodbjerg beskrives på baggrund af eksisterende viden og oplysninger i området fra bl.a. Miljøstyrelsen og diverse foreninger, klubber eller sammenslutninger med relation til friluftslivet og rekreative interesser i området.

9.8.2 Eksisterende forhold

Indvindingen foregår langt fra den jyske vestkyst (ca. 15 km fra kysten) nær større skibstrafikruter. Generelt er muligheden for rekreative aktiviteter nær indvindingsområdet meget sparsomt, idet den store afstand til kysten gør området uegnet til bl.a. surfing, undervandsjagt, roning, kajak, badning og andre kystnære friluftaktiviteter.

Der ligger mange vrage langs den jyske vestkyst, nærmeste kendte vrage er dampskibet Roseden S/S, som er beliggende ca. 10 km sydøst fra området. (vragguiden.dk). Vraget besøges dog i dag ikke af dykkere. Herudover er der registreret to ukendte vrage ca. 4,5 km nord for ansøgningsområdet (vragguiden.dk), disse er dog indberettet af fiskere, hvis net har sat sig fast, hvorfor det ligeledes kan være større sten. Der forekommer ikke andre kendte dykkervrage i nærheden af ansøgningsområdet, og der blev ikke observeret vrage på havbunden i forbindelse med den geofysiske undersøgelse af ansøgningsområdet (se afsnit 9.7 – Marinarkæologiske interesser).

Lystsejllads kan forekomme i og omkring ansøgningsområdet, da det ligger indenfor de aktive sejlruiter i området (se Figur 9-29 under sejladsforhold).

Lyst- og fritidsfiskeri er en af de rekreative aktiviteter, som kan foregå i og omkring ansøgningsområdet. Lystfiskeri forekommer dog hovedsagelig på lavt vand langs kysten eller på dybere vand på de store rev i området såsom Gule Rev, Jyske Rev og Norske Rende, hvortil der arrangeres lystfiskerture med målarter såsom torsk, lange, sej og havkat m.fl. (Lystfiskerture.dk, 2021). Trollingsfiskeri efter havørreder eller laks kan ligeledes forekomme i området, men formodentligt i meget begrænset omfang, da ansøgningsområdet ligger forholdsvis langt fra kysten og kræver gode vejrforhold for at opholde sig i området.

9.8.3 Miljøpåvirkninger

Indvindingen foretages på åbent hav med stor afstand til kysten, hvormed påvirkningen på de rekreative interesser vil være meget begrænset. Rekreative interesser såsom surfing, undervandsjagt, dykning, roning, kajak og badning er kystnære friluftaktiviteter og vil derfor ikke påvirkes betydeligt, som følge af råstofindvindingen, hvorfor potentielle effekter på rekreative interesser i området stort set er begrænset til rekreativt fiskeri og lystbådssejllads.

Lystbådssejllads forventes at blive ubetydeligt påvirket af indvindingen i ansøgningsområdet, da indvindingen foregår med få både ad gangen (1-6 i ansøgningsområdet), hvorfor det efterlader rigelig plads til at manøvrere udenom aktiviteten.

Lystfiskere, lystsejlere og andre, der befinder sig i området, kan dog føle sig generet af indvindingsaktiviteten. Forstyrrelseseffekten vil naturligvis afhænge af, hvor længe det enkelte fartøj arbejder i området og hvor ofte, der indvindes i området. Indvindingen vil foregå i kortvarige perioder (ca. 4-97 dage/år) og kun i en lille del af ansøgningsområdet (ca. 7-28% af ansøgningsområdet pr. år). Det vil desuden være muligt for lystfiskere og -sejlere at undgå indvindingsfartøjerne ved anvendelse af de generelle søvejsregler. Indvindingen vurderes derfor samlet set at have en *ubetydelig* negativ påvirkning på de rekreative interesser i området.

9.8.4 Sammenfattende vurdering

Indvindingens betydning for Rekreative interesser i ansøgningsområdet er angivet i Tabel 9-13. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.

Tabel 9-13 Potentielle påvirkninger af rekreative interesser ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.

Tema: Rekreative interesser				
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)				
Påvirkning	Omfang	Grad	Varighed (Reversibilitet)	Overordnet betydning
Arealinddragelse	Lokal	Lav	Kort	Ubetydelig

9.9 Sejladsforhold


9.9.1 Metode

Kortlægning af skibstrafikken og sejlruterne i og omkring ansøgningsområdet, som er beliggende i Nordsøen ud for Thy, beskrives hovedsageligt ved anvendelse af AIS Density Plot. Sejladsforholdene i området er primært fastlagt ud fra AIS-data over den samlede skibstrafik i 2016 hentet hos Søfartsstyrelsen (Søfartsstyrelsen, 2021). AIS står for Automatic Identification System. Skibe større end 300 BT (bruttoregisterton) er udstyret med en AIS-sender, det samme er alle passagerskibe og fiskefartøjer over 15 m. AIS-senderen melder løbende om skibets position, hvorved det er muligt at indsamle information om sejlruterne i området. Desuden udsendes der information om skibets hastighed, kurs, MMSI-nummer, IMO-nummer, skibstype, størrelse mm. Densitet-plottet fra 2016 er det seneste tilgængelige AIS plot fra Søfartsstyrelsen (Søfartsstyrelsen, 2021).

For mindre fartøjer <15 m, som lystbåde og mindre fiskefartøjer, er AIS frivilligt. Omfanget af mindre fartøjer er primært knyttet til rekreative forhold og kystnære aktiviteter.

9.9.2 Eksisterende forhold

De eksisterende sejladsforhold i og omkring ansøgningsområdet er vist på Figur 9-29. De lilla farver indikerer tæt trafik (78 til ca. 14.000 skibe pr. år), de brune farver indikerer moderat trafik (14-78 skibe pr. år) og de gullige farver indikerer lav trafik (ca. 5-10 skibe pr. år). Farveløse områder indikerer <5 skibe pr. år. På kortet er angivet ansøgningsområdet og tilhørende påvirkningszone.



Figur 9-29. Sejladstæthed i ansøgningsområdet og i Nordsøen ud for Thy. AIS Density Plot, der viser en akkumuleret trafiktæthed for 1 år for den samlede skibstrafik (2016). På kortet er angivet ansøgningsområde og tilhørende påvirkningszone. Data er hentet på Søfartsstyrelsen.dk under AIS Density Plot (Søfartsstyrelsen, 2021) og analyseret af WSP med påtegning af primære sejlruter.

Det ses, at ansøgningsområdet er beliggende i et område med overvejende moderat tæthed af skibstrafik (op til ca. 78 skibe om året). Lokalt forekommer der høj skibstrafik i området, hvor tætheden overstiger 100 skibe om året (Figur 9-29).

Ved at anvende Søfartsstyrelsens AIS Density Plot er det muligt at skelne passagerskibe, tankskibe og fiskefartøjer (Søfartsstyrelsen, 2021). Skibstrafikken i området er domineret af fiskefartøjer og tankskibe. Ansøgningsområdet er placeret i en skibskorridor, der benyttes af tankskibe, og ellers er området i Nordsøen domineret af fiskefartøjer. I ansøgningsområdet sejler der kun meget få passagerskibe.

Generelt ligger ansøgningsområdet inden for de store trafikale skibskorridorer, som forløber langs den jyske vestkyst, rundt om skulderen af Jylland ved Hanstholm og videre op mod Grenen ved Skagen. På ovenstående Figur 9-29 er der indtegnet de mest dominerende sejlruter i området, som langt størstedelen af skibene i området følger. Der forekommer særligt tre markante skibskorridorer, som er orienteret SV-NØ; hvor en løber øst om ansøgningsområdet, mens to løber vest herom. Der ses desuden markante skibskorridorer til og fra Limfjorden ved Thyborøn og til og fra Hanstholm Havn.

9.9.3 Miljøpåvirkninger

De potentielle påvirkninger af sejladsforhold i ansøgningsområdet som følge af råstofindvindingen og deraf øget skibstrafik kan være følgende;

- Risiko for kollision

-
- Risiko for oliespild
 - Navigationsproblemer for øvrig skibstrafik

I det følgende foretages en vurdering af indvindingens påvirkning på sejladsforhold i ansøgningsområdet og i området omkring.

Indvindingsaktiviteterne vil generere en stigende skibstrafik inden for ansøgningsområdet. Desuden medfører transporten af indvundet materiale fra ansøgningsområdet til fordringsstrækningerne langs vestkysten en stigning i skibstrafikken i området mellem ansøgningsområdet og kysten. Den øgede skibstrafik kan potentielt give anledning til navigationsproblemer for fiskefartøjer og anden skibstrafik. Potentielt kan disse navigationsproblemer medføre øget risiko for grundstødning og kollision.

I forbindelse med nærværende indvinding forventes det, at kan forekomme enten 1-2 store skibe (21.000 m³) eller 1-3 små skibe (a 2000 m³), der sejler frem og tilbage mellem ansøgningsområdet og Lodbjerg strækningen og evt. op til det dobbelte antal skibe, hvis der køres to kampagner samtidigt (se afsnit 4.5).

En gennemsnitlig fodring på 600.000 m³/år medfører at der for store skibe (21.000 m³) eller små skibe (2000 m³) skal sejles henholdsvis 57 eller 600 gange/år frem og tilbage mellem ansøgningsområdet og Lodbjerg-Nymindegab strækningen, hvor fodringen foretages parallelt med indvindingen. Gennemsnitsindvindingen foretages indenfor en periode på 4-88 dage/år afhængigt af hvilken skibsstørrelse der anvendes.

Ved en maksimalfodring på 2.000.000 m³/år vil der tilsvarende skulle sejles mellem 190 og 2000 gange/år ved brug af store eller små skibe. Maksimalindvindingen foretages indenfor en periode på 12-97 dage/år ved fodring på én hovedstrækning. Ved brug af små skibe (a 2.000 m³ lastkapacitet) til maksimalfodring, vurderes det fra Kystdirektoratet at der minimum skal bruges tre, for at processen ikke tager for lang tid.

Ved at sammenholde med den eksisterende tæthed i skibstrafikken inden for ansøgningsområdet (jf. Figur 9-29), forventes tætheden lokalt under de enkelte indvindingsperioder at forøges svarende til en middel påvirkningsgrad i områder med moderat skibstrafik (19-78 skibe pr. år). Hvorimod områder med høj tæthed (78-14.000 skibe pr. år) kun vil have en lav forøgelse.

Slæbesugningen foregår ved en jævn langsom hastighed, hvor fartøjet følger en stabil retning inden for de afgrænsede områder og under iagttagelse af normale søvejsregler. Slæbesugningsudstyret (sugerøret) sidder påmonteret i direkte tilknytning til indvindingsfartøjet og rummer ikke udstyr, der i udstrækning og placering under havoverfladen kan strække sig langt fra det tilknyttede fartøj.

Da risiko for oliespild primært er relateret til risiko for kollisioner med slæbesugningsfartøjerne, behandles dette aspekt i forbindelse med en vurdering af sejladsen i området. Et større spild af diesellole fra et indvindingsfartøj kan opstå som følge af kollision med et andet fartøj eller ved havari under sandfodringen. Et større oliespild vil primært være en trussel for havfugle og i mindre grad havpattedyr. Yderligere er der risiko for at

nærtliggende strande bliver forurenede. Sandsynligheden for oliespild er dog generelt meget lille.

De lokale fiskeriforeninger bør orienteres på forhånd, inden der sandsuges i ansøgningsområdet. Sejlads kan foregå under iagttagelse af normale søvejsregler i indvindingsperioden, dog skal man være opmærksom på, at sandsugere går med nedsat hastighed og har nedsat manøvredygtighed. Samlet vurderes det, at risikoen for en væsentlig kollision og efterfølgende oliespild i forbindelse med indvinding som værende meget lille.

I forbindelse med indvinding i nærliggende råstofområder beliggende i Nordsøen, hvor der har fundet råstofindvinding sted gennem mange år, er der ikke kendte problemer med påsejlinger eller andre navigationsproblemer. Indvindingsaktivitet i nærområdet er således ikke et nyt fænomen, men en allerede integreret del af de for skibstrafikkens opmærksomhedskrævende forhold. I den forbindelse skal det også påpeges, at indvindingsaktiviteten i ansøgningsområdet ikke giver ophav til dybdeforringelser i forhold til skibsnavigation.

På baggrund af ovenstående vurderes indvindingsaktiviteten og den øgede skibstrafik i området ikke i nævneværdig grad og kun i lokalt omfang at besværliggøre eller forringe navigationsforholdene for fiskefartøjer og anden skibstrafik. Der skønnes fortsat at være rigeligt manøvrerum i ansøgningsområdet uden forøget påsejlingsrisiko. Risikoen for oliespild, som følge af kollision med indvindingsfartøjer, vurderes derfor at være minimal. Arealet af ansøgningsområdet er lille relativt i forhold til det øvrige manøvrerum, der forekommer i Nordsøen, hvor skibene kan følge mange andre trafikkorridorer, som ikke gennemskærer ansøgningsområdet (jf. korridorerne på Figur 9-29). Endvidere er sejladsforholdene fuldt reversible efter endt indvinding. Overordnet vurderes det, at den øgede skibstrafik som følge af indvindingsaktiviteterne vil påvirke sejladsforholdene i lav til middel grad i en kortvarig periode og vurderes derfor samlet set som *mindre negativ* i ansøgningsområdet og *ubetydelig* i påvirkningszonen og havområdet udenfor.

9.9.4 Sammenfattende vurdering

Indvindingens betydning for sejladsforhold i ansøgningsområdet er angivet i Tabel 9-13. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.

Tabel 9-14. Potentielle påvirkninger af sejlads ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.

Tema: Sejladsforhold				
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)				
Påvirkning	Omfang	Grad	Varighed (Reversibilitet)	Overordnet betydning
Tilstedeværelse af fartøjer	Lokal	Lav-Middel	Kort	Mindre

9.10 Ammunition

9.10.1 Metode

Det følgende beskriver de eksisterende forhold i ansøgningsområdet og det omkringliggende havområde på baggrund af generel information om ammunition på den danske havbund indhentet fra forskellige miljøkonsekvensrapporter i forbindelse med større infrastrukturprojekter til havs.

Ammunition dækker over ikke-eksploderede bomber, søminer og lignende – samlet betegnet UXO (Unexploded Ordnance). Der er ikke foretaget en egentlig UXO-undersøgelse for ansøgningsområdet. De potentielle effekter på miljøet, som følge af UXO-eksplosioner på havbunden, er derfor ikke detaljeret behandlet i nærværende miljøkonsekvensrapport.

9.10.2 Eksisterende forhold

Gennem 1. og 2. Verdenskrig blev der lagt ca. 42.000 havbundsminer ud i de indre danske farvande. Størstedelen af dem er lokaliseret og detoneret under kontrollerede forhold, men en tilbageværende del ligger stadig på havbunden og udgør en trussel mod arbejder på havbunden (NIRAS, 2012).

I forbindelse med myndighedshøring for anmeldelse af efterforskningen i området har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse følgende bemærkning:

Såfremt der i forbindelse med VIBROCORE borer og de øvrige undersøgelser inden for det potentielle indvindingsområde ved Lodbjerg, bliver identificeret/forekommer fund af ammunition eller genstande, der kan være farlige (UXO), skal arbejdet straks indstilles og der tages kontakt til Forsvarets Operationscenter, jf. BEK 1351 af 29. november 2013 § 14, om sejladsikkerhed ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske farvande.

Foruden ovenstående forhold, skal der gøres opmærksom på, at de udstedte tilladelser, samt kontaktoplysninger til det eller de skibe der skal udføre arbejdet, skal være tilgængeliggjort for Forsvarets Operationscenter via den myndighed, der udsteder tilladelsen. Såfremt der er opdateringer i kontaktoplysningerne, kan disse fremsendes direkte til Forsvarets Operationscenter.

På baggrund af indsamlede geofysiske og biologiske data er der ikke bekræftet tilstedeværelse af miner eller andre sprængstofholdige genstande inden for ansøgningsområdet. Baseret på sidescan-data er der ikke identificeret objekter, som tyder på forekomst af UXO eller andre sprængstofholdige genstande. Grundet den naturlige sedimentdynamik i området kan potentiel ammunition i ansøgningsområdet være helt eller delvist begravet i sedimentet.

9.10.3 Miljøpåvirkninger

Ammunition, herunder ikke-eksploderet ammunition (UXO), i form af gamle miner eller andre sprængstofholdige genstande kan potentielt forekomme indlejret i ressourcen, og derfor udgøre en risiko ved indvinding.

Det vurderes, at ammunition generelt ikke har en negativ påvirkning på miljøet, men er relevant i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med arbejde til havs. Såfremt, at der under indvindingen stødes på UXO vil Forsvarets operationscenter blive kontaktet og retningslinjerne i den britiske undersøgelse *"Dealing with munitions in marine sediments"* (Mineral Products Association (MPA) et al., 2010) vil blive fulgt.

Det vurderes på dette grundlag, at indvindingen vil medføre en *ubetydelig* negativ risiko i forhold til sikkerheden for mandskab og skib.

9.10.4 Sammenfattende vurdering

Indvindingens betydning for ammunition i ansøgningsområdet er angivet i Tabel 9-15. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.

Tabel 9-15. Potentielle påvirkninger af ammunition ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.

Tema: Ammunition				
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)				
Påvirkning	Omfang	Grad	Varighed (Reversibilitet)	Overordnet betydning
Risiko arbejdsmiljø	Lokal	Lav	Kort	Ubetydelig


9.11 Øvrige erhvervsinteresser

9.11.1 Metode

I det følgende beskrives de eksisterende forhold vedrørende øvrige erhvervsinteresser i ansøgningsområdet og i de umiddelbare omgivelser hertil. Beskrivelsen af de eksisterende forhold i området er gennemført på baggrund af materiale og oplysninger fra f.eks. Miljøstyrelsen (MiljøGis, 2021), 4C Offshore (4Coffshore, 2021) og Søfartsstyrelsen (Søfartsstyrelsen, 2017)

9.11.2 Eksisterende forhold

Øvrige erhvervsinteresser i det ansøgte indvindingsområde og i de umiddelbare omgivelser vurderes at være råstofindvinding, klapning, erhvervsfiskeri, kommerciel skibstrafik og havneaktiviteter. Disse interesser er omtalt under henholdsvis afsnit 9.3 om "Fisk og erhvervsfiskeri", afsnit 9.9 om "Sejladsforhold" og afsnit 9.12 om "Kumulative effekter". Øvrige potentielle erhvervsinteresser vurderes at omfatte udviklingsområder for offshore vindmølleparker.



Figur 9-30. Kort over øvrige erhvervsinteresser i området omkring ansøgningsområdet, Lodbjerg B.

Råstofindvinding

Der findes forskellige typer råstofindvindingsområder omkring ansøgningsområdet. De nærmeste er nævnt nedenfor.

Byggherreområde 562-OA, 562-PA og 562-AE er Kystdirektoratets egne byggherreområder og hører således ikke under andre erhvervsinteresser.

Fællesområder:

Fællesområde Jyske Rev C, 562-NA

I Fællesområdet er der tilladelse til indvinding af 4.000.000 m³ med en årlig mængde på 1.000.000 m³ gældende indtil d.1. december 2025. Den samlede restmængde siden 2. kvartal 2020 er på 4.000.000 m³ (MiljøGis, 2021). Fællesområdet er beliggende ca. 4 km vest for ansøgningsområdet.

Fællesområde Jyske Rev D, 562-MB

I Fællesområdet er der tilladelse til indvinding af 3.200.000 m³ med en årlig mængde på 800.000 m³ gældende indtil d.1. december 2025. Den samlede restmængde siden 2. kvartal 2020 er på 3.200.000 m³ (MiljøGis, 2021). Fællesområdet er beliggende ca. 25 km vest for ansøgningsområdet.

Auktionsområde Jyske Rev L, 562-NB

I auktionstilladelsen for Jyske Rev L er der tilladelse til indvinding på i alt 5.000.000 m³, af NCC Roads A/S med udløb i februar 2031 (MiljøGis, 2021). Auktionsområdet er beliggende 21 km sydvest for ansøgningsområdet.

Klappladser

Klapplads nr. K_161_02, Thyborøn Havn

I området er der tilladelse til klapning af 328.000 m³ ler og siltholdigt uddybningsmateriale fra Thyborøn Kanal. Tilladelsen er gældende i 5 år fra 26. april 2021 til 26. april 2026. (MiljøGis, 2021). Klappladsen er beliggende ca. 22 km SØ for ansøgningsområdet.

Klapplads nr. 804, K_161_01 – Hanstholm

I området er der tilladelse til klapning af 700.000 m³ oprensningsmateriale fra indsejlingen og forhavnen til Hanstholm Havn. Seneste tilladelse var gældende i 5 år fra 1. marts 2008 til 1. marts 2013 (MiljøGis, 2021) dvs. der foreligger ikke en gældende tilladelse til klapning i området. Klappladsen er beliggende ca. 30 km fra ansøgningsområdet.

Klapplads nr. 838, K_161_03 – Hanstholm ny klapplads

I området er der tilladelse til klapning af 290.000 m³ uddybningsmateriale i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn. Tilladelsen er gældende i 5 år fra 20. december 2019 til 20. december 2024 (MiljøGis, 2021). Klappladsen er beliggende ca. 32 km fra ansøgningsområdet.

Erhvervshavne

Der er to erhvervshavne i nærheden - Thyborøn Havn og Hanstholm Havn.

Thyborøn Havn bruges til fiskeri, maritim service og kommerciel transport. Havnen er en af Danmarks største inden for fiskeri, godshåndtering, maritim service samt offshore aktiviteter (Thyborøn Havn, 2021). Thyborøn Havn ligger ca. 32 km fra ansøgningsområdet.

Hanstholm Havn bruges til fiskeri, akvakultur, lodsning af havvindmølle dele samt transport og maritim service. Havnen er ligeledes en af Danmarks største fiskerihavne, og den huser Danmarks største fiskeauktion (Port of Hanstholm, 2021). Hanstholm havn ligger ca. 30 km fra ansøgningsområdet.

Development zoner for havmølleparker

Syd for ansøgningsområdet ligger den planlagte havmøllepark *Vesterhav Nord*. (4Coffshore, 2021), (Vattenfall, 2021). Vesterhav Nord bliver på 180 MW og kommer til at bestå af 21 stk. 8,4 MW vindmøller på 193 m. Området ligger med en afstand på 5,5 til 8,4 km til kysten og dækker et område på 39,6 km². Konstruktionsstart forventes medio 2022. Vesterhav Nord ligger ca. 31 km syd for ansøgningsområdet.

Udover ovenstående er der ikke kendskab til øvrige erhvervsinteresser eller andre arealanvendelser inden for ansøgningsområdet, hverken eksisterende eller planlagte, som vurderes potentielt at kunne blive påvirket som følge af indvindingsaktiviteterne i ansøgningsområdet.

9.11.3 Miljøpåvirkninger

Øvrige erhvervsinteresser kan påvirkes af indvindingen, hvis denne generer, forstyrrer eller hindrer forekomsten og driften af de øvrige erhvervsinteresser ud for den jyske vestkyst.

Potentiel negativ påvirkning på andre erhvervsinteresser kan ske som følge af:

- Arealinddragelse
- Støj og forstyrrelse
- Tilstedeværelse af fartøjer

Nærmeste øvrige erhvervsinteresse er fællesområde 562-NA *Jyske Rev C*, der ligger ca. 4 km fra området, mens de øvrige erhvervsinteresser, herunder klappladser, erhvervshavne m.fl. ligger over 19 km fra ansøgningsområdet. Indvindingen i ansøgningsområdet vurderes på baggrund af den store afstand ikke at være til gene for eller hindring for de øvrige erhvervsaktiviteter langs den jyske vestkyst og farvandet ud for. Indvindingsaktiviteten vurderes ligeledes ikke i nævneværdigt omfang at besværliggøre eller forringe navigationsforholdene for fiskefartøjer og anden skibstrafik i området og der skønnes fortsat at være rigeligt manøvrerum i ansøgningsområdet uden forøget påsejlingsrisiko. Risikoen for oliespild, som følge af kollision med indvindingsfartøjer, vurderes derfor at være minimal.

Den ansøgte indvinding medfører således ikke støj, forstyrrelse eller øget skibstrafik i en grad der vurderes at forhindre eller forstyrre de øvrige erhvervsinteresser og deres arealinteresser i området. Indvindingens overordnede påvirkningsgrad vurderes derfor til *ubetydelig* negativ for de øvrige erhvervsinteresser i området.

9.11.4 Sammenfattende vurdering

Indvindingens betydning for øvrige erhvervsinteresser indenfor ansøgningsområdet og i de umiddelbare omgivelser er angivet i Tabel 9-16. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.

Tabel 9-16 Potentielle påvirkninger af øvrige erhvervsinteresser ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.

Tema: Øvrige erhvervsinteresser				
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)				
Påvirkning	Omfang	Grad	Varighed (Reversibilitet)	Overordnet betydning
Arealinddragelse	Lokal	Ingen	Kort	Ubetydelig
Støj og forstyrrelse	Lokal	Ingen - lav	Kort	Ubetydelig
Tilstedeværelse af fartøjer	Lokal	Ingen - lav	Kort	Ubetydelig

9.12 Kumulative effekter

Kumulative effekter defineres som påvirkninger fra det aktuelle projekt set i sammenhæng med miljøpåvirkning fra andre projekter, anlæg eller vedtagne planer (realiserede eller ikke-realiserede). Formålet med at inddrage kumulative effekter er at få en helhedsvurdering set i forhold til områdets miljømæssige bæreevne.


Indvindingen vurderes potentielt at kunne have kumulative effekter i relation til følgende aktiviteter:

- Arealinddragelse/habitattab
- Sedimentspredning

Ansøgningsområdet er beliggende alene og omtrent ca. 4 km fra nærmeste indvindingsområde. Den solitære beliggenhed medfører, at der ikke er andre projekter, anlæg eller vedtagne planer i umiddelbar nærhed til ansøgningsområdet (Figur 9-31). Indenfor en radius af ca. 25 km forekommer flere indvindingsområder, en klapplads samt sandfodring, hvor potentielle kumulative effekter i relation til nærværende indvinding vurderes:

- Kystdirektoratets ansøgningsområde Lodbjerg A (nyt område)
- Råstofindvinding i fællesområde 562-NA Jyske Rev C og 562-MB Jyske Rev D (udløbsdato 01-12-2025)
- Råstofindvinding i bygherreområde 562-OA Agger (udløbsdato 22-05-2024)
- Aktionstilladelse 562-NB Jyske rev L (udløbsdato 25-02-2031)
- Klapplads K_161_02, - Thyborøn Havn
- Kystdirektoratets sandfodring på fællesstrækning Lodbjerg – Nyminddegab (2020-2024)
- Vesterhav Nord

Figur 9-31 viser de omkringliggende projekter og planer. Se også øvrige erhvervsmæssige interesser under afsnit 9.11.



Figur 9-31. Ansøgningsområdet og andre projekter, som potentielt kan have kumulative effekter i forhold til indvindingen

9.12.1 Arealinddragelse

Arealinddragelse i form af sandindvinding på havbunden i ansøgningsområde Lodbjerg B, Kystdirektoratets andet ansøgningsområde Lodbjerg A, de øvrige nærliggende råstofområder, klappladser, Vesterhav Nord eller overdækning af havbunden på 0-8 meters dybde fra sandfodringen af kysten på Lodberg - Nymindegab fællesstrækningen (se Figur 9-31), kan potentielt forekomme samtidigt og dermed potentielt medføre kumulative effekter i forhold til arealinddragelse af påvirket havbundsareal.

Indvindingen i ansøgningsområde Lodbjerg B kan potentielt påvirke 7-28% af ansøgningsområdet om året og 83% over 10 år, mens der i ansøgningsområde Lodbjerg A, de øvrige råstofområder og på klappladserne kun påvirkes en mindre del om året afhængigt af råstofmængderne, der hentes i områderne og mængderne, der klappes. Sandfodringen langs Lodbjerg – Nymindegab fællesstrækningen påvirker stranden og havbunden tæt på kysten indenfor 0-8 meters dybde (se Figur 9-31). Det er således kun en lille del af sandbunden og sandbundssamfundet, der påvirkes pr år, som følge af råstofindvinding, klappning og sandfodring. Det er generelt det samme bundfaunasamfund, der spredes op langs Vestkysten (WSP/Rambøll, 2021; Rambøll, 2020; Rambøll, 2020). Bundfaunaen har et stort genetableringspotentiale fra de omkringliggende uberørte bundfaunapopulationer og via larvespredningen i Nordsøen og med strømmen langs Vestkysten (Göke et al, 2019). Bundfaunaen i området forventes at have en genetableringstid på 2-5 år (Rambøll, 2020).

Hvert af de beskrevne projekter påvirker en ubetydelig del af havbundsarealet langs Vestkysten og for Nordsøen generelt og vil således hverken alene eller kumulativt medføre en væsentlig kumulativ påvirkning på havbunden og de tilknyttede samfund af bundfauna og – flora i Nordsøen.

9.12.2 Sedimentspredning

Råstofindvinding i ansøgningsområde Lodbjerg B, Kystdirektoratets andet ansøgningsområde Lodbjerg A, de øvrige nærliggende råstofområder, klappladser, Vesterhav Nord og fra sandfodringen af kysten på Lodberg - Nymindegab fællesstrækningen (se Figur 9-31), vil medføre sedimentspild, som potentielt kan forekomme samtidigt og dermed potentielt medføre kumulative effekter i forhold til sedimentspredning på dyr og planter i området.

Sedimentspredningen fra råstofindvinding påvirker fortrinsvis inden for den 500 meter brede påvirkningszone, som omkranser ansøgningsområdet og er vurderet til at have en ubetydelig påvirkning på samtlige vurderede parametre herunder de biologiske parametre såsom bundflora og -fauna, fisk, fugle og havpattedyr. Det samme er tilfældet for sedimentspredning fra de nærliggende fællesområder, som ligeledes fortrinsvis vil forekomme indenfor påvirkningszonen omkring indvindingsområdet. Det samme gælder for klappning, hvor sedimentspredningen også forekommer lokalt omkring klapområdet.

Spredningsberegningerne for sandfodring på Lodbjerg – Nymindegab strækningen viser, at sediment fra sandfodring kan spredes over en estimeret afstand på op til 2 kilometer ud fra kysten ved Agger Tange til Harboøre Tange, alt efter fodringsmetode. Det suspendede sediment vil være udfældet fra vandsøjlen i løbet af 24 timer efter gennemførelsen af en kampagne, hvorfor koncentrationen af det suspendede sediment kun forøges i den periode,

hvor fodringen foregår. Sedimentfanen med en koncentration på 10 mg/l vil have en maksimal udbredelse parallelt med kysten på ca. 35 km (Rambøll, 2020a).

Ansøgningsområdet ligger ca. 15 km fra kysten på 22-37 m dybde og sandfodringsområdet indenfor 0-8 meters dybde langs kysten ved Lodbjerg-Nymindesø, hvorfor der ikke vil forekomme overlap mellem sedimentfaner fra sandfodringen og råstofindvindingen. Der vil således kun være en mindre del af Nordkysten omkring Lodbjerg A området, som vil blive påvirket af sedimentspredning. Bundfaunaen og flora i området er almindeligt forekommende i de danske farvande (Køie & Kristiansen, 2014) og er generelt godt tilpasset til et dynamisk miljø med stor variation i suspenderet sediment og sedimentoverlejring. Ligesom fisk, fugle og havpattedyr vil kunne fortrække til andre områder i den kortvarige periode sedimentspredningen forekommer i området. Graden af påvirkningen vurderes derfor til lav. Det vurderes derfor, at der ikke vil forekomme væsentlige kumulative effekter i forhold til sedimentspredning fra ansøgningsområde Lodbjerg B og de nærliggende råstofområder, klapområder og sandfodring på kysten på dyr og planter i området.

9.12.3 Fisk

Kumulative effekter fra nærliggende råstofområder, sandfodringsprojekter, havmølleprojekter mm. kan potentielt påvirke fisk i området. Nærmeste andre projekter, som potentielt kan have kumulative effekter i forhold til indvindingen, er de nærliggende råstofområder, klappladser og Kystdirektoratets sandfodring på fællesstrækning Lodbjerg - Nymindesø (se Figur 9-31).

Nærliggende projekter vil ligesom ansøgte indvinding resultere i sedimentspild og midlertidigt øget sediment i vandsøjlen, samt støjgener. Pga. afstanden mellem områderne vil, der dog ikke forekomme overlap af sedimentfaner og støjpåvirkninger, hvorfor følsomme fiskearter forsat vil kunne fortrække til nærliggende lignende områder, imens indvindingen pågår. Sedimentspild og støjpåvirkning vurderes derfor hverken alene eller kumulativt i forhold til de andre projekter i området at kunne medføre væsentlige effekter for fiskearter og bestande i området omkring ansøgningsområdet og i Nordsøen generelt.

Indvindingsaktiviteter vil medføre en arealinddragelse, som kan forstyrre fisk ved at indskrænke mulige gyde- og opvækstområder samt føre til en reduktion af habitat- og fødegrundlag. Det påvirkede område i ansøgningsområdet udgør en ubetydelig del af det samlede fourageringsområde, samt gyde- og opvækstområde for fisk langs den Jyske Vestkyst og i Nordsøen generelt. Substrattype og dybder er desuden almindelige langs Vestkysten udenfor ansøgningsområdet. Samlet set påvirker indvindingen i ansøgningsområdet, de nærliggende råstofområder, klappladser, Vesterhav Nord havmøllepark og Kystdirektoratets sandfodrings på Lodbjerg - Nymindesø fællesstrækningen en mindre del af havbunden langs vestkysten i forhold til fiskenes samlede habitatområde, gyde- og opvækstområder. Ansøgte indvinding vurderes derfor hverken alene eller kumulativt med andre projekter og aktiviteter i området at give anledning til væsentlige påvirkninger på havbunden, gyde- og opvækstområder og fødegrundlaget for fiskearter langs Vestkysten og i Nordsøen generelt.

9.12.4 Fugle

Kumulative effekter fra indvindingsprojekter m.fl. kan potentielt påvirke fugle i området. Der har allerede i en længere årrække været indvundet råstoffer i den nordlige del af Nordsøen. Herudover forekommer der også påvirkninger fra jagt, sejlads, fiskeri og mulige effekter fra klimaforandringer, hvor sidstnævnte dog vurderes hovedsageligt at påvirke fugle, der yngler på lokaliteter i de arktiske og subarktiske områder.

Planlagte og eksisterende havvindmølleprojekter i danske og internationale farvande kan også spille en rolle for vandfuglenes fordeling og samlede habitatudnyttelse i Nordsøen.

Enhver, der har dansk jagttegn og fast bopæl i Danmark har ret til at drive ikke-erhvervsmæssig jagt på det danske fiskeriterritorium. Omfanget af jagten ved ansøgningsområdet kendes ikke, men afstanden til kysten taget i betragtning, er nævneværdig jagt usandsynlig i ansøgningsområdet.

Der kan også forekomme indvinding i nærliggende råstofområder, herunder Lodbjerg A, samtidig med indvindingen i ansøgningsområdet. Pga. af afstanden mellem de to områder vil der dog ikke forekomme overlap af sedimentfaner eller støjpåvirkning.

Den ansøgte indvinding finder sted i et område, der allerede i dag er præget af fiskeri og sejlads, hvilket dels kan medvirke til at forstyrre fugle, der raster i området, dels kan påvirke havbunden og dermed de føderesurser, der udnyttes af de rastende vandfugle.

På grund af dybdeforholdene og de ret få føderesurser vil indvindingsaktiviteterne dog kun i helt ubetydeligt omfang bidrage til den samlede påvirkning af havbunden set i forhold til de store områder, hvor der i dag sker en markant påvirkning som følge af trawlfiskeri og sejlads.

Den ansøgte indvinding vurderes således at resultere i så små, kortvarige og lokale forstyrrelser og påvirkninger, at indvindingen hverken alene eller i kumulation med disse forhold vil give anledning til væsentlige negative påvirkninger af fuglebestandene.

9.12.5 Havpattedyr

Kumulative effekter fra nærliggende råstofområder, sandfodringsprojekter, klapning, havmølleprojekter mm. kan potentielt påvirke havpattedyr i området. Der har allerede i en længere årrække været indvundet råstoffer i en række råstofområder, blevet klappet og været foretaget sandfodring på kysten på fællesstrækning Lodbjerg-Nymindegab. Herudover forekommer der også påvirkninger fra sejlads, fiskeri og havmølleprojekter mm. i Nordsøen.

Det påvirkede område indenfor ansøgningsområdet er meget lille i forhold til udbredelsen af lignende havbund/fødesøgningsområder, som er tilgængeligt for marsvin og sæler langs den jyske Vestkyst og i Nordsøen generelt. På grund af dybdeforholdene og de ret få føderessurser vil indvindingsaktiviteterne kun i helt ubetydeligt omfang bidrage til den samlede påvirkning af havbunden og fødeudbuddet i nærområdet og i Nordsøen generelt. Indvindingen vurderes derfor hverken alene eller kumulativt med andre projekter og aktiviteter i området at være årsag til væsentlige kumulative effekter i forhold til havbundspåvirkning og dermed påvirkning af fødeudbuddet for havpattedyr i Nordsøen generelt.

Marsvin og sæler er ikke specielt følsomme over for sedimentspild, idet de kan søge føde med deres andre sanser (herunder ekkolokalisering og knurhår). Der kan forekomme sedimentspil i forbindelse med indvinding i nærliggende råstofområder og i forbindelse med sandfodring på kysten. Pga. afstanden mellem områderne vil, der dog ikke forekomme overlap af sedimentfaner eller støjpåvirkning og der vil være upåvirkede, lignende områder i nærområdet, som dyrene kan søge til, hvis de bliver forstyrret af sedimentspild. Sedimentspild og spredning vurderes derfor hverken alene eller kumulativt i forhold til de andre projekter i området at kunne medføre væsentlige kumulative effekter for havpattedyr.

Den ansøgte indvinding finder sted i et område, der allerede i dag er præget af en del fiskeri og sejlads, hvilket kan medvirke til forstyrrelse af havpattedyr, der søger føde i - eller passerer området. Havpattedyr forekommer dog i højtæthedsområder, hvor der er langt mere skibstrafik fx i Storebælt. Ansøgningsområdet ligger minimum 21 km fra kanten af nærmeste højtæthedsområde ligesom området ikke er vigtigt for sæler. Støj og forstyrrelse fra indvindingen vurderes derfor hverken alene eller sammen med de andre aktiviteter i området at medføre væsentlig kumulative effekter for havpattedyrene i området.

9.12.6 Havstrategi

Indvindingen i ansøgningsområdet medfører ikke væsentlig påvirkning på nogen af Havstrategiens 11 deskriptorer. Påvirkningerne er lokale i ansøgningsområdet og påvirker ikke deskriptorerne i hverken Nordsøen eller Skagerrak. Det vurderes derfor samlet set, at påvirkningerne fra indvindingen er så lokale og ubetydelige, at de ikke alene eller kumulativt med andre projekter og påvirkninger i havområdet kan bidrage til væsentlige negative, kumulative effekter hverken samlet set eller for hver enkelt af de 11 deskriptorer.

Indvindingen vil ligeledes ikke forringe miljømålenes tilstand under hver deskriptor eller være til hinder for opnåelse af god miljøtilstand for disse.

Det vurderes derfor samlet set, at indvindingen ikke alene eller kumulativt med andre projekter vil påvirke Danmarks Havstrategis deskriptorer og disses miljømål. Ligesom de beskyttede havstrategiområder ikke vil blive påvirket af den ansøgte indvinding. Indvindingen påvirker således ikke Danmarks Havstrategi.

9.12.7 Sammenfatning

Baseret på ovenstående vurdering, det meget begrænsede areal der påvirkes pr år (1,28 - 5,13 km² pr år) og ansøgningsområdets afstand til øvrige projekter og aktiviteter, vurderes indvindingen ikke alene eller i kumulation med øvrige aktiviteter at medføre væsentlige kumulative effekter.

10. Natura 2000-væsentlighedsvurdering

10.1 Lovgrundlag

Natura 2000-områderne er udpeget efter henholdsvis Habitatdirektivet (92/43/EF) og Fuglebeskyttelsesdirektivet (2009/147/EF, tidligere 79/409/EF). Natura 2000-områderne består således af fuglebeskyttelsesområder og/eller habitatområder. Formålet med Natura 2000-netværket er at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000-områder.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne opdateres jævnligt for at leve op til direktiverne og miljømålsloven, og Danmark er forpligtiget til at sætte arter og naturtyper på et områdes udpegningsgrundlag, hvis der er tale om væsentlige forekomster.

Nærværende væsentlighedsvurderingen er foretaget på baggrund af udpegningsgrundlaget anført i den nyeste generation af basisanalyser, der blev offentliggjort d. 11. juni 2020.

Da Miljøstyrelsens bearbejdning af høringssvarene endnu ikke er formelt afsluttet i juni 2021, er det i væsentlighedsvurderingen valgt at behandle både de udpegningsarter og -naturtyper, der forventes tilføjet og dem, der forventes fjernet.

Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne administreres i Danmark bl.a. gennem Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 "*om udpegningsgrundlaget og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter*" (Habitatbekendtgørelsen) og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets "*Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet*" (BEK nr. 1476 af 13/12/2010).

10.2 Væsentlighedsvurderingen

For hovedprincippet af administrationen af Natura 2000-områderne gælder, at planer og projekter skal underkastes en foreløbig vurdering, (også kaldet screening eller væsentlighedsvurdering), med henblik på at vurdere, om de kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, herunder om bevaringsstatus for de arter og/eller naturtyper, som området er udpeget for at beskytte (udpegningsgrundlaget), vil blive påvirket væsentligt.

Planen eller projektet skal både vurderes i sig selv og i kumulation med andre planer og projekter, herunder fx tidligere gennemførte projekter såvel som andre planlagte projekter. Det er således den samlede påvirkning af et Natura 2000-område, der skal vurderes.

Hvis den foreløbige vurdering konkluderer, at det ikke kan afvises, at en plan eller et projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der gennemføres en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering, der skal vise, om planen eller projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde. Denne vurdering skal omfatte alle aspekter af projektet, som kan påvirke det pågældende område, og vurderingen skal udføres på baggrund af den bedste videnskabelige viden på området.

Hvad enten der er tale om en væsentlighedsvurdering eller en egentlig konsekvensvurdering, er det Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, der er genstand for vurderingen.

Forsigtighedsprincippet spiller en central rolle i administrationen af Natura 2000-områder. Princippet indebærer bl.a., at hvis der er videnskabelig tvivl om skadevirkninger, dvs. at skade ikke kan udelukkes, skal denne tvivl komme Natura 2000-området til gode. Hensynet til de beskyttede områder skal således vægtes højest.

Vurderingen af, om en plan eller et projekt påvirker et Natura 2000-område væsentligt retter sig mod påvirkningen af de karakteristika og miljømæssige forhold, der kendetegner det

konkrete Natura 2000-område, og herunder særligt de (konkret) fastsatte bevaringsmålsætninger for de naturtyper og arter, der er områdets udpegningsgrundlag.

Bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-områderne omkring Lodbjerg B er, som for alle Natura 2000-områder, at opretholde en "gunstig bevaringsstatus" for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte (udpegningsgrundlaget).

Præcist hvad en gunstig bevaringsstatus indebærer, er forskelligt for de enkelte arter og naturtyper, som beskrevet i f.eks. (Søgaard B. S.-P.-N., 2005). For arternes vedkommende skal bestandene være stabile eller i fremgang, og arealerne af de levesteder, som arterne er afhængige af, skal enten være uændrede eller stigende i forhold til tidspunktet for områdets udpegning. For naturtyperne er der tilsvarende typisk tale om, at naturtilstanden skal bevares og forbedres, og arealet med den pågældende naturtype skal være stabilt eller stigende for at opretholde en gunstig bevaringsstatus.

Det fremgår desuden af vejledningen til Habitatbekendtgørelsen, at der er tale om en væsentlig påvirkning af et Natura 2000-område, hvis en plan eller et projekt risikerer at skade bevaringsmålsætningen for det pågældende Natura 2000-område.

10.3 Bilag IV-arter

Af Habitatdirektivet og Habitatbekendtgørelsen fremgår det desuden, at medlemslandene skal indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets Artikel 12 og Bilag IV, uanset om disse forekommer inden for eller uden for et Natura 2000-område.

I forhold til nærværende projekt er havpattedyret marsvin den eneste relevante bilag IV-art.

For dyrearter, omfattet af bilag IV, gælder, at de ikke må fanges, dræbes, forstyrres forsætligt eller få beskadiget eller ødelagt deres yngle- eller rasteområder. Direktivbestemmelsen indebærer bl.a., at hvor der er en regelmæssig forekomst af Bilag IV-arter, kan der ikke umiddelbart gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de pågældende arters yngle- og rasteområder. Yngleområder er områder, som er nødvendige for dyrenes parring eller kurtisering, redebygning, hulebygning, fødsel, æglægning eller opvækst af unger og unger. Rasteområder defineres som områder, som er vigtige for at sikre overlevelsen af enkelte dyr eller bestande, når de er i hvile.

Ifølge vejledningen til Habitatbekendtgørelsen gælder beskyttelsen ikke for områder, hvor dyrene søger føde, med mindre de samtidig bruges som yngle- eller rasteområder.

Når man skal vurdere, om et projekt kan påvirke en Bilag IV-arts yngle- eller rasteområde er det nødvendigt at se på, hvordan projektet påvirker stedets samlede "økologiske funktionalitet" i forhold til artens krav. Med økologisk funktionalitet menes de samlede vilkår, som et yngle- og rasteområde kan tilbyde bestanden af arten.

10.4 Metode

Oplysninger om arter og kortlagte naturtyper m.m. i de omkringliggende Natura 2000-områder er indsamlet fra eksisterende kilder, herunder Natura 2000-basisanalyserne for de pågældende områder.

Oplysninger om målsætninger, udpegningsgrundlag m.m. for Natura 2000-områderne er indhentet fra Natura 2000-basisanalyserne, Natura 2000-planerne og forslag til nye udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder for de relevante områder (Miljøstyrelsen, 2019).

Oplysninger om marsvin i de omkringliggende Natura 2000-områder er indhentet fra den seneste statusopgørelse om artens forekomst i de danske habitatområder (Sveegaard et al., 2018) og i de danske farvande generelt (Teilmann et al., 2008).

Desuden inddrages erfaringer fra andre projekter vedrørende havpattedyrs reaktioner på forstyrrelser fra f.eks. sejlads og sedimentspild m.m.

Vurderingen af påvirkningens væsentlighed er foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne i den eksisterende vejledning til Habitatbekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2020).

Mht. til vurdering af mulige påvirkninger af Bilag IV-arterne (marsvin) er anvendt princippet om økologisk funktionalitet, der baserer sig på en bredere økologisk forståelse for arten og dens levevis uden at tilsidesætte beskyttelseshensynene. Udgangspunkter er, at især for mere udbredte bilag IV-arter kan yngle- eller rasteområder bestå af flere lokaliteter, der tjener som levesteder for den samme bestand.

10.5 Eksisterende forhold

I det følgende beskrives eksisterende forhold for de omkringliggende Natura 2000-områder, deres eksisterende og forventede udpegningsgrundlag, samt forekomsten af Bilag IV-arter.

10.5.1 Natura 2000-områder omkring ansøgningsområdet


De omkringliggende Natura 2000-områder indenfor ca. 40 km afstand fra ansøgningsområdet er vist på Figur 10-1.

Råstofindvindingen finder sted ca. 15 km fra land og påvirker derfor potentielt udelukkende arter eller naturtyper, der forekommer i det marine område. I det følgende beskrives derfor udelukkende de marine udpegningsgrundlag i de nærliggende habitatområder.

De nærmeste Natura 2000-områder er N219 *Sandbanker ud for Thyborøn* og Natura 2000-område N250 *Gule Rev*, der ligger hhv. ca. 21 km og 22 km fra ansøgningsområdet. Derudover ligger Natura 2000-området N247 *Thyborøn Stenvolde* ca. 29 km derfra og N28 *Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø* ca. 24 km væk.

Natura 2000-område N28 omfatter Fuglebeskyttelsesområderne F23, F27, F28, og F39 i N28. Fuglearter på udpegningsgrundlaget i disse fuglebeskyttelsesområder er vist i Tabel 10-

2. Der er derudover pt. et nyt fuglebeskyttelsesområde i høring F126 i Skagerrak som ligger ca. 36 km fra ansøgningsområdet (<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64971>).



Figur 10-1 Beliggenhed og afgrænsning af Natura 2000-områder (N), habitatområder (H) og fuglebeskyttelsesområder (F) omkring ansøgningsområdet.

Tabel 10-1. Fuldt og delvist marine Natura 2000-områder og habitatområders afstand til ansøgningsområde Lodbjerg A, samt udpegningsgrundlaget for hvert habitatområde. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områderne er baseret på opdatering af udpegningsgrundlag 2019 (Miljøstyrelsen, 2019). De udpegede arter og naturtyper omfatter både det eksisterende og forventede nye udpegningsgrundlag (markeret med NY). * angiver det er en prioriteret naturtype.

Natura 2000-område	Habitatområde	Afstand	Udpegningsgrundlag
N219 Sandbanker ud for Thyborøn	H253	ca. 21 km	Naturtyper: Sandbanke (1110) Rev (1170) (NY) Arter: Marsvin (1351)
N250 Gule Rev	H259	ca. 22 km	Naturtyper: Rev (1170) Arter: Marsvin (1351)
N247 Thyborøn Stenvolde	H256	ca. 29 km	Naturtyper: Rev (1170)
N28 Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø	H28	ca. 24 km	Naturtyper: Sandbanke (1110) Vadeflade (1140) Lagune* (1150) Bugt (1160) Rev (1170) Arter: Stavsild (1103) Gråsæl (1364) (NY) Spættet sæl (1365) Fugle (se Tabel 10-2): F23: 21 arter F27: 8 arter F28: 2 arter F39: 11 arter

Tabel 10-2 Fugle på udpegningsgrundlaget i Fuglebeskyttelsesområderne F23, F27, F28, og F39 i N28 og det nye fuglebeskyttelsesområde F126. Der er angivet om det er ynglefugle (Y) eller trækfugle (T). Både det eksisterende og det evt. kommende udpegningsgrundlag (markeret med NY) er medtaget, jf. den igangværende opdatering af udpegningsgrundlagene for de danske fuglebeskyttelsesområder. Arter, der potentielt kan fouragere på åbent hav i ansøgningsområdet er markeret med **rødt**.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 23		
Fugle	Rørdrum (Y)	Skestork (T) (NY)
	Pibesvane (T)	Grågåas (T) (NY)
	Lysbuget knortegås (T)	Spidsand (T)
	Pibeand (T)	Krikand (T)
	Taffeland (T) (NY)	Rørhøg (Y)
	Klyde (TY)	Hjejle (TY)
	Almindelig ryle (Y)	Brushane (Y)
	lille kobbersneppe (T)	
	Dværgterne (Y)	Splitterne (Y)
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)

	Rødrygget tornskade (Y) (NY)	Mosehornugle (Y)
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 27		
Fugle	Rørdrum (Y) (NY)	Kortnæbbet gås (T) (NY)
	Lysbuget knortegås (T)	Hvinand (T)
	Toppet skallesluger (T)	Klyde (Y)
	Hjejle (T)	Havterne (Y)
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 28		
Fugle	Toppet skallesluger (T)	Hvinand (T)
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 39		
Fugle	Kortnæbbet gås (T)	Bramgås (T)
	Lysbuget knortegås (T)	Klyde (TY)
	Hvidbrystet præstekrave (Y)	Almindelig ryle (Y)
	Brushane (Y)	Dværgterne (Y)
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y) (NY)
	Mosehornugle (Y)	
Udpegningsgrundlag for muligt nyt Fuglebeskyttelsesområde nr. 126		
Fugle	Mallemuk (T)	Storkjove (T)
	(Alk)	(Lomvie)
	(Sortand)	

10.5.1.1 Habitatområderne

Udpegningsgrundlagene i de omkringliggende habitatområder omfatter naturtyper og arter.

Naturtyper

Naturtyperne i de omkringliggende Natura 2000-områder ligger i en afstand af >20 km til ansøgningsområdet og omfatter Rev (1170), Bugt (1160) og Sandbanke (1110) (se Tabel 10-1).

Rev (1170)

Naturtypen "Rev" er generelt karakteriseret som områder på havbunden med hård bund, fx stenrev, ofte med en stor artsrigdom af dyr og planter. Naturtypen rev rummer også de såkaldte biogene rev, hvor den hårde bund er dannet af fx. blåmuslinger eller hestemuslinger (Miljøstyrelsen, 2020a).

Sandbanker (1110)

Sandbanker er karakteriseret ved at være dannet ved materialetransport langs kysterne fx i form af revler, der kan være ubevoksede eller evt. med ålegræs (Miljøstyrelsen, 2020c).

Bugt (1160)

Bugter og vige (1160) er lavvandede områder med begrænset fersk påvirkning, og udgør dermed størstedelen af fjordene i de indre farvande. Findes i H28, hvor der på naturtypen

findes en blød og siltet sandbund, som typisk er beliggende ved ikke-eksponerede kyster eller på dybere vand uden bølgeuro. Der forekommer også tomme skaller og enkelte spredte sten. I områderne med naturtypen findes en række hvirvelløse dyr, bl.a. søpunge, snegle, muslinger og søstjerner. Der er desuden fundet kutlinger samt muligvis fladfiskeyngel. Der er registreret spredte forekomster af ålegræs (Miljøstyrelsen, 2020e).

Arter

Der er fire arter på udpegningsgrundlaget i de nærliggende Natura 2000-områder (se Tabel 10-1). Stavsild (1103), Gråsæl (1364), Spættet sæl (1365) og Marsvin (1351). Marsvin er behandlet nedenfor under bilag IV-arter.

Stavsild

Stavsilden er en vandrefisk, der yngler i ferskvand og vokser op i havet. Der er ikke sikkert kendskab til, at arten nogensinde har ynglet i de danske vandløb. Herhjemme træffes den som en gæst fra landene syd for Danmark, hvor den gyder i de store mellemeuropæiske vandløb. Efter gydning vandrer den mod nord og træffes bl.a. langs de danske kyster. Stort set alle de registreringer, der sker stavsild herhjemme, gøres i havet, og kun ganske få individer er truffet i vandløb. Derfor betragtes den blot som en strejfer. Af samme grund har de danske vandløbs tilstand ingen direkte betydning for artens forekomst herhjemme. I Danmark er arten truffet i størst antal langs vestkysten, hvor arten sammen med andre fiskearter samler sig omkring havneanlæg fx ved sluserne i Hvide Sande og Thorsminde. Der er ikke foretaget overvågning af stavsild i områdets vandløb. Det er derfor ikke muligt at give en nærmere beskrivelse af artens bestand i området på nuværende tidspunkt (Miljøstyrelsen, 2020e).

Sæler

Eksisterende forhold for spættet sæl og gråsæl er beskrevet i afsnit 9.5 - Havpattedyr. For habitatområde H28 gælder specifikt:

Agger Tange er en af de nyeste lokaliteter for gråsæler i Danmark. De første individer blev talt i 2009 og bestanden er siden steget til lidt over 30 individer (Miljøstyrelsen, 2020e).

Spættet sæl findes fouragerende spredt over hele habitatområdets marine del. Der er registreret hvilekolonier ved den sydlige del af Agger Tange, på Munkholm Odde og på Rotholmene. Bestanden har varieret de sidste 10 år mellem 500-800 individer. Udviklingen i sælbestanden i Limfjorden er svær at tolke, da man mener sælerne vandrer ind og ud af Limfjorden afhængig af fødetilgængelighed (Miljøstyrelsen, 2020e).

Svømmende sæler kan bevæge sig over store afstande, og sæler fra H28 vil potentielt kunne fouragere i ansøgningsområdet eller passere det.

10.5.1.2 Fuglebeskyttelsesområder

De nærmeste fuglebeskyttelsesområder ligger 24 km fra ansøgningsområdet. Det drejer sig om Fuglebeskyttelsesområde F23, F27, F28, og F39. Desuden er et forslag til nye danske fuglebeskyttelsesområder sendt i høring frem til 21. juni 2021 (<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64971>). Forslaget til nye fuglebeskyttelsesområder omfatter bl.a. et nyt fuglebeskyttelsesområde F126 i Skagerrak,

idet der i dette område er grundlag for udpegningsgrundlaget. Det vil ifølge DCE kræve yderligere analyser og overvejelser at vurdere, om der ligeledes er grundlag for at sætte sortand samt lomvie og/eller alk på det fremtidige udpegningsgrundlag (Petersen, I. K.; Nielsen, R. D.; Clausen, P., 2016; Petersen et al, 2019c). F126 ligger ca. 36 km fra ansøgningsområdet.

Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for en række arter af ynglefugle (Y) og trækfugle (T), der potentielt kan forekomme i det marine miljø. Disse er sammenfattet i Tabel 10-2. Både de eksisterende og de forventede nye udpegningsarter er medtaget i tabellen. For det nye område F126 er desuden medtaget de arter, hvis status i området aktuelt er usikker (alk, lomvie, sortand).

Ansøgningsområdet ligger ca. 15 km fra land og på 22-37 m dybde. Relevante fuglearter på udpegningsgrundlagene, som kan tænkes at kunne raste eller søge føde i ansøgningsområdet omfatter først og fremmest ternearterne i F23, F27, F28 og F39, samt for F126 malleuk, storkjove, lomvie, alk, lomvie og sortand. Se afsnit 9.4 for yderligere information om fuglearterne i og omkring ansøgningsområdet.

10.5.2 Bilag IV-arter

Da indvindingen udelukkende indebærer påvirkninger i det marine miljø, er behandlingen af bilag IV-arter begrænset til at omfatte marsvin.

Der vurderes at være tre bestande af marsvin i danske farvande 1) Farvandet omkring Bornholm og østover ind i Østersøen (Østersøpopulationen), 2) Bælthavet, Øresund, sydlige Kattegat og vestlige Østersø, hvortil dyrene ved den nordsjællandske kyst hører til (Bælthavspopulationen) og 3) Nordlige Kattegat, Skagerrak og Nordsøen (Nordsøpopulationen) (se afsnit 9.5 - Havpattedyr).

Bevaringsstatus for marsvin er vurderet gunstig i den marine atlantiske region. I den baltiske region lever to bestande, Bælthavsbestanden, med en gunstig bevaringsstatus og Østersøbestanden med en stærkt ugunstig bevaringsstatus, og tilsammen vurderes de at have stærk ugunstig bevaringsstatus. Bestanden i Østersøen betragtes også som kritisk truet af IUCN (Fredshavn et al, 2019).

Marsvin findes på udpegningsgrundlaget i det marine Natura 2000-område N219 *Sandbanker ud for Thyborøn*, der består af habitatområde H258 og ligger ca. 21 km syd for ansøgningsområdet samt Natura 2000 område nr. 250 *Gule Rev*, der indeholder Habitat område H259 og ligger ca. 22 km nord for området.

Der forekommer højtæthedsområder for marsvin i og omkring Natura 2000-områderne nr. 1 *Skagens Gren og Skagerrak* samt nr. 249 *Store Rev* afhængigt af årstiden (Figur 9-22) mere end 95 km fra ansøgningsområdet. Natura 2000-område nr. 250 *Gule Rev* ca. 22 km fra ansøgningsområdet har desuden marsvin på udpegningsgrundlaget. Vigtigheden af Natura 2000-område nr. 250 *Gule Rev*, hvor marsvin er på udpegningsgrundlaget, er vurderet af DCE til at have middel tæthed både sommer og vinter, men uden væsentlig betydning for marsvinpopulationen (Sveggard et al., 2018) (se mere info under afsnit 9.5 – Havpattedyr).

10.6 Miljøpåvirkninger

I det følgende vurderes de potentielle påvirkninger på de marine udpegningsgrundlag i de relevante habitatområder.

10.6.1 Habitatområderne

For de omkringliggende habitatområder og udpegningsgrundlagene i form af naturtyper og arter, knytter indvindingens potentielle påvirkninger sig til forstyrrelser, samt en mulig midlertidig forøgelse af mængden af suspenderet materiale i vandsøjlen, samt sedimentation og eventuel overlejring af bundvegetation og –fauna som følge af indvindingen.

Naturtyper

Marine naturtyper i habitatområderne indenfor ca. 1 km afstand til ansøgningsområdet vurderes potentielt relevante i forhold til vurdering af evt. påvirkning fra indvindingen, idet sedimentspildet fortrinsvis forekommer indenfor ansøgningsområdet og den 500 m påvirkningszone udenom.

Naturtyperne udenfor ca. 1 km afstand til ansøgningsområdet, vurderes derfor ikke at blive påvirket af sedimentspildet fra indvindingen. Afstanden til de i Tabel 10-1 nævnte naturtyper er derfor for stor til at påvirke naturtyperne, der i forvejen ligger i et kystområde med stor naturlig dynamik og sedimenttransport. Der vurderes derfor ikke at forekomme væsentlige påvirkninger fra sedimentspild på naturtyperne i de nærliggende Habitatområder.

Arter

Marsvin er behandlet under bilag IV-arter. Herudover forekommer stavsild, gråsæl og spættet sæl på udpegningsgrundlaget i Habitatområde N28 *Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø* ca. 24 km fra ansøgningsområdet.

Ansøgningsområdet ligger ca. 24 km fra H28, og det vurderes derfor, at hverken sedimentspild, støj eller anden forstyrrelse kan have en væsentlig negativ påvirkning på stavsild i habitatområdet. Det kan ikke udelukkes at stavsild fra habitatområde H28 i perioder vil være at finde i ansøgningsområdet. Mens arbejdet foregår, vil arten dog kunne søge til lignende, alternative fourageringsområder langs den nordjyske vestkyst, hvis de forstyrres af anlægsaktiviteterne eller hvis lokalt opslæmmet sediment påvirker deres muligheder for at fouragere.

Der er foretaget en vurdering i forhold til påvirkning på sæler, som kan passere og søge føde i ansøgningsområdet i afsnit 9.5 – Havpattedyr. Det er vurderet i afsnit 9.5 at indvindingen vil have en ubetydelig til mindre påvirkning i selve ansøgningsområdet, samt ubetydelig i påvirkningszonen og havområdet udenfor (se desuden Tabel 11-1).

Samlet set vil indvindingen ikke påvirke mulighederne for opfylde den overordnede målsætning for de omkringliggende Natura 2000-områder, der er at opretholde og sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte.

Projektet vil således være uden betydning for Natura 2000-områdernes bestande af beskyttede arter samt udstrækningen og kvaliteten af deres levesteder og vil heller ikke kunne påvirke areal, struktur, funktion eller naturtilstand af områdernes beskyttede naturtyper.

Der forventes ikke væsentlige kumulative effekter i forhold til det meget begrænsede sedimentspild fortrinsvis i ansøgningsområdet og påvirkningszonen. Anden sedimentspild i området forekommer tæt på kysten i forbindelse med sandfodring, i andre råstofindvindingsområder (> 4 km afstand) og i projektområdet for Vesterhav Nord Havmøllepark (> 30 km afstand). Naturtyperne og arterne i de omkringliggende Natura 2000-områder vurderes ikke at blive væsentligt påvirket af spildet fra de enkelte projekter og heller ikke kumulativt. Den meget begrænsede og lokale støj fra indvindingsaktiviteten påvirker ikke udpegningsgrundlagene som omfatter naturtyper, stavsild og sæler væsentligt, og vil således heller ikke have en væsentlig kumulativ effekt med andre projekter som ligger i >4 km afstand til ansøgningsområdet.

På den baggrund vurderes det, at det kan udelukkes at indvindingen i sig selv eller i kumulation med øvrige planer eller projekter kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af de omkringliggende Natura 2000-områder, samt naturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget for disse.

10.6.2 Fuglebeskyttelsesområderne

Påvirkningen af fugle, inklusiv de arter, der ikke er på udpegningsgrundlaget, er beskrevet og vurderet mere detaljeret i afsnit 9.4. De nærmeste fuglebeskyttelsesområder ligger 24 km fra ansøgningsområdet. Det drejer sig om Fuglebeskyttelsesområde F23, F27, F28, og F39. Det kommende fuglebeskyttelsesområde F126 i Skagerrak, der er i høring pt., ligger ca. 36 km fra ansøgningsområdet.

Eneste ynglende udpegningsarter, der kan forventes at udnytte ansøgningsområdet, er som tidligere nævnt ternerne. Fourageringsmulighederne for eventuelt tilstedeværende tern i området kan kortvarigt blive påvirkede som følge af opslæmmede sediment meget lokalt omkring ansøgningsområdet (få hundrede meter). Det er dog sandsynligt at hav. -fjord, -dværg og rovterne foretrækker at søge føde i andre og vigtigere farvande tættere på kysten og fuglebeskyttelsesområderne, såsom ferskvandssøer, og at ansøgningsområdet ikke er væsentligt for deres fødesøgning. Den eneste egentligt marine terne er splitterne, der er på udpegningsgrundlaget i F23. I forhold til den samlede udstrækning af potentielle fourageringsområder for arten, vil den helt lokale påvirkning som følge af indvindingen dog ikke være en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-område N28. En midlertidig og helt lokal påvirkning af fourageringsbetingelserne vil derfor være uden betydning for arternes bevaringsstatus i fuglebeskyttelsesområdet.

Havdykænder (hvinand, sortand) og toppet skallesluger (dof.dk, 2021) er primært registreret på havdybder under 20 meter i området (se afsnit 9.4 – Fugle). Under forårstælling af vandfugle i Nordsøen blev der registreret sortænder nær ansøgningsområdet, men kun sjældent mere end 20 km fra kysten. Havdykændernes og toppet skalleslugers tilstedeværelse i og nær ansøgningsområdet er betinget af fødeudbuddet som fisk, muslinger og invertebrater. På baggrund af de nævnte undersøgelser, dybdeforholdene og det ringe fødeudbud for denne artsgruppe vurderes ansøgningsområdet at være af begrænset betydning for havdykænder og toppet skallesluger og væsentlige påvirkninger vurderes ikke at forekomme som følge af indvindingen.

Samlet set vurderes det derfor, at en væsentlig negativ påvirkning af ynglende fugle på udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområderne F23, F27, F28, F39 og F126, som følge af en fortsat indvindingsaktivitet i ansøgningsområdet kan afvises, ligesom indvindingsaktiviteten vurderes ikke at påvirke fuglenes bevaringsstatus væsentligt.

F126 har malleuk, storkjove, alk, lomvie og sortand på udpegningsgrundlaget. For de mobile fiskespisende arter bl.a. alk, storkjove, malleuk samt trækkende terner, der dagligt fouragerer over store afstande, er der rig mulighed for at søge føde andre steder i Nordsøen og Skagerrak. For disse arter vil den direkte påvirkning fra forstyrrelse og den indirekte påvirkning af fødegrundlaget generelt være lav og ubetydelig. Alk og lomvie er mere følsomme over for såvel direkte påvirkninger som forstyrrelse i forbindelse med indvindingsaktiviteterne samt de indirekte påvirkninger fra påvirkning af fødegrundlaget (Cook & Burton, 2010). Alk og lomvie betegnes som værende moderat sensitive over for både den direkte påvirkning fra indvindingsaktiviteter samt de indirekte påvirkninger af fødegrundlaget (Cook & Burton, 2010). Det er vurderet i afsnit 9.4 - Fugle at arealinddragelse, havbundsændring, sedimentspild og støj og forstyrrelser medfører ubetydelige til mindre påvirkninger for de nævnte fuglearter i ansøgningsområdet, samt ingen til ubetydelige negative påvirkninger i påvirkningszonen og havområdet udenfor. Indvindingens påvirkning på fuglene på udpegningsgrundlaget i F126 vurderes derfor ikke at være væsentlige.

I forhold til trækfugle på de omkringliggende fuglebeskyttelsesområders udpegningsgrundlag vil disse som hovedregel være ret snævert tilknyttet områdernes strandenge, vadeblader, rørsumpe og åbne vandflader. Indvindingsområdet og de umiddelbart tilstødende farvande er uden større betydning for disse arter, og fugle fra fuglebeskyttelses-områderne vil næppe søge til indvindingsområdet for at fouragere. På den baggrund kan en væsentlig negativ påvirkning af trækfugle på de omkringliggende fuglebeskyttelsesområders udpegningsgrundlag afvises.

Kumulative effekter for fuglene er vurderet ikke væsentlige i afsnit 9.12.3 under kumulative effekter.

10.6.3 Bilag IV-arter

Da indvindingen udelukkende indebærer påvirkninger i det marine miljø, er behandlingen af bilag IV-arter begrænset til at omfatte marsvin. Som det fremgår af ovenstående afsnit, er marsvin på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne N219 og N250, hvor tætheden af individer er vurderet til at være middel. Tætheden af marsvin i og omkring ansøgningsområdet forventes at være lavere end førnævnte områder, dog må enkelte individer formodes at kunne forekomme regelmæssigt (Sveggard et al., 2018).

Påvirkningen af marsvin er beskrevet detaljeret i afsnit 9.5 om havpattedyr og sammenfattes nedenfor i forhold til kravene i Habitatbekendtgørelsen og artens status som Bilag IV-art.

De miljøpåvirkninger, som er væsentlige for marsvin i forbindelse med råstofindvinding, omfatter; støj, fødetilgængelighed og –udbud samt suspenderet sediment i vandsøjlen.

Som beskrevet i metodeafsnittet skal påvirkninger af bilag IV-arter vurderes i forhold til områdets økologiske funktionalitet, der er udtryk for de samlede livsvilkår, et område byder en art.

Påvirkninger som følge af støj, øget suspenderet sediment eller eventuelle påvirkninger af fødeudbud og -tilgængelighed, som følge af indvindingsaktiviteterne vil være begrænsede til selve ansøgningsområdet og være så begrænsede, kortvarige og ubetydelige, at de ikke er væsentlige for den samlede bestand af marsvin i Nordsøen (se afsnit 9.5 – Havpattedyr).

Det vurderes på den baggrund, at den ansøgte indvindingsaktivitet ikke vil udgøre en væsentlig påvirkning af den samlede bestand eller områdets økologiske funktionalitet for arten. Den økologiske funktionalitet for marsvinebestanden i Nordsøen forventes derfor efter projektet at være opretholdt på samme niveau som hidtil.

En række andre arter af hvaler, der ligeledes er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, forekommer sporadisk og fåtalligt i de danske farvande. Marsvin er den eneste hval, der er almindelig herhjemme, og som yngler i danske farvande. Marsvin er derfor den eneste hvalart, det er vurderet relevant at inddrage i forhold til områdets samlede økologiske funktionalitet.

11. Sammenfattende vurdering

Den nærværende miljøkonsekvensvurdering er blevet gennemført for Kystdirektoratet i relation til ansøgning om indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet "Lodbjerg B". Som grundlag for vurderingen er der blevet gennemført en råstofeftersøgning (Fase IB) og miljøundersøgelser (Fase IIA) i ansøgningsområdet samt en tilhørende 500 m bred påvirkningszone. Derudover er anvendt data fra databaser og offentlige publikationer samt original litteratur fra tidsskrifter.

De potentielle effekter, som de ansøgte indvindingsaktiviteter vurderes at have på miljøet, er sammenfattet i Tabel 11-1.

Tabel 11-1. Opsummering af den påvirkning, som potentielt vil kunne forekomme i ansøgningsområdet og påvirkningszonen.

Miljøforhold	Indvindingens potentielle påvirkning		
	Ansøgningsområde	Påvirkningszone	Overordnet betydning Udenfor Ansøgningsområde
Havbund og dybde	Mindre	Ingen	Ingen
Flora og fauna	Moderat	Ubetydelig	Ingen
Fisk og fiskeri	Mindre	Ubetydelig	Ingen
Fugle	Mindre	Ubetydelig	Ubetydelige

Indvindingens potentielle påvirkning			
Miljøforhold	Ansøgningsområde	Påvirkningszone	Overordnet betydning Udenfor Ansøgningsområde
Havpattedyr	Ubetydelig	Ubetydelig	Ubetydelig
Vandplaner, vandkvalitet og havstrategi	Ubetydelig	Ubetydelig	Ingen
Marinarkæologiske interesser	Ubetydelig	Ingen	Ingen
Rekreative interesser	Ubetydelig	Ingen	Ingen
Sejladsforhold	Mindre	Ubetydelig	Ubetydelig
Ammunition	Ubetydelig	Ingen	Ingen
Øvrige erhvervsinteresser	Ubetydelig	Ingen	Ingen
Natura 2000 og Bilag IV-arter	Ingen væsentlige negative påvirkninger		

På baggrund af miljøkonsekvensvurderingen kan det sammenfattende konkluderes, at indvindingen i ansøgningsområdet medfører en *Moderat* negativ påvirkning af bundflora og -fauna udelukkende indenfor selve ansøgningsområdet, ubetydelig påvirkning i påvirkningszonen og ingen påvirkning i Nordsøen udenfor ansøgningsområdet. Alle øvrige påvirkninger er mindre til ingen, herunder i påvirkningszonen og området udenfor.

12. Afværgeforanstaltninger

Afværgeforanstaltninger er en betegnelse for en aktivitet, der anvendes for at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere uønskede miljøpåvirkninger ved gennemførelse af aktiviteten.

Den ansøgte indvindingsaktivitet vurderes ikke at medføre væsentlige negative påvirkninger på områdets natur- og miljøforhold på kort eller lang sigt uden for ansøgningsområdet. Det vurderes derfor ikke, at der vil være behov for iværksættelse af særlige foranstaltninger som grundlag for en indvindingstilladelse.

13. Overvågning

Af VVM-bekendtgørelsen fremgår det ikke, at der er et formelt krav om, at en miljøkonsekvensvurdering skal indeholde et kontrol-og overvågningsprogram. Der er ikke stillet krav om udarbejdning af et overvågningsprogram for efterforskningsområde Lodbjerg B.

14. Tekniske mangler og manglende viden

Ifølge bekendtgørelsen skal en miljøkonsekvensvurdering indeholde en oversigt over eventuelle områder, hvor datagrundlaget er usikkert eller, hvor der mangler viden til at foretage en vurdering af projektets indvirkning på miljøet. Det vurderes, at det tilgængelige

datagrundlag, herunder eksisterende data, er dækkende for vurderingen, og at der ikke forekommer væsentlige mangler i forbindelse med datagrundlaget og vurderingen.

15. Referencer

- Laugier et al. (2015). Laugier, F.; Feunteun, E.; Pecheyran, C.; A, Carpentier 2015. Life history of the Small Sandeel, *Ammodytes tobianus*, inferred from otolith microchemistry. A methodological approach. *ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE*. 165.
- 4Coffshore. (Januar 2021). Submarine Cable Consulting & Intelligence. <https://www.4coffshore.com/offshorewind/>.
- Andersson, M. H. et al. (2016). Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning, RAPPORT 6723.
- Anthony, D., & Leth, J. (2002). *Large scale bedforms, sediment distribution and sand mobility in the eastern North Sea off the Danish west coast*.
- Appelberg et al. (2005). Øresundsforbindelsens inverkan på fisk och fiske. Underlagsrapport 1992-2005, s. 230.
- BirdLife International. (2021). *Important Bird Areas factsheet: Skagerrak-Southwest Norwegian trench*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 03/02/2021.
- Boje & Carl. (2020). Tunge. I: Carl, H. & Møller, P.R. (red.). Atlas over danske saltvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum. Online-udgivelse, februar 2020.
- Brierley, A., & Fernandes, P. (2001). Diving Depths of Northern Gannets: Acoustic Observations of *Sula Bassana* from an Autonomous Underwater Vehicle. *The Auk*, s. 118 (2):529–534.
- By- og Landsskabsstyrelsen. (2010). Miljøeffekter ved anvendelse af store fartøjer til råstofindvinding på havbunden. DHI for By- og Landskabstyrelsen.
- Chistensen et al. (2008). Christensen A., Jensen H., Mosegaard H., John M.S., Schrum C. 2008. Sandeel (*Ammodytes marinus*) larval. *J. Fish. Aquat. Sci.* 65: 1498-1511.
- Cook, A., & Burton, N. (2010). *A review of the potential impacts of marine aggregate extraction on seabirds*. Marine Environment Protection Fund (MEPF) Project 09/P130.
- Coull et al. (1998). Coull K.A., Johnstone R., Rogers S.I. Fisheries Sensitivity Maps in British Waters. Published and distributed by UKOOA Ltd.
- COWI. (2000). VVM redegørelse for Øresundsbroen.
- Culter and Mahadevan. (1982). Long-term effects of beach nourishment on the benthic fauna of Panama City beach, Florida. *Miscellaneous report No. 82-2. US Army Corps of engineers, Coastal Engeneering Research Center, Kingman Building, Fort Belvoir, Va. 22060. US Army*.
- Cuveliers et al. (2012). Multi-marker estimate of genetic connectivity of sole (*Solea solea*) in the North-East Atlantic Ocean. *Marine Biology* 159(6).
- Dalsen & Essink. (2001). Benthic community response to sand dredging and Shoreface Nourishment in Dutch Coastal Waters. *Senckenbergiana maritima* 31 (2): pp. 329-332.
- Dehnhardt et al. (2001). Dehnhardt, G., Mauck, B., Hanke, W. and Bleckmann, H. (2001). Hydrodynamic trailfollowing in harbor seals (*Phoca vitulina*). *Science* 293. 102-104.
- DHI. (2000). Fiskebestande og fiskeri i planlagte sandindvindingsområder på Vestkysten samt i et revlefodningsområde udfor Fjältring. DHI for Kystdirektoratet.

-
- DHI. (2000a). Fiskebestande og fiskeri i planlagte sandindvindingsområder på Vestkysten samt i et revlefodringsområde udfor Fjältring. DHI for Kystdirektoratet.
- DHI. (2010). Miljøeffekter ved anvendelse af store fartøjer til råstofindvinding på havbunden. DHI for By- og Landskabstyrelsen.
- DKCPC. (januar 2021). DANISH CABLE PROTECTION COMMITTEE. Pas på kablerne - når du fisker og ankrer. .
https://qgiscloud.com/exjure/DKCPC_CableAwarenessMap/?bl=Aerial&l=Telecom%2CPower%2CPipeline&t=DKCPC_CableAwarenessMap&e=-368008%2C7064213%2C2171992%2C8458567.
- dof.dk. (2021). Toppet skallesluger (Mergus serrator).
<https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=02210&sorter=a>, webside besøgt d 11 juni.
- DONG Energy, Vattenfall, The Danish Energy Authority and the Danish Forest and Nature Agency. (2006). Danish offshore Wind - Key environmental issues. ISBN: 87-7844-625-2.
- DTU Aqua. (2012). Wagner, et al. Fiskebestandenes struktur. Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af.
- Energinet.dk. (2015). Vesterhav Nord offshore wind farm, EIA - background report, Resting birds.
- Energinet.dk. (2015). Vesterhav Nord offshore wind farm, EIA - background report, Resting birds. Rapport fra NIRAS.
- Essink. (1999). Ecological effects of dumping of dredged sediments; options for management. Journal of Coastal Conservation 5:69-80.
- Essink et al. (1997). Risk analysis of coastal nourishment techniques (RIACON). Report Nr. RIKZ-97.031. National institute for coastal and marine management, The Netherlands.
- Fiskeri i tal. (2020). TAC og kvoter 2020 og statistik om Dansk Erhvervsfiskeri. Danmarks Fiskeriforening.
- Follestad, A. (1990). The pelagic distribution of Little Auk Alle alle in relation to a frontal system off central Norway March/April 1988. *Polar Research*, 8, s. 23-28.
- Fredshavn et al. (6.. September 2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter. Oversigt over Danmarks Artikel 17-rapportering til habitatdirektivet 2019 .
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2019/Bevaringsstatus_nat_urtyper_arter.pdf. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.
- Galatius, A. (2017). Baggrund om spættet sæl og gråsæls biologi og levevis i Danmark. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Institut for Bioscience. .
- Garthe, S., & Flore, B. (2007). Population trend over 100 years and conservation needs of breeding sandwich terns (*Sterna sandvicensis*) on the German North Sea coast. *Journal of Ornithology*, s. 148:215–227.
- GEUS. (2019b). Havbundens overfladesedimenter 1:250.000.
- GEUS. (2021a). Niels Nørgaard-Pedersen, Ole Bennike & Lars G. Rödel: Efterforskning og kortlægning af sandressourcer i Nordsøen for Kystdirektoratet - Lodbjerg A og B. *DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2021/16*. Kystdirektoratet.
- Göke et al. (2019). Göke, C., Christensen, A., Tonetta, D., Petersen, I.K., Olsen, O., Dahl, K. og Sveegaard, S. (2019) Identifikation af mulige beskyttede havområder i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen omkring Bornholm. *DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi*, 78 s. - videnskabelig rapport nr. 362. Aarhus Universitet.

-
- Hansen & Høgslund. (2021). Hansen, J. W.; Høgslund, S.(Red.): *Marine områder 2019*. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Energi og Miljø. Hentet fra <http://dce2.au.dk/pub/SR355.pdf>
- Hansen J.W. & Høgslund S. (red.). (2019). *Marine områder 2018*. NOVANA. Aarhus universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 156s. *Videnskabelig rapport fra DCE nr. 355*, . Aarhus Universitet.
- Hansen, J. W., & Høgslund, S. (2019). *Marine områder 2018*. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Energi og Miljø, <https://dce2.au.dk/pub/SR418.pdf>. Hentet fra <http://dce2.au.dk/pub/SR355.pdf>
- Hansen, J.W. (red.). (2018). *Marine områder 2016*. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 140 s. *Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 253*. <http://dce2.au.dk/pub/SR253.pdf>.
- HELCOM. (2019). Red list of benthic invertebrates. <https://helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/red-list-of-baltic-species/red-list-of-benthic-invertebrates/>.
- Hjulström, F. (1939). Transportation of debris by moving water, in Trask, P.D., ed., *Recent Marine Sediments; A Symposium*: Tulsa, Oklahoma, American Association of Petroleum Geologists, p. 5-31.
- Hygum. (1993). Miljøpåvirkninger ved ral- og sandsugning. Et litteraturstudie om de biologiske effekter af råstofindvinding i havet. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 81., 68 ss.
- ICES. (2007). *Results of the spring 2004 North Sea ichthyoplankton surveys*. ICES Cooperative Research Report No. 285. 59 pp.
- ICES. (2020). *ICES Fisheries Overviews Greater North Sea Ecoregion – Fisheries overview, including mixed-fisheries considerations*. Published 30 November 2020.
- ICES a. (2011). *Report of the Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak (WGNSSK), 4 - 10 May 2011, ICES Headquarters, Copenhagen*. ICES CM 2011/ACOM:13. 1197 pp.
- ICES b. (2011). *Report of the International Bottom Trawl Survey Working Group (IBTSWG), 28 March – 1 April 2011, ICES Headquarters, Copenhagen*. ICES CM 2011/SSGESST:06. 237 pp.
- J. Teilmann et al. . (2018). Råstofindvindingens effekt på bestanden af marsvin i det nordligste Øresund. Studie af eksisterende litteratur og data med fokus på Lappegrunden i Øresund. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.
- Jepsen et al. (2005). Forvaltningsplan for spættet sæl (*Phoca vitulina*) og gråsæl (*Halichoerus grypus*) i Danmark Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. J.nr. SN 2001-361-0004. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.
- Køie & Kristiansen. (2014). Havets dyr og planter. *Gyldendahl, København 2014*.
- Kystdirektoratet. (2012). Vi beskytter Vestkysten – Kystfodring 2012. Informationsbrochure vedr. Kystdirektoratets sandfodringsindsats for 2012. Tilgængeligt online via. <http://omkystdirektoratet.kyst.dk/kystfodringen-langs-den-jyske-vestkyst-2012.html>.
- Kystdirektoratet. (2021). Figur med strækninger på Lodbjerg-Nymindesgab strækningen. <https://kyst.dk/media/84195/maalsætning-for-den-fremtidige-kystudvikling.jpg>.
- Lystfiskerture.dk. (2021). Lystfiskerture.dk. <https://www.lystfiskerture.dk/>. webside besøgt den 28-05-2021.
- MacKenzie & Visser. (2001). Fisheries and Climate Change: The Danish Perspective. Climate Change Research. Danish Contributions. Danish Climate Centre/Danish Meteorological Institute. Pages: 291-302.

-
- Miljø- og Fødevareministeriet. (2019). *Danmarks Havstrategi II. Fokus på et godt havmiljø*. . Miljø- og Fødevareministeriet. (2019). <https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/danmarks-havstrategi/>.
- Miljø- og Fødevareministeriet. (2019c). *Danmarks Havstrategi II, Første del, God miljøtilstand, basisanalyse, miljømål*. https://mst.dk/media/225664/hsd_ii_foerste_del_basisanalyse_2019.pdf.
- MiljøGis. (2021). MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021. Juni 2016. <http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016>. Data hentet medio august 2019. *Webside besøgt d 22-01-2021*. Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen.
- Miljøministeriet. (2005). *Forvaltningsplan for spættet sæl (Phoca vitulina) og gråsæl (Halichoerus grypus) i Danmark* Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. J.nr. SN 2001-361-0004.
- Miljøministeriet. (2020). Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- Miljøministeriet. (Marts 2021). *Nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm*. <https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/b32e2dea-6dd1-4184-973f-bf8f23b1d86a/Milj%C3%B8rapport%20for%20beskyttede%20havstrategiomr%C3%A5der%20i%20Nords%C3%B8en%20og%20%C3%98sters%C3%B8en%20omkring%20Bornholm.pdf>.
- Miljøstyrelsen. (2017). *Danmarks Havstrategi. Indsatsprogram*. Miljø- og Fødevareministeriet.
- Miljøstyrelsen. (2019). *Forslag til nye udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder*. <https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/>. Miljøstyrelsen.
- Miljøstyrelsen. (Maj 2020a). *Natura 2000 basisanalyse 2022-2027. Lønstrup Rødgrund. Natura 2000-område nr. 202. Habitatområde H202*. <https://mst.dk/media/194151/n202-basisanalyse-2022-27-loenstrup-roedgrund.pdf>. Miljø- og Fødevareministeriet.
- Miljøstyrelsen. (Marts 2020c). *Natura 2000 basisanalyse 2022-2027. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203. Habitatområde H203*. <https://mst.dk/media/194150/n203-basisanalyse-2022-27-knudegrund.pdf>. Miljø- og Fødevareministeriet.
- Miljøstyrelsen. (Maj 2020e). *Natura 2000-basisanalyse 2022-2027. Agger Tange, Nissum bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Natura 2000-område nr. 28. Habitatområde H28. Fuglebeskyttelsesområde F23, F27, F28 og F39*. ISBN:978-87-7038-769-9. Miljø- og Fødevareministeriet.
- Miljøstyrelsen. (september 2021). *Danmarks Havstrategi*. <https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/danmarks-havstrategi/>. Miljøministeriet/Miljøstyrelsen.
- Miljøstyrelsen. (Januar 2021). *MiljøGIS. Geologi*. <http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-geologiske-interesser>. Miljø- og Fødevareministeriet.

-
- Mineral Products Association (MPA) et al. (2010). Dealing with munitions in marine sediments. Guidance Note March 2010. ISBN 978-1-906410-14-8. The Crown Estate on behalf of the Marine Estate.
- Munk et al. (2009). *Munk P., Fox C.J., Bolle L.J., Van Damme C.J.G., Fossum P., Kraus G.. Spawning of North Sea fishes linked to hydrographic features. Fish. Oceanogr. 18: 458–469.*
- Muus et al. (2006). Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa. Gyldendal, 6. udgave, København.
- Naturstyrelsen. (2013). *Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Thyborøn Stenvolde. Natura 2000-område nr. 247.*
- Naturstyrelsen. (2013a). *Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Sandbanker ud for Thyborøn. Natura 2000-område nr. 219.*
- Naturstyrelsen. (2016). Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. Miljø- og Fødevareministeriet.
- Nelson. (1993). Beach restoration in the Southern US: Environmental effects and biological monitoring. *Ocean & Coastal Management, 19: 157-182.*
- Newell et al. (1998). Newell RC, Seiderer LJ, Hitchcock DR (1998). The impact of dredging works in coastal waters: a review of the sensitivity to disdisturbancesea bed. *Oceanography and Marine Biology: an Annual Review r. 36: 127–178.*
- Nielsen, R., Holm, T., Clausen, P., Bregnballe, T., Clausen, K., Petersen, I., . . . Bladt, J. (2019). *Fugle 2012-2017. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 264 s. - Videnskabelig rapport nr. 314. <http://dce2.au.dk/pub/SR314.pdf>.*
- NIRAS. (2012). Desk study UXO Kriegers Flak. Offshore wind farm site. Udarbejdet for Energinet.dk.
- Orbicon. (2006, Bilag 2). Ralindvinding på Jyske Rev - sedimentspredning. Rapport til Orbicon A/S. DHI - Institut for Vand og Miljø.
- Orbicon. (2014). Fællesområdet 554-CA Disken – Miljøvurdering. Udarbejdet for Naturstyrelsen.
- Orbicon. (april 2014). Horns Rev 3 Offshore Wind Farm, Technical report no. 4, Benthic habitats and communities. Energinet.dk.
- Orbicon. (2014a). Miljøredegørelse for indvinding af marine råstoffer. Område 31-187/200, Jyske Rev.
- Orbicon. (2016). Statusrapport og miljøvurdering for Område 520-EC Gyldenløves Flak, for NCC.
- Orbicon. (2016b). Statusrapport og miljøvurdering for 506-TA nord for Tvillingerne NCC Roads A/S.
- Orbicon. (2018). Råstofeftersforskning i to auktionsområder på Jyske Rev i Nordsøen 2016-2017. Orbicon.
- Orbicon. (2018a). Råstofindvinding, område A-2016, Jyske Rev, Nordsøen. NCC Industries.
- Orbicon. (2018b). Råstofeftersforskning, område 562-HA, Jyske Rev, Statusrapport, miljøkonsekvensvurdering og Natura 2000 væsentlighedsvurdering. NCC Industries.
- Orbicon. (2018c). Råstofindvinding i fællesområde 562-LC, Jyske Rev. Statusrapport, miljøkonsekvensvurdering og Natura 2000 væsentlighedsvurdering. NCC Industries.
- Orbicon. (2018e). *Råstofeftersforskning, Område 562-JC, Jyske Rev, Nordsøen. Statusrapport, Miljøkonsekvensvurdering og Natura 2000 væsentlighedsvurdering.*
- Orbicon. (2019). *Råstofindvinding, Område A-2017, øst for Jyske Rev, Nordsøen.*

-
- Orbicon. (2019a). Indvindingsområde 578-AA, Husby Klit, Statusundersøgelse efter indvinding af 3 mio. m³ sand. *vurderet udfra påvirkede områder Tabel 4-8*. Kystdirektoratet.
- Orbicon. (2019a). Råstofeftersforskning i Område A - Hesselø Bugt, Fase 1B Detailkortlægning for område A samt tilhørende påvirkningszone. Nordkystens Fremtid.
- Orbicon. (2019b). *Indvindingsområde 562-AD, Ferring. Statusundersøgelse efter indvinding af 3 mio m³ sand.*
- Otto, L. Z. (1990). *Review of the physical oceanography of the North Sea. Netherlands J. Sea Res.* 26, 161-238.
- Petersen et al. (2010). Petersen, I. K.; Nielsen, R.D.; Pihl, S.; Clausen, P.; Therkildsen, O.; Christensen, T. K. Kahlert, J.; & Hounisen, J.P. Landsdækkende optælling af vandfugle i Danmark vinteren 2007/2008. Arbejdsrapport fra DMU nr. 261. Danmarks Miljøundersøgelser.
- Petersen, I. (2008). *Antal og fordeling af vandfugle i den nordlige danske del af Nordsøen.* . – upubliceret notat, rekvireret af By- og Landskabsstyrelsen. .
- Petersen, I., & Sterup, J. (2019a). *Number and distribution of birds in and around two potential offshore wind farm areas in the Danish North Sea and Kattegat.* Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 40 pp. Scientific Report No. 327. <http://dce2.au.dk/pub/SR327.pdf>.
- Petersen, I., & Sterup, J. (2019b). *Bird distributions in parts of the Danish North Sea and in Kattegat, autumn 2019. A cruise report.* Research note from DCE - Danish Centre for Environment and Energy.
- Petersen, I., Nielsen, R., & Clausen, P. (2016). *Vurdering af IBA'er (Important Bird Areas) i relation til fuglebeskyttelsesområder - med særligt henblik på marine arter og områder.* . Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 94 s.
- Petersen, I., Sterup, J., & Nielsen, R. (2019). *Optællinger af vandfugle i den danske del af Nordsøen og Skagerrak, april og maj 2019.* Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Teknisk rapport nr. 158 <http://dce2.au.dk/pub/TR158.pdf>.
- Popper, A. N. et al. (2014). Sound Exposure Guidelines for Fishes and Sea Turtles: A Technical Report prepared by ANSI-Accredited Standards Committee S3/SC1 and registered with ANSI. Springer.
- Port of Hanstholm. (2021). *Om havnen* - <https://www.hanstholmhavn.dk/da/om-havnen>.
- Powilleit et al. (2009). Powilleit M., Graf G., Kleine J., Riethmüller R., Stockmann K., Wetzel M.A., Koop J.H.E. Experiments of the survival of six brackish macroinvertebrates implications for the field. *Journal of Marine Systems.* 75: 441-451.
- Rambøll. (2020b). Bilagsrapport, Miljøkonsekvensrapport, Kystbeskyttelse, Lodbjerg-Nyminddegab. <https://kyst.dk/media/86772/5-bilagsrapport-lodbjerg-nyminddegab-reduceret.pdf>.
- Rambøll. (2010a). Rambøll (2010). VVM redegørelse for Anholt havvindmøllepark.
- Rambøll. (2010b). Biologisk kortlægning. Jyske Rev område A. Udarbejdet for GEUS.
- Rambøll. (2019b). Bilagsrapport Lønstrup. Miljøkonsekvensrapport kystbeskyttelse. <https://kyst.dk/media/92710/bilagsrapport-loenstrup.pdf>. Kystdirektoratet.
- Rambøll. (2019b). Bilagsrapport. Miljøkonsekvensrapport kystbeskyttelse Lodbjerg-Nyminddegab. Kystdirektoratet.

-
- Rambøll. (2020). Miljøkonsekvensrapport - Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nyminddegab. Hovedrapport. s294. Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og anlæg.
- Rambøll. (2020). Miljøvurdering, kystbeskyttelse Lønstrup. <https://mst.dk/media/206440/miljoekonsekvensrapport-loenstrup.pdf>. Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og anlæg.
- Rambøll. (2020a). Miljøkonsekvensrapport - Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nyminddegab. Hovedrapport. s64, s294. Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og anlæg.
- Rambøll. (2020a). Miljøkonsekvensrapport, Kystbeskyttelse Lodbjerg Nyminddegab, Hovedrapport. Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og anlæg.
- Rambøll. (2020a). Miljøvurdering af fællesaftalen for kystbeskyttelse Lønstrup. <https://kyst.dk/media/92704/miljoevurdering-af-faellesaftalen-for-loenstrup.pdf>, se s32/86. Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og anlæg.
- Rambøll. (2020a). Miljøvurdering af fællesaftalen for kystbeskyttelse Lodbjerg-Nyminddegab. <https://kyst.dk/media/85115/miljoevurdering-af-faellesaftalen-for-lodbjerg-nyminddegab.pdf>. Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og anlæg.
- Rambøll. (2020b). Bilagsrapport, Miljøkonsekvensrapport, Kystbeskyttelse, Lodbjerg-Nyminddegab. <https://kyst.dk/media/86772/5-bilagsrapport-lodbjerg-nyminddegab-reduceret.pdf>.
- Rambøll. (2020c). Miljøvurdering af fællesaftalen for kystbeskyttelse Lønstrup. <https://kyst.dk/media/92704/miljoevurdering-af-faellesaftalen-for-loenstrup.pdf>. Kystdirektoratet.
- Schwemmer et al. (2011). Schwemmer, P., Mendel, B., Sonntag, N., Dierschke, V., Garthe, S. *Effects of ship traffic on seabirds in offshore waters: implications for marine conservation and spatial planning. Ecological Applications. Ecological Society of America.*
- Skov et al. (1995). Important Bird Areas in the North Sea including the Channel and the Kattegat. *BirdLife International Marine and Coastal Task Force.*
- Slots-og Kulturstyrelsen. (2021). <https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/>.
- Snow, P., & Perrins, C. (1998). *The Birds of the Western Palearctic.* Oxford University Press.
- Søfartsstyrelsen. (2017). *Skydeområder på søterritoriet. Bilag til Efterretninger for Søfarende.*
- Søfartsstyrelsen. (Januar 2021). AIS Density Plot. WMS service. <https://www.sofartsstyrelsen.dk/sikkerhed-til-soes/sejladsinformation/download-data/ais-density-kort>.
- Søgaard, & Asferg. (2007). *Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV. - Faglig rapport fra DMU.* DMU.
- Søgaard, B. S.-P.-N. (2005). Kriterier for gunstig bevaringsstatus. naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. *Faglig rapport fra DMU nr. 457, 3. udgave.*
- Støttrup et al. (2020). Registrering af fangster med standardredskaber i de danske kystområder: Nøglefiskerrapport for 2017-2019. *DTU-Aqua rapport nr. 375-2020. Institut for Akvatiske ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, 153 pp.* DTU-Aqua.
- Støttrup et al. . (2006). Kystfodring og kystøkologi. Undersøgelse af revlefodring ud for Fjaltring. *DFU rapport nr. 171-07.*
- Støttrup et al. (2005). *Kystfodring og godt fiskeri. Undersøgelse af strandnær kystfodring ved Agger Tange. DFU rapport nr. 156-05, 49 s.*

-
- Støttrup et al. (2013). Støttrup JG, Stenberg C, Dinesen GE, Christensen HT, Wieland, K. Gennemgang af den biologiske og økologiske viden, der findes om stenrev og deres funktion i tempererede områder. DTU Aqua-rapport nr. 266.
- Sveegaard et al. (2018). Sveegaard S., Nabe-Nielsen J, Teilmann J. Marsvins udbredelse og status for de marine habitatområder i danske farvande. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Videnskabelig rapport nr. 284.
- Sveegaard, S., Nabe-Nielsen, J., & Teilmann, J. (2018). *Marsvins udbredelse og status for de marine habitatområder i danske farvande*. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.
- Sveegaard et al. (2018). Marsvins udbredelse og status for de marine habitatområder i danske farvande. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Videnskabelig rapport nr. 284.
- Teilmann et al. (2004). Teilmann, J., R. Dietz, F. Larsen, G. Desportes, B.M. Geertsen, L.W. Andersen, P.J. Aastrup, J.R. Hansen. & L. Buholzer: Satellitsporing af marsvin i danske og tilstødende farvande. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 484.
- Teilmann et al. (2008). Teilmann, J., Sveegaard, S., Dietz, R., Petersen, I.K., Berggren, P. & Desportes, G. High density areas for harbour porpoises in Danish waters. National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 84 pp. – Faglig rapport fra DMU nr. 657.
- Thyborøn Havn. (2021). Hentet fra <http://www.thyboronport.dk/>.
- Tood et al. (2015). A review of impact of marine dredging activities on marine mammals. ICES Journal of Marine Science 72 (2), 328-340. doi:10.1093/icesjms/fsu187.
- Van Gemert, R., & Andersen, K. H. (2018). van Gemert, R., & Andersen, K. H. Challenges to fisheries advice and management due to stock recovery. *ICES Journal of Marine Science*, 75(6), 1864-1870.
- Vattenfall. (May 2020a). Vesterhav Nord vindmøllepark, Miljøkonsekvensrapport. https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/vesterhav_nord_miljoekonsekvensrapport.pdf.
- Vattenfall. (May 2020b). Vesterhav Syd vindmøllepark, Miljøkonsekvensrapport. https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/vesterhav_syd_miljoekonsekvensrapport.pdf.
- Vattenfall. (2021). Hentet fra <https://group.vattenfall.com/dk/vores-forretning/vindprojekter-i-danmark/vesterhav-nord>.
- Vejdirektoratet. (2014a). Storstrømsbroen, Miljøvurdering, VVM-redegørelse, Del 2. *Rapport 517 - 2014*. ISBN 978-87-93184-31-2.
- Vejdirektoratet. (2016). Environmental Impact Assessment (EIA) of sand extraction at Kriegers Flak. Assessment of impact of extended sand extraction. Addendum. Udført af DHI.
- Vikstrøm, T., & Moshøj, C. (2020). *Fugleatlas. De danske ynglefugles udbredelse 2014-2017*. Lindhardt og Ringhødt Forlag A/S og Dansk Ornitologisk Forening.
- Vikstrøm, T., Nyegaard, T., Fenger, M., Brandtberg, N., & Thomsen, H. (2015). *Status og udviklingstendenser for Danmarks Internationale vigtige fugleområder (IBA'er)*. Dansk Ornitologisk Forening. DOF Rapport 17. 83 pp.
- Worsøe et al. (2002). Gyde- og opvækstpladser for kommercielle fiskearter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. DFU-rapport nr. 118-02. Danmarks Fiskeriundersøgelser.

-
- Wright, P. J., Jensen, H., & Tuck, I. (2000). The influence of sediment type on the distribution of the lesser sandeel, *Ammodytes marinus*. *Journal of Sea Research*, 44: 243–256.
- WSP/Rambøll. (2021). Thor OWF. Technical report - Benthic fauna and flora. *Prepared for Energinet. Document no. 1100040575-983399635-4*. Energinet.