

Onobrychis viciifolia (esparsette) tørrede pellets

CAS-nr. forelægger ikke

Basisstof til plantebeskyttelse

Om basisstoffer til plantebeskyttelse

Et godkendt basisstof må bruges til plantebeskyttelse i hele EU inden for de vilkår og anvendelser (doseringer, afgrøder og skadegørere m.v.), som basisstoffet er godkendt til. Læs mere om basisstoffer på

<https://mst.dk/kemi/pesticider/alternative-sproejtemidler/basisstoffer/>

Denne brugsanvisning er forfattet som en hjælp til brugere af basisstoffet, da der ikke må markedsføres produkter med godkendte etiketter, som beskriver den godkendte fremstilling og anvendelse af stoffet til plantebeskyttelsesformål. De fuldstændige vilkår for brugen af basisstoffer fremgår af godkendelsesforordningen og review-rapporten. Denne brugsanvisning er udarbejdet jf. konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om *Onobrychis viciifolia* (esparsette) tørrede pellets (PLAN/2024/790 RR– rev.2), særlig tillæg I og II.

Brugsanvisning

Afgrøder: *Onobrychis viciifolia* (esparsette) tørrede pellets må kun anvendes til vindruer (*Vitis vinifera*).

Skadevolder: *Onobrychis viciifolia* (esparsette) må kun bruges mod *Xiphinema index* – planteparasitiske nematoder.

Brug: Der må anvendes dehydrerede og pressede granulater/pellets fremstillet af plantedele (ikke roden). Granulaterne/pellets spredes på, og anbefales indarbejdet, i jorden.

Mindste renhedsgrad: Anvendes med en minimumrenhedsgrad på 1000 g/kg.

Dansk anvendelsesskema

Basisstof	Afgøde og/eller anvendelses-forhold	F, V eller I (a)	Skadevolder	Koncentration af aktivstof (g/L) eller (g/kg) (b)	Applikation				Applikationsrate			PHI (dage) (h)	Bemærkninger
					Metode (c)	Vækststadium og sæson (d)	Antal behandling er min./maks. (e)	Interval mellem behandlinger min.	g a.s./hL min./maks. (f)	Vand (L/ha) min./maks.	Total rate pr. behandling g a.s./ha eller kg/ha (g)		
Onobrychis viciifolia (esparsette) tørrede granulater/pellets	Vindruer <i>Vitis vinifera</i> (VITVI)	F	Xiphinema index (XIPHSP)	1000 g/kg	Spredning af pellets. Det anbefales at indarbejde dem i jorden	Efterår el. forår	1	-	Ikke relevant	-	10.000 kg/ha	Ikke relevant	
						På sygdomsramte områder					1 kg/m ²		

Find mere information om basisstoffer og deres anvendelse på <https://mst.dk/kemi/pesticider/alternative-sproejtemidler/basisstoffer/>

- (a) Udendørs brug på friland (F), indendørs i væksthuse (V) eller indendørs anvendelse (I)
- (b) Koncentration af aktivstof (a.s.). Dosis angivet i g/kg eller g/L.
- (c) Udbringningsmetoden, f.eks. sprøjtning, spredning, pulverspredning, udvanding, etc.
- (d) Vækststadium ved sidste behandling (se BBCH Monograph, Growth Stage of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4) samt information om sæson for behandling hvor relevant.
- (e) Minimum og maksimum antal af behandlinger, der er mulige under praktiske forhold.
- (f) g aktivstof pr. 100 L (minimum til maksimum).
- (g) Total dosering for hver behandling, g eller kg aktivstof pr. hektar (minimum til maksimum).
- (h) PHI (preharvest interval): minimum sprøjtefrist (antal dage) før høst af afgrøder.